

119

PROPERTY OF  
Z. P. MEDICAL


*Handwritten text, possibly a date or number, partially obscured and illegible.*



LIBRARY OF

Dr. Z. P. Metcalf

1885-1956



---

**E**ntomologiam nunc virilem vegetamque laetus obseruo. Video scientiae heroes systemata elaborare, classes condere generaque noua introducere. Gratus certe labor, quo scientiae nitor magnopere augetur. Plures tamen fundamento ludicro inaedificant, systemata saepius diversissima iungere tentant, et eo ipso filum systematis ariadneum amittunt. Characteres classium generumque omnino omnes iisdem semper partibus desumendi sunt et hoc primum et firmum artis est fundamentum. Instrumenta cibaria introduxi, constantissima inueni at nullo modo cum aliis aliisque partibus iungenda. Mixta semper chaos praebent et laceffitus demonstrationem suscipiam.

Video Entomologes species innumeras depingere, describere, aut obseruationibus adumbrationibusque scientiam illustrare, quo maiorem vigorem et certitudinem attingit. Nimia verboritate vero crambeque decies co-

---

æta paginas polluunt et scientiæ nitorem pinguedine obruunt.

Supplementum hoc Entomologiæ systematicæ nunc offero. Continet genera plurima noua, characteribus certis firmata, continet species numerosas, differentiis vitis distinctas, adiectis synonymis, locis, obseruationibus.

Agonatorum classem inprimis et nomine et characterè e speciminibus bene conseruatis ab amicissimo Daldorffio ex India orientali allatis mutauì, diuisi et classes magis naturales characteresque firmiores obtinui. Vale L. B. et laboribus nostris faue.

Kiliae,  
10. Febr. 1798.

---

---

CLASSIS I.  
ELEUTERATA.

MAXILLA NUDA, LIBERA, PALPIGERA.

---

GEOTRUPES.

**O**<sup>s</sup> clypeo breui saepius bidentato.

*Palpi* quatuor breues, inaequales,

*anteriores* longiores, quadriarticulati: articulis inaequalibus; primo tertioque breuissimis, secundo quartoque longioribus, cylindricis, obtusis adhaerentes maxillae dorso,

*posteriores* breuiores, triarticulati: articulo tertio maiori, obtuto adnati labii apice.

*Mandibula* breuis, pilosa, crassa, lata, fornicata, obtusa.

*Maxilla* breuis, cornea, rotundata, ciliata, integra.

*Labium* breue, corneum, ouatum, integrum.

*Antennae* clauato lamellatae.

---



---

## SCARABAEUS.

*Os clypeo breui, truncato, ciliato.*

*Palpi* quatuor aequales, filiformes,  
*anteriores* quadriarticulati: articulis sub-  
 aequalibus; ultimo cylindrico, obtuso  
 adhaerentes maxillae dorso,  
*posteriores* triarticulati: articulis subaequa-  
 libus, ultimo cylindrico, obtuso adna-  
 ti labii apicibus.

*Mandibula* magna, cornea, arcuata, extus  
 sulcata, intus pilosa.

*Maxilla* crassa, cornea, unidentata.

*Labium* breue, corneum, rotundatum, late  
 emarginatum.

*Antennae* clauato lamellatae.

## ONITIS.

*Os clypeo membranaceo, rotundato, integro.*

*Palpi* quatuor inaequales,  
*anteriores* longiores, filiformes, quadriar-  
 ticulati: articulo ultimo longiori, cy-  
 lindrico, obtuso adhaerentes maxillae  
 dorso,  
*posteriores* breuiores, compressi, utrinque  
 ciliati, extrorsum crassiores, triarticu-  
 lati adnati sub labii apice.

*Mandibula* membranacea, compressa, apice  
 rotundata, integra.



*Maxilla* basi cornea, apice inflexa, dilatata, membranacea, rotundata, integra.

*Labium* breue, corneum, pilosum, rotundatum, emarginatum.

*Antennae* clauato lamellatae.

## C O P R I S.

Os clypeo porrecto, rotundato, corneo.

*Palpi* quatuor inaequales, filiformes,

*anteriores* longiores, quadriarticulati: articulo ultimo parum longiori, cylindrico, obtuso adhaerentes maxillae dorso.

*posteriores* breuissimi, triarticulati: articulis aequalibus adnati sub labii apice.

*Mandibula* omnino nulla.

*Maxilla* basi cornea, in medio unidentata, apice membranacea, rotundata.

*Labium* breue, corneum, rotundatum, integrum.

*Antennae* clauato lamellatae.

## C Y C H R U S.

Os clypeo porrecto, corneo, ouato, integro: margine incrassato.

*Palpi* quatuor subaequales, elongati, prominuli,

*anteriores* paullo longiores, quadriarticulati: articulo primo breuissimo, secundo longissimo, ultimo obconico apice

oblique truncato adhaerentes maxillae dorso.

*posteriores* triarticulati: articulo secundo longissimo, tertio obconico, oblique truncato adnati labii apice.

*Mandibula* elongata, tenuis, recta, cornea, apice incurva, acutissima, edentula.

*Maxilla* compressa, cornea, rotundata, bifida: lacinia exteriori interiori obvolvente.

*Labium* breve, corneum, cylindricum, integrum.

*Antennae* setaceae.

## L E M A.

Os clypeo brevi, corneo, rotundato, integro.

*Palpi* quatuor inaequales filiformes,

*anteriores* longiores, quadriarticulati: articulo primo brevissimo, reliquis subaequalibus, ultimo ovato adhaerentes maxillae dorso,

*posteriores* breviores, triarticulati: articulo primo brevissimo, ultimo ovato adnati labii medio.

*Mandibula* cornea, recta, edentula.

*Maxilla* cornea, bifida: lacinia exteriori longiore, cylindrica, interiori acuta.

*Labium* membranaceum, rotundatum, bifidum.

*Antennae* moniliformes.

## ENDOMYCHUS.

Os clypeo brevissimo, vix exserta, integro.

*Palpi* quatuor inaequales, subfiliformes,  
*anteriores* longiores, quadriarticulati: articulo ultimo truncato, subcrassiori adhaerentes maxillae dorso,  
*posteriores* breviores triarticulati: articulo ultimo obtuso, truncato adnati labii medio exteriori.

*Mandibula* cornea, incurva, acuta, edentula.

*Maxilla* brevis, cornea, unidentata.

*Labium* elongatum, corneum, apice rotundatum, integrum.

*Antennae* filiformes apice moniliformes.

## CLYTHRA.

Os clypeo brevi, corneo rotundato, integro.

*Palpi* quatuor breves, subaequales, filiformes,  
*anteriores* quadriarticulati: articulo secundo longiori, ultimo cylindrico paullo crassiori obtuso adhaerentes maxillae dorso,  
*posteriores* vix breviores; triarticulati adnati labii lateribus.

*Mandibula* elongata, cornea, apice parum dilatata, bidentata.

*Maxilla* cornea, brevis, bifida: laciniis distantibus, interiore parum brevior.

*Labium* breve, membranaceum, apice parum dilatatum, emarginatum.

*Antennae* breves, ferratae.

---

 DIRCAEA.

Os clypeo brevissimo, vix exserto.

*Palpi* quatuor inaequales,

*anterior*es exserti, porrecti, multo longiores, quadriarticulati: articulis tribus brevibus, ultimo elongato, compresso, trilobo: lobo inferiori conico, intermedio tenuiori, subulato, incuruo, ultimo maiori acuto adhaerentes maxillae dorso,

*posterior*es breves filiformes, triarticulati, adnati labii medio.

*Mandibula* brevis, cornea, incurua, edentula.

*Maxilla* brevissima, membranacea, bifida: laciniis aequalibus, cylindricis, obtusis.

*Labium* breve, membranaceum, rotundatum, integrum.

*Antennae* filiformes: articulis cylindricis.

---

GEOTRUPES. *Palpi* quatuor filiformes.

*Labium* pilosum, ovatum, integrum.

*Antennae* clauato-lamellatae.

\*. *Thorace cornuto.*

1. *G. thoracis cornu incuruo maximo, subtus barbato utrinque unidentato, capitis recurvato dentato.* *Hercules.*

*Scarabaeus Hercules* Ent. syst. 1. 2. 1. Linn. syst. nat. 2. 541. 1. Mus. Lud. Ulr. 3. Jablonsk. Coleopt. 1. tab. 1. fig. 1. 2. Oliv. Inf. 1. 3. 6. 1. tab. 1. fig. 1. tab. 23. fig. 1. Roess. Inf. 2. Scar. 1. tab. A. fig. 1. 4. tab. 5. fig. 3.

Drury Inf. 1. tab. 30. fig. 1. 2.

*Scarabaeus scaber*, scutellatus clypei centro prominulo, elytris antice scabris. Linn. syst. nat. 2. 549. 37. Mus. Lud. Ulr. 17. faem.

---

*Geotrupes* corpus magnum, oblongum, gibbum, immarginatum, supra glabrum; subtus pilosum, tardum, clypeo os regente breui, saepius bidentato, maris cornuto, oculis magnis, globosis, utrinque conspicuis, margine postico infertis, utrinque hamo firmatis, antennis breuibus, ante oculos infertis, thorace rotundato, gibbo, maris saepius cornuto: marginibus rotundatis, scutello paruo, rotundato, elytris longitudine abdominis, pedibus breuibus, validis, femoribus compressis, tibiis dentatis, tarsis quinque articulatis, colore nigro aut obscuro.

Habitat in America meridionali.

*Alcides.*

2. *G. thoracis cornu incuruo subtus barbato unidentato, capitis recurvato mutico.*

*Scarabaeus Alcides* Ent. syst. 1. 3. 2. Oliv. Inf. 1. 3. 7. 2. tab. 1. fig. 2.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.

*Gideon.*

3. *G. thoracis cornu incuruo maximo apice bifido, capitis recurvato bifido supra unidentato.*

*Scarabaeus Gideon* Ent. syst. 1. 4. 2. Linn. syst. nat. 2. 541. 2. Jablonsk. Coleopt. 1. tab. 1. fig. 3.

Roess. Inf. 2. Scarab. 1. tab. A. fig. 5.

Oliv. Inf. 1. 3. 14. 10. tab. 11. fig. 102.

Edw. Av. tab. 40.

Seligm. Av. 2. tab. 79.

Voet Scarab. tab. 12. fig. 100.

Habitat in Indiis.

- Oromedon.* 4. *G. thoracis cornu brevis emarginato, capitis recurvato bifido.*

*Scarabaeus Oromedon* Ent. syst. 1. 4. 4.

Oliv. Inf. 1. 3. 17. 14. tab. 18. fig. 165.

Jablonsk. Coleopt. 1. tab. 2. fig. 2.

Voet Coleopt. tab. 13. fig. 102.

Aubent. Miscell. tab. 40. fig. 4.

Habitat in Indiis.

- Centaurus.* 5. *G. thoracis cornu incuruo basi bidentato apice bifido, capitis recurvato unidentato.*

*Scarabaeus Centaurus* Ent. syst. 1. 4. 5.

Oliv. Inf. 1. 3. 14. 9. tab. 11. fig. 104.

- Drury Inf. 1. tab. 36. fig. 1.  
 Jablonsk. Coleopt. 1. tab. 2. fig. 1.  
 Habitat in India orientali, Africa.
6. *G. rufus thoracis cornu breui incuruo subtus* *Aegeon.*  
 barbato, capitis recurvo subulato.  
*Scarabaeus Aegeon* Ent. syst. 1. 4. 6.  
 Oliv. Inf. 1. 3. 26. 216. tab. 26. fig. 219.  
 Drury Inf. 2. tab. 30. fig. 5.  
 Jabl. Coleopt. 1. tab. 1. fig. 4.  
 Habitat in Indiis.
7. *G. thoracis cornu subulato protenso capitis* *dispar.*  
 subulato subrecurvo, scutello cordato.  
*Scarabaeus dispar* Ent. syst. 1. 5. 7.  
*Scarabaeus Ammon* Pall. Jeon. 1. tab. A. fig. 8.  
 A. B.  
 Oliv. Inf. 1. 3. 58. 64. tab. 3. fig. 20.  
 Jabl. Coleopt. 1. tab. 2. fig. 3. 4.  
 Ross. Fa. Etr. 1. 4. 6.  
 Habitat in Rossia australiori Mus. Dom. Banks.
8. *G. thoracis cornu incuruo basi crassissimo api-* *Chorinae-*  
 ce bifido, capitis longiori bifido. *us.*  
*Scarabaeus Chorinaeus* Ent. syst. 1. 5. 8.  
 Oliv. Inf. 1. 3. 15. 10. tab. 2. fig. 4.  
 Jabl. Coleopt. 1. tab. 2. fig. 5.  
 Aubent. Miscell. tab. 15. fig. 4.  
 Voet Inf. tab. 13. fig. 104.  
 Habitat in Brasilia.
9. *G. thoracis cornu bidentato, capitis dichoto-* *dichotomus.*  
 mo, clytris rufis.

*Scarabaeus dichotomus* Ent. syst. 1. 5. 9. Linn.  
Mant. 1. 529.

Oliv. Inf. 1. 3. 20. 17. tab. 17. fig. 156.

Jabl. Coleopt. 1. tab. 2. fig. 6.

Aubent. Miscell. tab. 40. fig. 5.

Voet Coleopt. tab. 14. fig. 107.

Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 1.

Habitat in Indiis.

*claviger.* 10. *G. rufus* thoracis cornu elevato, capitis subulato recuruo.

*Scarabaeus claviger* Ent. syst. 16. 10. Linn. Mant.  
1. 529.

Oliv. Inf. 1. 3. 20. 18. tab. 5. fig. 40.

Jabl. Coleopt. tab. 3. fig. 1.

Drury Inf. 3. tab. 48. fig. 3.

Voet Coleopt. tab. 14. fig. 108.

Aubent. Miscell. 1. tab. 40. fig. 1.

Habitat in Indiis.

*hastatus.* 11. *G. thoracis* cornu breui fornicato hastato subtus hirto, capitis recuruo.

*Scarabaeus hastatus* Ent. syst. 1. 6. 11. \*

Oliv. Inf. 1. 3. 21. 9. tab. 19. fig. 175.

Habitat in America meridionali Mus. Dr.  
Hunter.

*Enema.* 12. *G. thoracis* cornu incuruo simplici basi crassissimo, capitis recuruo bifido.

*Scarabaeus Enema* Ent. syst. 1. 6. 12. \*

Oliv. Inf. 1. 3. 22. 20. tab. 12. fig. 114.

tab. 17. fig. 157.

Habitat in India Mus. Dr. Hunter.



13. *G. thoracis* cornu incuruo basi crassissimo api- *Pan.*  
 ce bifido, capitis recuruo unidentato,  
*Scarabaeus Pan* Ent. syst. 1. 6. 13.  
 Habitat in Indiis Dom. Drury.
14. *G. thorace* prominente bilobo, capitis cornu *bilobus.*  
 simplici, elytris striatis.  
*Scarabaeus bilobus* Ent. syst. 1. 7. 14.  
 Oliv. Inf. 1. 3. 31. 33. tab. 5. fig. 35.  
 tab. 23. fig. 55.  
 tab. 1. fig. 5.  
 Edw. Av. tab. 105 fig. 2.  
 Voet Coleopt. tab. 14. fig. 106.  
 Aubent. Miscell. tab. 15. fig. 3.  
 Habitat in Europa australi.
15. *G. thorace* antice fornicato excauato: cornu *Daedalus.*  
 breuissimo, capitis cornu plano utrinque im-  
 presso.  
*Scarabaeus Daedalus* Ent. syst. 1. 7. 15. \*  
 Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.
16. *G. thorace* retuso: cornu breui truncato, ca- *truncatus.*  
 pite mutico.  
*Scarabaeus truncatus* Ent. syst. 1. 7. 16.  
*Scarabaeus truncatus* Oliv. Inf. 1. 3. 31. 32. tab.  
 11. fig. 103.  
 Voet Coleopt. tab. 5. fig. 38.  
 Habitat in noua Zelandia Mus. Dom. Banks.
17. *G. thorace* antice retuso mucronato, capitis *Zoilus.*  
 cornu breuissimo recuruo.  
*Scarabaeus Zoilus* Ent. syst. 1. 7. 17. \*  
 Oliv. Inf. 1. 3. 45. 51. tab. 9. fig. 84.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Olivier.

- Actaeon.* 18. *G. glaber* thorace bicorni, capitis cornu unidentato bifido, elytris laevibus.  
*Scarabaeus Actaeon* Ent. syst. 1. 8. 18. Linn. syst. nat. 2. 541. 3. Mus. Lud. Ulr. 4. Oliv. Inf. 3. 20. 5. tab. 5. fig. 32. tab. 6. fig. 49.  
 Jablonsk. Coleopt. 1. tab. 3. fig. 4.  
 Aubent. Miscell. tab. 15. fig. 5.  
 Roesl. Inf. 2. Scarab. 1. tab. A. fig. 2.  
 Voet Coleopt. tab. 16. fig. III. 112.  
 Habitat in America meridionali.
- Simfon.* 19. *G. thorace* bicorni, capitis cornu apice bifido, clypeo denticulato.  
*Scarabaeus Simfon* Ent. syst. 1. 8. 19. Linn. syst. nat. 2. 542. 4. Mus. Lud. Ulr. 5. Oliv. Inf. 1. 3. 13. 8. tab. 15. fig. 142.  
 Habitat in Indiis Mus. Britannicum.
- Elephas.* 20. *G. villosus* thorace gibbo bicorni, capitis cornu unidentato apiceque bifido.  
*Scarabaeus Elephas* Ent. syst. 1. 8. 20. Oliv. Inf. 1. 3. 11. 6. tab. 15. fig. 138. Olear. Mus. tab. 16. fig. 2.  
 Habitat in Guinea Mus. Britannicum.
- Boas.* 21. *G. thorace* retuso excavato bidentato, capitis cornu recurvo simplici.  
*Scarabaeus Boas* Ent. syst. 1. 8. 21. \*  
*Scarabaeus Augius* Ent. syst. 1. 16. 47.  
*Scarabaeus Boas* Oliv. Inf. 3. 35. 38. tab. 4. fig. 24.

Habitat in Sierra Leon. Dom. Drury.

22. *G. thorace bicorni*, corpore ferrugineo. *Coryphaeus*  
*Scarabaeus Coryphaeus* Ent. syst. 1. 9. 22. \*  
 Oliv. Inf. 1. 3. 61. 68. tab. 16. fig. 150.  
 Habitat ad Cap. Bon. Spei Dom. Lee.
23. *G. thorace bicorni*, capitis cornu recurvo *bicornis*,  
 unidentato, elytris rufis.  
*Scarabaeus bicornis* Ent. syst. 1. 9. 23.  
 Lesk. Anf. Gr. 1. tab. 9. fig. 1.  
 Jabl. Col. 1. tab. 4. fig. 1.  
 Aub. Miscell. tab. 15. fig. 2.  
 Habitat in America meridionali.
24. *G. brunneus thorace bicorni*: cornubus com- *Orion*.  
 pressis, capite tricorni: intermedio brevif-  
 simo.  
*Scarabaeus Orion* Ent. syst. 1. 9. 24.  
 Oliv. Inf. 1. 3. 47. 52. tab. 4. fig. 30.  
 tab. 5. fig. 30.  
 Habitat in Senegallia Mus. D. Olivier.
25. *G. glaucus thorace tricorni*: lateralibus bre- *Tityus*,  
 vissimis subulatis, medio subtus barbato, ca-  
 pitis recurvo simplici.  
*Scarabaeus Tityus* Ent. syst. 1. 10. 25. Linn.  
 syst. nat. 2. 542. 5. Amoen. acad. 6. 391. 1.  
 Oliv. Inf. 1. 3. 9. 4. tab. 4. fig. 31.  
 Voet Coleopt. tab. 12. fig. 99.  
 Degeer Inf. 4. tab. 8. fig. 10.  
 Jabl. Col. 1. tab. 4. fig. 2.  
*Scarabaeus marianus* Ent. syst. 1. 30. 95. Linn.  
 syst. nat. 2. 549. 35.

Oliv. Inf. tab. 10. fig. 31.

Aubent. Miscell. 1. tab. 40. fig. 2.

Habitat in America.

*Atlas.* 26. *G. thorace tricorni: intermedio breuissimo, capitis recuruo.*

*Scarabaeus Atlas* Ent. syst. 1. 10. 26. Linn.  
syst. nat. 2. 542. 6. Mus. Lud. Ulr. 6.

Jabl. Coleopt. 1. tab. 4. fig. 3.

Sulz. Icon. tab. 1. fig. 1.

Habitat in America meridionali.

*Geryon.* 27. *G. thorace excauato tricorni: lateralibus compressis unidentatis, capitis recuruo simplici.*

*Scarabaeus Geryon* Ent. syst. 1. 10. 27. \*

Oliv. Inf. 1. 3. 30. 31. tab. 24. fig. 208.

Jabl. Coleopt. 1. tab. 4. fig. 5.

Drury Inf. 2. tab. 30. fig. 6.

Habitat in Indiis.

*Aloeus.* 28. *G. thorace tricorni: intermedio longiori simplici, capite submutico, elytris unistriatis.*

*Scarabaeus Aloeus* Ent. syst. 1. 11. 28. Linn.  
syst. nat. 2. 542. 7. Mus. Lud. Ulr. 7.

Oliv. Inf. 1. 3. 23. 22. tab. 3. fig. 22.

Jabl. Col. 1. tab. 5. fig. 3.

Aubent. Miscell. tab. 15. fig. 7.

Voet Coleopt. tab. 18. fig. 122. Mas.  
tab. 19. fig. 128. faem.

Roess. Inf. 2. Scarab. 1. tab. A. fig. 6.

Habitat in America meridionali.

29. G. thorace tricorni: intermedio emarginato, *Typhon*,  
capitis longiori recuruo basi unidentato apice bifido.  
*Scarabaeus Typhon* Ent. syst. 1. 11. 29. \*  
Oliv. Inf. 1. 3. 12. 7. tab. 16. fig. 152.  
Habitat — — Mus. Britannicum.
30. G. thorace tricorni: lateralibus brevioribus *Vulcanus*,  
compressis ante apicem dilatatis, capite mutico,  
elytris striato punctatis.  
*Scarabaeus Vulcanus* Ent. syst. 1. 11. 30. \*  
Habitat in Insula Guadeloupe Dom. de Badier.
31. G. thorace tricorni: intermedio longiorisim- *Antaeus*.  
plici, capite mutico elytris laevissimis.  
*Scarabaeus Antaeus* Ent. syst. 1. 12. 31.  
Oliv. Inf. 1. 3. 25. 23. tab. 12. fig. 105.  
tab. 13. fig. 105.  
Voet Coleopt. fig. 115.  
Jabl. Coleopt. 1 tab. 5. fig. 4. 5.  
Drury Inf. 1. tab. 34. fig. 1.  
Habitat in America meridionali.
32. G. thorace tricorni: intermedio longiorisim- *Syphax*.  
plici, capite mutico, elytris punctatis.  
*Scarabaeus Syphax*, Ent. syst. 1. 12. 32.  
Oliv. Inf. 1. 3. 25. 24. tab. 11. fig. 99.  
tab. 25. fig. 99.  
Habitat in America.
33. G. thorace tricorni: cornibus aequalibus brev- *Maimon*.  
uissimis, elytris laevibus.  
*Scarabaeus Maimon* Ent. syst. 1. 12. 33.  
Oliv. Inf. 1. 3. 29. 30. tab. 11. fig. 101.

Habitat in America Mus. Dom. Banks.

- Titanus.* 34. G. thorace tricorni: intermedio longiori apice bifido, lateralibus subarcuatis acutis, capite mutico.  
*Scarabaeus Titanus* Ent. syst. 1. 13. 36.  
 Oliv. Inf. 1. 3. 26. 25. tab. 5. fig. 38.  
 Drury Inf. 1. tab. 36. fig. 3. 4.  
 Jabl. Coleopt. 1. tab. 6. fig. 3.  
 Habitat in America.
- Aenobarbus.* 35. G. thorace tricorni: medio longiori emarginato, lateralibus obtusis, capite biruberculato.  
*Scarabaeus Aenobarbus* Ent. syst. 1. 13. 37.  
 Oliv. Inf. 1. 3. 28. 28. tab. 16. fig. 147.  
 Habitat in America Mus. Dr Hunter.
- nasicornis.* 36. G. thorace prominentia triplici, capitis cornu recurvo, elytris laevibus.  
*Scarabaeus nasicornis* Ent. syst. 1. 14. 38. Linn. syst. nat. 2. 544. 15. Fn. Sv. 378.  
 Roess. Inf. 2. Scarab. 1. tab. 6. 7.  
 Jabl. Coleopt. 1. tab. 6 fig. 4. 5.  
 Oliv. Inf. 1. 3. 37. 41. tab. 3. fig. 19.  
 Habitat in Europae finetis.
- Sylvanus.* 37. G. thorace retuto: prominentia triplici; intermedia obsoleta, capitis cornu recurvo.  
*Scarabaeus Sylvanus* 1. 14. 39.  
 Oliv. Inf. 1. 3. 29. 29. tab. 12. fig. 107.  
 Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.
- quadrifspinosus.* 38. G. thorace retuto: prominentia quadruplici, capitis cornu recurvo.

*Scarabaeus 4spinofus* Ent. syst. 1. 15. 41.

Oliv. Inf. 1. 3. 33. 35. tab. 19. fig. 179.

Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.

39. G. thorace quadricorni: cornubus lateralibus *Cyclops*, maioribus, capite bidentato, corpore ferrugineo.

*Scarabaeus Cyclops* Ent. syst. 1. 15. 44.

Oliv. Inf. 1. 3. 60. 67. tab. 15. fig. 140.

Habitat in Indiis Dom. Lee.

40. G. thorace cornubus quinque: postico longiori incumbente, capitis recurvo ferrato.

*Scarabaeus Milon* Ent. syst. 1. 16. 45.

Oliv. Inf. 1. 3. tab. 20. fig. 185.

Habitat in Brasilia.

\*\* *Thorace inermi, capite cornuto.*

41. G. thorace retuso subbituberculato, capitis *Rhinoceros*, cornu simplici, clypeo bifido, elytris punctatis.

*Scarabaeus Rhinoceros* Ent. syst. 1. 16. 46. Linn.

syst. nat. 2. 544. 14. Mus. Lud. Ulr. 10.

Oliv. Inf. 1. 3. 34. 36. tab. 18. fig. 166.

Jabl. Coleopt. tab. 9. fig. 5. 6.

Voet Coleopt. tab. 18. fig. 117. 118.

Barrel. Icon. tab. 163.

Wulf. Inf. Capenf. tab. 2. fig. 18.

Roess. Inf. 2. Scarab. 1. tab. A. fig. 7.

Petiv. Gaz. tab. 44. fig. 9. et tab. 100. fig. 3.

Habitat in Asia.

42. G. thorace inermi antice scabro, capitis cornu recurvo brevi. *Barbarofsa.*

*Scarabæus Barbarossa* Ent. syst. 1. 17. 48. \*

Oliv. Inf. 1. 3. 32. 34. tab. 12. fig. 109.

Jabl. Coleopt. tab. 9. fig. 7.

Habitat in noua Hollandia Mus. D. Banks.

*Stentor.* 43. G. thorace antice retuso, capitis cornu recuruo, breui, clypeo bidentato.

Habitat in Isle de France Dom. Billardiere.

Maior G. Jamaicensi. Caput paruum, clypeo antice dentibus duobus validis, cornu medio capite breuiori, obtuso, recuruo. Thorax laeuis, glaber, nitidus, antice retusus. Elytra picea, striata, subrugosa. Corpus atrum pedibus piceis.

*Satyrus.* 44. G. thorace inermi antice truncato, capitis cornu recuruo capite longiori.

*Scarabæus Satyrus* Ent. syst. 1. 17. 49.

Oliv. Inf. 1. 3. 39. 43. tab. 11. fig. 49.

Habitat in America boreali Mus. Dom. Banks.

*Jamaicensis.* 45. G. thorace inermi antice retuso, capitis cornu recuruo, clytris striatis.

*Scarabæus Jamaicensis* Ent. syst. 1. 17. 50.

Oliv. Inf. 1. 3. 40. 44. tab. 16. fig. 148.

Drury Inf. 1. tab. 34. fig. 1. 2.

Habitat in Jamaica.

*Silenus,* 46. G. thorace inermi antice excavato, capitis cornu recuruo, clytris laeuissimis.

*Scarabæus Silenus* Ent. syst. 1. 18. 51.

Oliv. Inf. 1. 3. 41. 45. tab. 8. fig. 62.

Jabl. Col. tab. 10. fig. 2.

Scopel. Del. Fl. am. 1. tab. 21. fig. 6.



- Roff. Fn. Etr. 1. 3. 8.  
 Barr. Pl. Hisp. tab. 163.  
 Habitat in Europa australiori.
47. G. thorace inermi rotundato, capitis cornu *Syrichtus*.  
 recuruo.  
*Scarabaeus Syrichtus* Ent. syst. 1. 18. 52. \*  
 Oliv. Inf. 1. 3. 50. 57. tab. 6. fig. 48.  
 tab. 20. fig. 48.  
 Jabl. Coleopt. tab. 11. fig. 4.  
 Voet Coleopt. tab. 20. fig. 133.  
 Habitat in America meridionali, Mus. Dom.  
 Banks.
48. G. thorace inermi, capitis cornu emargina-  
 to, tibiis pollicis brevissimis apice spinosis. *Hylax*.  
*Scarabaeus Hylax* Ent. syst. 1. 19. 53.  
 Oliv. Inf. 1. 3. 50. 58. tab. 11. fig. 95.  
 Habitat in Africa Dom. Lee.  
 Forte potius Citonia. Scutellum triangulum.
49. G. thorace inermi rotundato, capitis cornu *Aries*.  
 brevissimo subulato, corpore subtus rufo  
 piloso.  
*Scarabaeus Aries* Ent. syst. 1. 19. 55.  
 Jabl. Col. tab. 10. fig. 3.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Vahl.
50. G. thorace inermi rotundato, capitis tuber-  
 culo eleuato subcornuto, corpore subtus  
 nudo.  
*Scarabaeus Monodon* Ent. syst. 1. 20. 57.  
 Jabl. Coleopt. 2. tab. 17. fig. 4.  
 Habitat in Hungaria Dom. Smidt.

- coronatus.* 51. *G. thorace inermi, capitis clypeo postice emarginato.*  
*Scarabaeus coronatus* Ent. syst. 1. 20. 58.  
 Oliv. Inf. 1. 3. 52. 61. tab. 12. fig. 110.  
 Habitat in Java Mus. Dom. Banks.
- Dionysius.* 52. *G. thorace inermi excavato, capitis cornu recurvo depresso apice crassiori.*  
*Scarabaeus Dionysius* Ent. syst. 1. 20. 59.  
 Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.
- Meliboeus.* 53. *G. thorace inermi antice inaequali, capitis cornu brevissimo truncato, elytris striatis.*  
*Scarabaeus Meliboeus* Ent. syst. 1. 20. 60.  
 Habitat in America boreali Dom. Lee.
- didymus.* 54. *G. depressus thorace fossula exarato, capite tricuspido, elytris striatis.*  
*Scarabaeus didymus* Ent. syst. 1. 20. 61. Linn.  
 syst. nat. 2. 545. 19. Mus. Lud. Ulr. 14.  
 Oliv. Inf. 1. 3. 42. 46. tab. 2. fig. 9.  
 Jabl. Col. tab. 11. fig. 2.  
 Petiv. Gaz. tab. 27. fig. 7.  
 Drury Inf. 1. tab. 32. fig. 1.  
 Voet Scarab. tab. 19. fig. 126.  
 Habitat in America.
- valgus.* 55. *G. depressus thorace sulcato mucronato, capite cornubus duobus brevibus.*  
*Scarabaeus valgus* Ent. syst. 1. 21. 62. Linn.  
 syst. nat. 2. 546. 20. Mus. Lud. Ulr. 15.  
 Oliv. Inf. 1. 3. tab. 17. fig. 160.  
 Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 8.  
 Habitat Cajennae.

56. *G. thorace inermi scabro*, capite linea trans-*hircus*.  
 uersa carinata, clypeo bidentato.  
*Scarabaeus hircus* Ent. syst. 1. 21. 63,  
 Jabl. Coleopt. tab. 10. fig. 5.  
 Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.
57. *G. thorace inermi punctato*, capitis clypeo *punctatus*.  
 integro: denticibus duobus eleuatis obtusis.  
*Scarabaeus punctatus* Ent. syst. 1. 21. 64.  
 Oliv. Inf. 1. 3. 52. 60. tab. 8. fig. 70.  
 Jabl. Coleopt. 2. tab. 17. fig. 6.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.
58. *G. thorace inermi brunneus* capite subbicolor-*farctus*.  
 ni, elytris punctato striatis apice nigris.  
*Scarabaeus farctus* Ent. syst. 1. 22. 65.  
 Oliv. Inf. 1. 3. 68. 76. tab. 11. fig. 96.  
 Voet Coleopt. tab. 10. fig. 92.  
 Habitat in Pennsylvania.  
 Forte potius *Scarabaeus*.
59. *G. thorace retuso*, capitis cornu breui plano, *retusus*.  
 femoribus posticis incrassatis.  
*Scarabaeus retusus* Ent. syst. 1. 22. 66.  
 Oliv. Inf. 1. 3. 46. 55. tab. 11. fig. 100.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Banks.
60. *G. piceus* thorace inermi glabro, capite bi-*piceus*,  
 corni, elytris striatis.  
*Scarabaeus piceus* Ent. syst. 1. 22. 67.  
 Oliv. Inf. 1. 3. 52. 63. tab. 24. fig. 211.  
 Jabl. Coleopt. tab. 11. fig. 3.  
 Eyesl. Coleopt. 1. 4. 6. tab. 19. fig. 1.  
 Habitat in Indis Dom. Drury.

\*\*\* *Mutici capite thoraceque inermi.*

- excauatus.* 61. *G. muticus* thorace retuso mucronato, clypeo reflexo integro.  
*Scarabaeus excauatus* Ent. syst. 1. 31. 100.\*  
*Scarabaeus candidae* Petagn. Spec. Inf. Cal. 3. 9. tab. 1. fig. 6.  
*Melolontha cornuta* Oliv. Inf. 1. 5. 20. 16. tab. 9. fig. 74.  
 Cyrilli Ent. Neap. 1. tab. 1. fig. 12.  
 Habitat in regno Neapolitano Dom. de Schlanbusch.
- Talpa.* 62. *G. muticus* thorace antice mucronato, capitis clypeo linea eleuata transuersa, apice reflexo emarginato.  
*Scarabaeus Talpa* Ent. syst. 1. 32. 101.\*  
 Habitat in Insula St. Bartholomaei Dom. de Paykull.
- iuuencus.* 63. *G. muticus* thorace antice impresso mucronato, clypeo subemarginato.  
*Scarabaeus iuuenus* Ent. syst. 1. 32. 102.\*  
 Oliv. Inf. 1. 3. 45. 50. tab. 8. fig. 66.  
 tab. 16. fig. 143.  
 Habitat in America Mus. Dom. Banks.

SCARABAEUS. *Palpi* quatuor filiformes.

*Labium* emarginatum: apicibus elongatis palpigeris.

*Antennae* clauato lamellatae.

73—4. Sc. thorace inermi capite tuberculis tribus, elytris striatis testaceis. *hydrochaeris.*

Habitat in Tangier Dom. Schousboe Mus. Dom. Sehestedt.

Statura omnino Sc. scrutator at paullo minor. Caput nigrum tuberculis tribus: intermedio maiore, cornuto. Thorax laevis, niger margine laterali et postico late testaceis. Elytra striata, testacea stris subtilissime crenatis. Corpus obscurum.

94—5. Sc. ater capite quadrituberculato, elytris striatis. *4tuberculatus.*

Habitat in America Dom. Hybner.

Paruus totus ater elytris striatis distinctus tuberculis clypei quatuor transuersis unico antice, postice tribus.

98—9. Sc. muticus laeuissimus opacus thorace laeuigatus. longitudine elytrorum.

Habitat in Tangier D. Schousboe Mus. Dom. de Sehestedt.

Paullo maior Sc. stercorario et distinctus. Capitis clypeus rotundatus puncto medio ele-

uato. Thorax magnus, laevis, niger, opacus: margine laterali rotundato, dilatato. Scutellum breue. Elytra laeuis, opaca, nigra, breuia. Pedes dentati.

*morator.* 104—5. Sc. muticus ater thorace punctato elytris striatis, clypeo reflexo integro.

Habitat in India orientali Dom. Hybner.

Statura et magnitudo omnino S. laboratoris.

Caput et thorax glabra, vage punctata. Clypeus margine incrassato, integro. Elytra striata. Pedes nigri.

*atricapillus.* 124—5. Sc. muticus griseus capite atro. Habitat in India orientali Mus. D. de Sehestedt. Minutus statura Sc. quisquillii griseus capite solo nigro. Elytra striata.

*fabuleti.* 125—6. Sc. muticus fuscus elytris striato crenatis.

Habitat in Suecia Mus. Dom. Lund.

Paruus, obscurus, minime nitens. Elytra crenato striata.

*tibialis.* 127—8. Sc. muticus ater thorace varioloso, elytris crenato striatis.

Habitat in Tangier D. Schousboe Mus. Dom. de Sehestedt.

Statura minuta Sc. stercorator. Clypeus emarginatus. Thorax variolosus, ater. Elytra crenato striata. Pedes nigri tibiis imprimis anticis rufis.

ONITIS. *Palpi* postici compressi, obtusi.

*Mandibula* compressa, membranacea, obtusa.

*Antennae* clauato lamellatae.

1. *O. scutellatus* thorace inermi quadripunctato, *Inuus*.  
capite quadrituberculato, corpore viridi aeneo.

*Scarabaeus Inuus* Ent. syst. 1. 22. 68.

Jabl. Colcopt. tab. 11. fig. 4.

Habitat in Sierra Leon.

2. *O. scutellatus* thorace inermi quadripunctato, *Aygulus*.  
capite tuberculato, elytris testaceis.

*Scarabaeus Aygulus* Ent. syst. 1. 23. 69. \*

Habitat in India.

3. *O. scutellatus* thorace inermi, capitis cornu *Clinias*.  
breuissimo.

*Scarabaeus Clinias* Ent. syst. 1. 19. 56. \*

Habitat in Hungaria.

Onitis corpus medium depressum, planiusculum immarginatum, tardum, ore hirto, clypeo porrecto rotundato, integro, interdum tuberculato, oculis magnis, rotundatis, utrinque conspicuis hamo anteriore firmante dimidiatis, postice infertis, antennis breuibus sub clypeo infertis, thorace laevi, punctis quatuor impresso; marginibus deflexis, rotundatis, scutello interdum nullo, interdum breui, triangulari, elytris planiusculis longitudine abdominis, pedibus breuibus, validis, femoribus crassis, compressis, tibiis anticis arcuatis, extus dentatis, tarsis nullis, posticis breuibus, antice crassioribus, dentatis, tarsis quinque articulatis.

- Lophus.* 4. *O. scutellatus* thorace inerimi utrinque dilatato quadripunctato elytris cinereo fuscoque variis.

Habitat in Saffi Dom. Schousboe Mus. Dom. de Schellestr.

Statura et magnitudo Inui. Clypeus rotundatus, niger macula media cinerea tuberculo medio elenato. Thorax niger margine utrinque dilatato pallescente punctisque quatuor impressis: posticis approximatis. Scutellum distinctum, acutum. Elytra cinerea, fusco varia. Corpus atrum. Pedes atrii, antici femoribus compressis, intus unidentatis, tibiis elongatis, incurvis, intus in medio unidentatis, extus multidentatis, tarsis nullis. Pedes intermedii femoribus compressis, unidentatis tibiis breuibus extus tridentatis. *Variat* rarius elytris totis nigris.

- Apelles.* 5. *O. scutellatus* capitis cornu breuissimo, elytris cinereis: punctis eleuatis atris.

*Scarabaeus Apelles* Ent. syst. 1. 18. 53.

Oliv. Inf. 1. 3. 141. 170. tab. 11. fig. 97.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 13. fig. 9.

Voet Coleopt. tab. 25. fig. 33.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

- Sphinx.* 6. *O. exscutellatus* thorace punctis quatuor impressis, capite subcornuto.

*Scarabaeus Sphinx* Ent. syst. 1. 53. 173. \*

Habitat in America, Gallia meridionali.



7. *O. exscutellatus* thorace punctis quatuor impres-*unguicula-*  
 fis, capite lineis duabus transuersis, femo-*tus.*  
 ribus dentatis, tibiis anticis subtus unguicu-  
 latis.

*Scarabaeus unguiculatus* Ent. syst. I. 53. 174.  
 Habitat in Senegalia.

8. *O. exscutellatus* thorace punctis quatuor im-*Belial.*  
 pressis, capite lineis duabus transuersis, fe-  
 moribus tibiisque anticis acute dentatis.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura omnino Sphinx paullo maior. Capitis  
 clypeus lineis duabus transuersis, eleuatis:  
 anteriore abbreviata. Margo, subreflexus,  
 emarginatus. Thorax magnus puncto utrin-  
 que duobusque baseos dilatatis, impressis.  
 Elytra laeuius, ante apicem eleuata. Femo-  
 ra antica dente medio interiori valido, acu-  
 to. Tibiae elongatae, arcuatae, extus mul-  
 tidentatae, intus ciliatae medioque uniden-  
 tatae. Tarsi nulli. Femora intermedia com-  
 pressa, clauata fulcro elongato, acuto, den-  
 tem medii simulante. Femora postica compres-  
 sa, extus sinu magno, exciso, intus fulcro  
 elongato, subspinoso.

**COPRIS.** *Palpi* quatuor filiformes.  
*Mandibula* nulla.  
*Labium* rotundatum integrum.  
*Antennae* clauato lamellatae.

*hastator.* 135—6 C. thorace prominente submarginato, capite mutico.

Habitat in America boreali Dom. Hirshel.

Statura parua omnino C. nuchicornis. Capitis clypeus rotundatus, integer, muticus, niger. Thorax antice prominens: prominentia elongata, depressa, submarginata fere longitudine capitis, postice rotundatus. Elytra nigra.

*metallicus.* 142—3. C. thorace aeneo antice denticulis duobus compressis, capitis clypeo linea eleuata carinata.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

C. Seniculo minor. Capitis clypeus rotundatus margine reflexo et in medio lineis duabus transuersis eleuatis, carinatis. Antennae

---

Copris corpus magnum, gibbum, immarginatum, tardum, clypeo magno, rotundato, saepius integro, oculis paruis, rotundatis, utrinque conspicuis, postice infertis, hamo antico firmatis, antennis breuibus, sub clypeo infertis, thorace rotundato, gibbo, marginibus deflexis saepius cornuto aut inaequali, clytris longitudine abdominis, pedibus breuibus, validis, femoribus crassis, rotundatis, tibiis dentatis tarsis quinquearticulatis, colore saepius nigro aut obscuro.

flavescentes. Thorax rotundatus, acneus, antice utrinque retusus et in medio prominentia bidentata. Elytra vix striata, obscura. Forte faensina.

153—4. C. thorace rufo: prominentia triplici, *dromedarius*,  
elytris flavis: puncto falciaque nigris. *rius*.

Habitat in India orientali Mus. Dom. de Scheffedt.

Magnitudo C. nuchicornis. Antennae nigrae stipite rufo. Clypeus rotundatus, integer, muticus, obsecurus. Thorax gibbus, punctatus, rufus in medio prominentia triplici punctoque laterali impresso. Elytra striata, flava puncto baseos, falcia media sinuata punctoque paruo apicis nigris. Corpus et pedes ferruginea.

144—5. C. ater thorace bidentato, capitis cornu erecto breui. *Pardalis*;

Habitat in India D. Daldorff.

Statura parua C. metallici. Corpus totum atrum, obscurum. Capitis clypeus rotundatus, vix emarginatus cornu elevato, breui, basi latiore. Thorax punctatus, antice denticulis duobus paruis. Elytra substriata.

155—6. C. thorace quadricorni: cornubus inter-*Pirmal*.  
mediis depressis, capitis cornu breui obtuso.

Habitat in India orientali D. Daldorff Mus. D. de Scheffedt.

Corpus magnum, crassum, atrum. Clypeus magnus, porrectus, subsinuatus cornu ele-

uato, breui, crasso, obtuso. Thorax subrugosus cornubus quatuor: lateralibus marginalibus, paullo breuioribus acutis, intermediis paullo longioribus, depressis, obtusis. Elytra striata.

*Vertagus.* 159—60. C. thorace subquadridentato, clypeo postice linea eleuata bicorni.

Habitat in China Mus. Dom. Lund.

Statura et affinitas C. Camelus. Antennae claua testacea. Clypeus rotundatus in medio linea eleuata, laeui, postice linea eleuata maiori utrinque in cornu eleuatum porrecta. Thorax niger antice denticulis quatuor: intermediis maioribus, compressis, lateralibus breuioribus, acutis, posticè puncto oblongo impressus. Elytra striata, fusca.

*Melitaeus,* 159—60. C. thorace quadridentato, clypeo reflexo postice bicorni, corpore atro.

Habitat in Tangier D. Schousboe Mus. D. de Sehestedt.

Statura et summa affinitas C. Cameli at duplo minor. Clypeus niger, reflexus cornubus duobus breuibus, erectis. Thorax rotundatus denticulis quatuor aequalibus, postice rotundatus, laeuis. Elytra sublaeui.

*Meleager.* 172—3. C. thorace inermi, capitis cornu breui, compresso truncato, corpore virescente.

Habitat Cajennae Dom. Curier.

Statura et magnitudo C. orientalis. Capitis clypeus magnus, rotundatus, antice lineis

duabus transversis elevatis, corinatis, postice cornu brevis, lato, compresso, truncato. Antennae si uescentes. Thorax rotundatus, viridis puncto parvo utrinque impresso. Scutellum nulum. Elytra substriata, viridia. Corpus hirtum, obscure viretens.

172—3. *C. ater nitidus* thorace rotundato, ca-*Dorcas.*  
pitis cornu recurvo.

Habitat in Tangier Dom. Schousboe Mus. D. de Sehestedt.

Minor *C. orientali*. Caput paruum cornu porrecto, recurvo, acuto. Thorax gibbus, ater, nitidus. Elytra laevis, atra, immaculata. Tibiae piceae.

180—1. *C. thorace mutico*, capite cornibus *Corvus.*  
duobus subflexuosis, elytris basi apiceque rufis.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Statura omnino *C. Ibex*. Capitis clypeus rotundatus, integer cornibus duobus porrectis, arcuatis in medio, interiori subflexuosis. Thorax punctatus, niger, immaculatus. Elytra substriata, nigra macula baseos lunulaque apicis rufis.

184—5. *C. thorace mutico*, capitis clypeo cornibus duobus erectis, coleptorum limbo *nuchidens.*  
griseo.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Corpus paruum, nigrum. Clypeus rotundatus margine subflexo, in medio linea ele-

uata, acuta, postice cornubus duobus erectis, breuibus. Antennae testaceae. Thorax ater, nitidus, laeuis. Coleoptra striata, nigra limbo omni griseo. Pedes nigri femoribus ferrugineis.

Faemina simillima at inermis.

*Variat* clytris lituris nigris et griseis immaculatis.

*Antilope.* 185—6. C. thorace mutico aeneo, clypeo cornubus duobus erectis, corpore ferrugineo. Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentium. Capitis clypeus rotundatus occipite cornubus duobus erectis. Thorax laeuis, aeneus, nitidus. Elytra striata ferruginea. Corpus ferrugineum.

*Vitulus.* 185—6. C. ater thorace mutico retuso, capite cornubus duobus basi coronatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura parua praecedentium. Clypeus rotundatus, submarginatus cornubus duobus porrectis, subrectis, basi coronatis. Thorax laeuis, antice valde retusus. Elytra striata, immaculata.

*Dama.* 185—6. C. thorace mutico, clypeo cornubus duobus erectis, corpore aeneo.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Affinis videtur C. Trago. Antennae testaceae.

Capitis clypeus rotundatus, integer cornubus duobus erectis, rectis. Thorax omnino

muticus, laevis, aeneus, obscure nitidus.  
Elytra striata, aenea. Corpus subtus fuscum.

*Faemina minor mutica.*

196—7. *C. thorace mutico aeneo, capitis cornu erecto acuto, elytris testaceis.* *centricornis.*

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Minutus. Capitis clypeus rotundatus, subemarginatus in centro cornu erecto, acuto. Thorax rotundatus, aeneus, nitidus. Elytra substriata testacea. Corpus nigrum pedibus testaceis.

196—7. *C. niger thorace mutico, capitis clypeo subreflexo: cornu erecto acuto.* *unicornu.*

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Minutus. Capitis clypeus reflexus, vix emarginatus in medio cornu erectum, breve, acutum. Thorax inermis, niger. Elytra vix striata, nigra. Pedes picci.

198—9. *C. thorace inermi rotundato, clypeo emarginato postice cornubus tribus erectis: medio brevior.* *furculus.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Affinis *C. fureato* at triplo minor et distinctus. Capitis clypeus emarginatus cornubus tribus erectis approximatis: intermedio brevior. Thorax rotundatus, villosus, niger. Ely-

tra substriata, nigra macula baseos apicisque obscure ferrugineis.

*4dentatus.* 203—4. *C. ater* thorace inermi, capitis clypeo postice quadridentato.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Statura parva praecedentium. Clypeus rotundatus margine subreflexo, vix emarginato, in medio iugonatus, postice eleuatus dentibus quatuor. Thorax rotundatus, laeuis, nitidus. Elytra striata.

Faemina simillima at inermis.

*sanctus.* 209—10. *C. muticus* cupreo nitens clypeo sexdentato; thorace utrinque ferrato, elytris porcatis.

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. de Sehestedt.

Duplo minor *C. sacer*. Clypeus sexdentatus, niger. Thorax punctatus, cupro nitens, utrinque angulatus, ferratusque. Elytra striata et inter striae punctis plurimis impressis.

*cyaneus.* 211—2. *C. muticus* clypeo sexdentato cyaneus thorace punctato elytris rugosis.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo *C. Koenigii*. Clypeus rotundatus dentibus sex breuioribus. Thorax cyaneus, nitidus, punctatus. Elytra cyanea, valde rugosa. Corpus coeruleo nigrum.



- 220—1. *C. gibbus laevis ater pelibus elongatis. Helwigii.*  
 Habitat Tranquebariae D. Daldorff Mus. Dom.  
 Lund.  
 Statura omnino *C. Schaefferi* at minutus. Clypeus vix emarginatus. Thorax valde elongatus, niger. Pedes elongati femoribus clavatis.
- 226—7. *C. muticus glaber ater clypeo rotunda-laeuigatus.*  
 to, elytris striatis.  
 Habitat in India orientali Dom. Daldorff.  
 Maior *C. ouato* et distinctus videtur. Caput et thorax laevis, atra, immaculata. Elytra striata. Pedes nigri.
- 231—2. *C. muticus ater nitidus elytris griseis: politus.*  
 fascia media atra.  
 Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.  
 Minutus, nitidissimus. Capitis clypeus rotundatus, biugonatus, submarginatus. Thorax laevis, nitidus. Elytra striata, grisea fascia media, inaequali, fusca. Pedes picei.
- 233—4. *C. muticus laevis violaceo nitens ano violaceus.*  
 rufo.  
*Scarabaeus violaceus* Oliv. Inf.  
 Habitat in Insula St. Domingo Mus. Dom. Bosc.  
 Statura praecedentis totus laevis, violaceo nitens antennarum clava anoque siue ultimo segmento prominente rufis. Clypeus bidentatus.
- 236—7. *C. muticus ater antennis testaceis, cly-aterrimus.*  
 tris substriatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino et magnitudo C. ouati at distinctus videtur. Antennae testaceae. Clypeus rotundatus, integer. Thorax rotundatus, muticus. Elytra substriata longitudine abdominis.

*pusillus.*

238. C. muticus pubescens obscurus clypeo rotundato integro.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino C. ouati at triplo minor, totus pubescens, obscurus.

*variegatus.*

239. C. muticus clypeo emarginato, thorace elytrisque fusco flauoque variegatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Magnitudo praecedentis. Capitis clypeus rotundatus, emarginatus, niger. Thorax rotundatus. Elytra substriata fusco pallidoque variegata. Pedes pallidi.

*paruulus.*

240. C. muticus clypeo emarginato; corpore nigro immaculato.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus minutum, totum nigrum, immaculatum. Clypeus emarginatus. Elytra striata.

*fuscopunctatus.*

241. C. muticus niger thorace elytrisque griseis fusco punctatis.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Minutus. Capitis clypeus rotundatus, niger, antice emarginatus. Thorax rotundatus, griseus postice punctis aliquot fuscis. Elytra striata, grisea punctis tribus fuscis. Cor-

pus nigrum pedibus griseis. Scarabaei ex-  
 feutellati in Entomologia systematica enume-  
 rati ad hoc genus pertinent.

HISTER. *Maxilla* unidentata.

*Labium* corneum, cylin-  
 drium, integrum.

*Antennae* clava solida.

1—2. H. ater nitidus elytris externe striatis, man-*inaequalis.*  
 dibulis capite longioribus.

*Hister laevis* Ross. Fn. Etr.

Habitat in Germania Dr. Panzer.

Maior H. unicolori totus ater, nitidus, immar-  
 culatus. Mandibulae magnae, exsertae, in-  
 aequales, capite longiores, Palpi ferruginei.  
 Antennae nigrae. Thorax laevis, ater, ni-  
 tidus. Elytra atra, abbreviata vertus mar-  
 ginem oblique striata, ad futuram laevia.  
 Pedes atrii.

2—3. H. ater nitidus elytris striatis, capite pun-*impressus.*  
 ctis duobus impressis.

Habitat Kiliae.

Statura et magnitudo, omnino H. unicoloris  
 at distinctus punctis duobus frontalibus, im-  
 pressis. Elytra usque ad apicem striata. Ti-  
 biae omnes ferratae.

4—5. H. ater nitidus elytris abbreviatis, abdo-*acuminatus.*  
 mine acuto.

Habitat in Galliae Alpibus Dom. Bronguiart.

Statura omnino praecedentium ater, nitidus.

Elytra basi vix striata apice vix punctata. Abdomen valde prominet acutum.

*2 pustulatus.* 16—17. H. ater elytris striatis: puncto medio rubro, capite retuso.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Differt omnino ab H. 2maculato duplo maior.

Caput mandibulis extertis muticis fronte retusa. Thorax laevis, ater, nitidus angulo antico utrinque puncto impresso. Elytra striata stria interiore abbreviata, atra puncto medio distincto, rubro. Tibiae anticae valde dentatae.

*pulchellus.* 16—7. H. viridi aeneus elytris striatis: puncto postico rufo, ano cupreo.

Habitat Tranquebariae D. Daldorff Mus. Dom. de Sehestedt.

Paruus. Caput et thorax viridi aenea, nitida, immaculata. Elytra imprimis ad latera striata, abbreviata puncto magno versus apicem rufo. Anus prominens cupro nitens.

*erythropterus.* 16—17. H. ater nitidus elytris striatis apice rufis. Oliv. 8. tab. 2. fig. 12. a. b.

Habitat Tranquebariae Daldorff Mus. Dom. de Sehestedt.

Affinis certe H. 2pustulato at distinctus videtur.

Caput et thorax atra, nitida, immaculata. Elytra striata, apice late rufa, qui color imprimis ad marginem exteriorem extenditur.

18—19. *H. ater nitidus laeuissimus elytris punctatis duobus albis. aguttatus.*

Habitat — — D. Seidelin Mus. Dom. Lund.  
 Medius. Caput et thorax atra, nitida, laeuissima, immaculata. Elytra laeuia punctis quatuor albis: exteriori marginali, interiori versus angulum ani.

**SPHAERIDIUM.** *Palpi* quatuor filiformes.

*Labium* quadratum, emarginatum.

*Antennae* claua perfoliata.

8—9. *S. atrum coleoptris obscure rufis: maculis quinque nigris. smaculatum.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo *S. glabrati*. Caput et thorax glabra, atra, nitida, immaculata. Elytra obscure rufa maculis tribus magnis nigris baseos maiori, communi.

29—30. *S. atrum nitidum elytris ferrugineis. Wintherae.*

Habitat in cortice *Canellae albae* Mus. Dom. Lund.

Corpus minutum. Caput et thorax atra laeuia, nitida, immaculata. Elytra laeuissima, ferruginea. Abdomen et pedes ferruginea.

OPATRUM. *Palpi antici* clauati: claua oblique truncata.  
*postici* filiformes.

*Labium* submarginatum.

*Antennae* moniliformes, extrorsum crassiores.

*bifurcum.* 1—2. O. obscurum thorace cornubus duobus incuruis subtus barbatis, capitis cornu erecto emarginato.

Habitat in Carolinae Boletis Dom. Bose.

Statura et magnitudo O. fabulosi. Caput fuscum cornu elevato, lato, capite longiore, apice truncato, emarginato. Thorax lineis elevatis in medio cornubus duobus porrectis, incuruis subtus barbatis. Margo valde denticatus. Elytra fusca lineis elevatis quatuor nodulosis. Pedes fusci.

Faemina capite mutico et thorace tuberculis tantum duobus loco cornuum.

*reticulatum.* 1—2. O. obscurum thorace depresso marginato, elytris cinerascensibus reticulatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Gigas in hoc genere. Caput fuscum ore subferrugineo. Thorax laevis, depressus, fuscus margine parum crassiore. Elytra cinerascensibus, reticulata.

*fuscum.* 1—2. O. griseum thorace plano marginato, elytris linea elevata unica subdentata.

Habitat in Hispania Prof. Abildgaard Mus. D.  
Lund.

Statura et summa affinitas *O. grisei*. Caput griseum. Thorax planus griseus, in medio canaliculatus margine dilatato, reflexo. Elytra grisea linea media eleuata, postice subdentata, quae tamen apicem haud attingit.

1—2. *O. fulcum* thorace plano marginato, elytris eleuato punctatis, *obscurum*.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Dom. Daldorff Mus.  
D. de Schestedt.

Statura praecedentium obscurem. Thorax marginatus, canaliculatus. Elytra plana punctatis plurimis eleuatis.

4—5. *O. griseum* thorace elytrisque laeuis, *depressum*.  
clypeo emarginato.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Statura et summa affinitas *O. glabrati* at duplo maior et clypeus emarginatus.

11—12. *O. atrum* punctatum tibiis anticis dilatatis dentatis, *subterraneum*.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.

Duplo maior *O. tibiali*. Corpus totum atrum, nitidum, punctatum. Pedes antici tibiis apice dilatatis, dentatis.

13—14. *O. nigricans* thorace laeui; margine integro, elytris crenato striatis, *strigatum*.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Corpus paruum totum griseo nigrum. Caput et thorax laeuis margine integro. Elytra crenato striata. Tibiae anticae simplices.

*canaliculatum.* 15—6. *O. cinereum* elytris striatis: striis muricatis.

Habitat Tranquebariae D. Daldorff Mus. D. de Sehefeldt.

Corpus paruum, totum griseum. Capitis clypeus integer. Thorax in medio canaliculatus, scaber. Elytra striata striis muricatis. Tibiae anticae dentatae.

**ERODIUS.** *Palpi* quatuor filiformes. *Maxilla* cornea, truncata, bifida.

*Labium* corneum, emarginatum.

*Antennae* moniliformes.

*muricatus.* 2—3. *E. gibbus* ater elytris muricatis.

Habitat ad Cap. B. Spei Mus. Dom. Lund.

Magnitudo et statura omnino *E. gibbi*. Caput et thorax laevia, atra. Elytra connata, atra, punctis magnis elevatis muricata.

**SCAURUS.** *Palpi* inaequales, filiformes.

*Maxilla* obconica, unidentata.

*Labium* corneum, integrum.

*Antennae* moniliformes.

*calcaratus.* 4. *Sc.* ater elytris stria lesquialtera femoribus anticis centibus duobus: exteriori maiore arcuato.



Habitat in Marocco Schousboe Mus. Dom. de Schelfedt.

Statura praecedentium. Thorax gibbus, laevis, ater. Elytra stria sesquialtera. Pedes antici parum longiores femoribus ante apicem dentibus duobus: exteriore multo maiore, validiore, acuto. Tibiae inermes.

5. S. ater elytris punctatis: lineis elevatis duabus, femoribus unidentatis. *punctatus.*

Habitat in Marocco Mus. D. Lund.

Statura praecedentium totus ater, distinctus elytris punctatis lineis duabus elevatis, integris. Femora unidentata. Tibiae inermes.

SCARITES. *Palpi* sex filiformes.

*Labium* corneum, dentatum.

*Antennae* moniliformes.

- 2—3. S. ater thorace rugoso elytris striatis. *grandis.*

Habitat in Brasilia Dom. Weber.

Magnus. Mandibulae porrectae, basi bidentatae. Thorax postice angustatus, rugosus, ater. Elytra striata. Tibiae anticae digitatae, intermediae rufo ciliatae, bidentatae, posticae rufo ciliatae.

- 4—5. S. ater nitidus elytris obscuris porcatis. *porcatus.*

Habitat in India orientali Mus. Dom. de Schelfedt.

Statura praecedentis. Caput atrum, nitidum fulcis duobus exaratum antennisque fulcis.

Thorax ater, nitidus puncto antico utrinque impresso. Elytra obscura, striata et inter strias punctis flavescentibus impressa. Pedes atri tibiis anticis palmato digitatis.

*spustulatus.*

8—9 S. ater elytris striatis; macula postica ferruginea.

Habitat in America boreali Mus. Dom. Hybner. Duplo maior Sc. arenario eiusdemque staturae. Caput et thorax laevia, atra, nitida. Elytra striata, nigra macula magna ante apicem ferruginea.

*cylindrus.*

8—9. S. ater nitidus thorace cylindrico, elytris crenato striatis, pedibus ferrugineis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Mandibulae vix exsertae. Caput et thorax subpunctata, atra, nitida. Elytra crenato striata. Abdomen et pedes ferruginea tibiis anticis digitatis.

**PIMELIA.** *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* unidentata.

*Labium* membranaceum, rotundatum, emarginatum.

*Antennae* filiformes, apice moniliformes.

*crenata.*

16—7. P. thorace glabro atra elytris striis tribus elevatis ferratis.

Habitat in Saffi D. Schousboe Mus. Dom. de Sehestedt.

Distincta omnino a *P. dentata*. Caput glabrum, atrum. Thorax glaber lateribus parum muricatis. Elytra atra, laevia lineis tribus elevatis, ferratis. Pedes nigri.

21—2. *P. thorace marginato atra elytris lineis planata*, duabus lateralibus elevatis.

Habitat Tangier Dom. Schousboe.

Corpus magnum laeve, atrum. Thorax planus, marginatus: marginibus rotundatis, nullo modo spinosis. Elytra connata, laevia lineis tantum duabus lateralibus, elevatis: interiore abbreviata. Pedes inermes.

24—5. *P. thorace marginato: marginibus re-variolosa*, flexis, elytris linea media elevata dentata.

*Blaps variolosa* Panz. In. Fn. Germ.

Habitat in Germania australiori Dom. Panzer.

Praecedentibus minor. Caput et thorax fusca, obscura, laevia thoracis marginibus reflexis. Elytra lineola baseos punctisque sparsis elevatis scabra. Linea media valde elevata, dentata, quae tamen apicem haud attingit. Pedes inermes.

31—2. *P. glabra atra elytris punctato striatis. punctata*.

Habitat Tangier Schousboe Mus. Dom. de Sehestedt.

Statura omnino *P. glabrae* at elytra punctato striata.

35. *P. globosa atrata elytris crenato striatis. pygmaea*,

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Minuta vix magnitudine Pediculi tota atra elytris punctato striatis.

BLAPS. *Palpi* quatuor clauati.

*Maxilla* recta, bifida.

*Labium* membranaceum, fissum.

*Antennae* apice moniliformes.

*obtusa.*

3—4. B. oblonga atra coleoptris obtusis laeuis. Habitat in Europa.

Statura et magnitudo B. mortifagae. Corpus totum atrum, laeuissimum, immaculatum. Elytra nullo modo acuminata.

*spinipes.*

5—6. B. ouata atra elytris laeuis, tibiis anticis apice dilatato spinosis.

Habitat in Hungaria Dom. Hybner.

Duplo maior B. buprestoides. Caput et thorax laeuissima, atra, immaculata. Elytra vix punctata. Tibiae anticae apice dilatatae, spinosae.

*calcarata.*

5—6. B. ouata atra elytris punctato striatis, femoribus anticis dentatis.

Habitat ad Cap. B. spei Dom. Weber.

Media. Caput et thorax laeuia, atra, immaculata. Elytra atra, punctato striata. Pedes antici elongati femoribus acute dentatis.

8—9. *B. ouata* depressa nigra thoracis marginibus dilatatis, tibiis quatuor anticis unidentatis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. de Paykull.

Corpus magnum, ouatum, depressum capite obtuso submarginato. Thorax latus, depressus, laevis, obscurus margine utrinque dilatato rotundato. Elytra connata, substrata, obtusa, apice inflexa. Tibiae quatuor antecae dente medio, valido obtuso.

8—9. *B. ouata* nigra thorace depresso marginato, *dilatata*, elytris crenato striatis.

Habitat in Insula St. Thomas Mus. Dom. Lund.

Magnitudo *B. emarginatae*. Antennae nigrae apice ferrugineae. Caput et thorax atra, laevis, nigra thoracis margine rotundato, dilatato, integro. Elytra striata striis crenatis.

11—12. *B. fusca* thorace marginato, elytris *li-undata*, neis tribus elevatis undatis.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura praecedentium olivaceo fusca. Caput et thorax laevis thoracis margine exserto, rotundato. Elytra striis tribus valde undatis, elevatis, quae tamen apicem haud attingunt. Pedes simplices.

12—13. *B. thoracis* margine incrassato, elytris *ferrata*, lineis tribus elevatis crenatis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. de Paykull.

Media. Caput obtusum, emarginatum. Thorax planus postice lineolis duabus antice co-

euntibus, eleuatis margineque valde eleuato, incrassato, subtus ferrulato. Elytra lineis tribus eleuatis, abbreviatis, crenatis. Corpus obscurum.

*tibialis.* 13—14. B. atra elytris striatis, tibiis anticis dilatato triangularibus.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. de Paykull.

Caput et thorax laeuia, atra, nitida. Elytra striata. Tibiae anticae apice valde dilatatae, triangulares.

**TENEBRIO.** *Palpi* inaequales.

*antici* clauati.

*postici* filiformes.

*Maxilla* bifida.

*Labium* truncatum, integrum.

*Antennae* moniliformes.

*violaceus.* 2—3. T. oblongus cyaneus thorace punctato elytris punctato striatis aeneis nitidis.

Habitat in Brasilia D. Weber.

Statura et magnitudo T. cyanei. Caput et thorax cyanea, punctata, nitida. Elytra striato punctata, aenea, nitida. Corpus cyaneum abdomine parum aeneo.

*aeneus.* 2—3. T. niger cupro nitens elytris substriatis aeneis.

Habitat in America meridionali Mus. Dom. Lund.

Statura magna praecedentium. Antennae nigrae. Caput et thorax immarginata, glabra, nigra cupro obscure nitida. Elytra striata, aenea, nitida. Corpus obscurum. Pedes inermes, nigri.

11—12. *T. oblongus ater nitidus elytris striatis. variabilis.*

Habitat in Tangier Dom. Schousboe Mus. Dom. Lund.

Corpus medium reliquis longius. Antennae obscurae, omnino moniliformes. Caput et thorax plana, laeua, atra, immaculata. Elytra striata triis laeuis. Pedes inermes. *Variat* corpore ferrugineo nullo modo distinctus.

15—6. *T. alatus laevis ferrugineus ore antennis-brunneus. que nigris.*

Habitat in Indiis Dom. Mauerhoff.

Statura omnino *T. culinaris* at duplo maior. Antennae breues, nigrae. Mandibulae exsertae, validae, nigrae. Caput et thorax laeua, glabra, ferruginea, immaculata. Pedes ferruginei.

19—20. *T. ater laevis capite rotundato. glabratus.*

Habitat in India orientali Dom. Lund.

Paruus, totus ater, glaber, nitidus. Clypeus rotundatus.

15—6. *T. ater elytris laeuis: macula baseos ellipticus, transuersa sanguinea.*

Habitat in Carolina sub arborum corticibus Dom. Bose.

Statura parua *T. mauritanicae*. Caput et thorax laeuia nigra, minime nitida, immaculata. Elytra laeuia, nigra, opaca macula magna bascos transuerfa, finuata fanguinea. Pedes nigri.

**TROGOSITA.** *Palpi* aequales: articulo ultimo truncato.

*Maxilla* unidentata.

*Labium* corneum, bifidum: laciniis rotundatis, ciliatis.

*Antennae* moniliformes: articulis tribus ultimis crassioribus, subcompressis.

*bicolor.* 1—2. *T. ferruginea* thoracis macula elytrisque nigris.

Habitat in America boreali Dom Mauerhoff.

Corpus medium. Caput ferrugineum antennis oculisque nigris. Thorax laeuis, glaber, ferrugineus macula media nigra. Elytra laeuia, nigra. Corpus ferrugineum pedibus nigris.

*picipes.* 1—2. *T. oblonga* nigra thorace punctato, pedibus piceis.

Habitat in Europa.



Corpus magnum in hoc genere totum nigrum  
pedibus piceis. Thorax punctatus dorso  
plano. Elytra vix striata.

- 1—2. *T. nigra* thorace ovali marginato, elytris *gigas*.  
crenato striatis.

Habitat in Guinea Mus. Dom. Lund.

Statura omnino *T. caraboides* at triplo maior.

Caput et thorax atra, obscura, vix puncta-  
ta. Elytra crenato striata. Tibiae omnes ob-  
solete ferratae.

- 5—6. *T. ferruginea* mandibulis porrectis recur-*cornuta*.  
uis corniformibus.

Habitat in Tanager Dom. Schousboe Mus. Dom.  
Lund.

Corpus paruum, totum ferrugineum. Capi-  
tis clypeus rotundatus in medio denticulis  
duobus breuibus, erectis. Mandibulae exser-  
tae, porrectae, reflexae, acutae, cornifor-  
mes. Thorax planus punctis duobus mag-  
nis dorsalibus, impressis. Elytra subtria-  
tata.

HELOPS. *Palpi* inaequales.

*antici* securiformes.

*postici* clauati.

*Labium* corneum inte-  
grum.

*Antennae* filiformes.

- 4—5 *H. niger* thorace elytrisque viridi aeneis cu-*micans*.  
pro striatis.

Habitat in America boreali Dom. Mauerhoff.  
 Statura omnino H. lanipes. Caput fuscum viridi cuproque micans antennis nigris. Thorax viridi aeneus lineis tribus strigaeque ante margines cupreis. Elytra striata, aenea lineis cupreis, latis micantibus. Corpus et pedes nigra.

*calcaratus.* 12—3. H. niger elytris punctato striatis obscure aeneus tibiis anticis acute dentatis.

Habitat in America Dom. Hybner.

Statura et magnitudo H. haemorrhoidalis. Caput et thorax obsolete punctata, nigra, obscure aenea. Pedes nigri tibiis anticis in medio acute dentatis. Alium paullo maiorem elytris atris, tibiis inermibus misit Dom. Hybner vix tamen distinctum.

*fasciculatus.* 13—14. H. niger obscurus elytris laevibus: punctis fasciculato pilosis ferrugineis.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.

Statura omnino H. luridi at minor. Caput obscurum. Thorax laevis marginibus rotundatis. Elytra haud striata punctis fasciculato pilosis, ferrugineis. Pedes inermes.

*Variat* magnitudine. Aetate pili evanescent.

*planus.* 21—2. H. oblongus planus thorace quadrato, elytris striatis.

Habitat in America Dom. Hybner.

Medius. Caput et thorax subtilissime punctata. Thorax planus, quadratus. Elytra crenato striata, nigra. Pedes inermes, nigri.

- 22—23. *H. ater* elytris punctato striatis antenna- *obliquatus*.  
rum ultimo articulo scutelloque rufis.  
Habitat in Carolina sub arborum corticibus  
Dom. Bose.  
Nimis affinis *H. Pimelia* ad corpus magis atrum  
et scutellum rufum.
- 23—4. *H. niger* elytris punctato striatis, femo- *femoratus*.  
ribus rufis.  
Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.  
Statura et magnitudo praecedentis. Caput et  
thorax laevia, obscura, nigra, immacula-  
ta. Elytra punctato striata. Pedes nigri fe-  
moribus rufis.
- 23—24. *H. niger* obscurus pedibus ferrugineis: *spinipes*.  
tibiis anticis dentatis.  
Habitat in America Dom. Hybner.  
Statura *H. nigratae* at duplo minor. Antennae  
nigrae. Caput et thorax nigra, obscura.  
Elytra striata. Pedes ferruginei tibiis anticis  
in media unidentatis.
26. *H. ferrugineus* elytris subvillosis striatis. *ferrugineus*.  
Habitat in Tanger D. Schousboe Mus. Dom.  
Lund.  
Statura et magnitudo *H. quisquillii*. Corpus to-  
tum ferrugineum, obscurum. Elytra sim-  
pliciter striata.

CARABUS. *Palpi sex: articulo ultimo obtuso, truncato.*

*Labium integrum, truncatum.*

*Antennae filiformes.*

*excellens.* 9—10. *C. apterus ater* thorace elytrisque cyaneis: margine aureo.

Habitat in Moldavia Mus. Dom. Lund.

Statura et magnitudo *C. cyanei*. Caput atrum, immaculatum. Thorax cyaneus margine exteriori late aureo. Elytra punctis intricatis rugosa, cyanea margine exteriori late aureo, nitido. Corpus atrum.

*melancholicus.* 28—9. *C. apterus obscurus* elytris fulcatis: fulcis laevibus.

Habitat in Tanger Dom. Schousboe Mus. Dom. Lund.

Statura et magnitudo praecedentium. Antennae nigrae apice piccae. Caput atrum oculis pallidis. Thorax cordatus linea dorsali bascosque utrinque impressa. Elytra obscura fulcata: fulcis abbreviatis linea eleuata, obsoleta. Corpus nigrum.

*maurus.* 49—50. *C. alatus ater nitidus* elytris striatis.

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Statura et magnitudo omnino *C. terricolae* at totus ater, immaculatus. Elytra simpliciter striata.

*spoliatus.* 61—2. *C. alatus aeneus* elytrorum margine pallido, antennis tibusque rufis.

*Carabus spoliatus* Ross. Fn. Etr. 1. 33.

Habitat in Marocco Dom. Schousboe.

Statura *C. marginati*. Caput aeneum ore antennisque rufis. Thorax cordatus basi utrinque lineolaque media impressis. Elytra striata aenea margine late pallido. Corpus nigro aeneum. Pedes ferrugini femoribus nigris.

68—9. *C. alatus niger elytris striatis: lunula basios maculaque postica testaceis. anotatus.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus paruum, nigrum. Antennae testaceae. Thorax cordatus, laevis. Elytra striata lunula in medio basios maculaque transversa postica testaceis. Pedes picci.

70—1. *C. alatus viridi aeneus elytris punctis quatuor impressis. spunctatus.*


Habitat in America boreali Dom. Mauerhoff.

Corpus paruum, viridi aeneum, antennis nigris. Elytra punctis quatuor secundum futuram impressa. Pedes obscure rufescentes femoribus nigris.

74—5. *C. alatus viridi aeneus antennis pedibusque nigris. festinans.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Minutus. Antennae nigrae articulo primo rufo. Caput postice attenuatum, viridi aeneum, immaculatum. Thorax cordatus, aeneus linea dorsali impressa. Elytra striata, viridia, apice truncata. Pedes nigri.



*rugosus.*

75—6. *C. apterus ater* thorace postice angustato rugoso, elytris fulcatis: fulcis rugosis.

Habitat in Guinea Dom. Lund.

Maximus. Antennae basi atrae, apice fuscae.

Palpi porrecti: articulo ultimo maiori, compresso, acuto. Thorax marginatus, postice angustatus, supra rugosus. Elytra connata, fulcata fulcis punctis elevatis vel potius rugis notatis. Corpus atrum.

*depressus.*

89—90. *C. alatus depressus punctatus niger* thorace subfulcato.

Habitat in Mauritania Dom. Schousboe, in India orientali Daldorff. Mus. Dom. de Scheffedt.

Medius. Antennae fetaceae, corpore breviores, griseae articulo primo maiori, incurvo, nigro. Caput magnum, atrum, punctatum. Thorax depressus, postice angustatus, punctatus, fulcisque aliquot impressus. Elytra punctata, plana, nigra. Pedes nigri.

*hilaris.*

92—3. *C. alatus flavus* elytris striatis nigris: fasciis duabus flavis; posteriore terminali.

Habitat in India orientali Daldorff. Mus. Dom. Lund.

Statura et magnitudo fere *C. amaculati*. Caput flavum, immaculatum. Thorax postice angustatus, laevis margine antico posticoque atro. Elytra striata, postice truncata, atra fascia media, lata, flava, quae tamen futuram haud attingit. Fascia postica

angustior, terminalis. Pectus atrum. Pedes flavi.

94—5. *C. apterus ater obscurus elytris striatis, caliginosus.*  
antennis.

*Carabus caliginosus* Spec. Inf. 1.

Habitat in America.

Corpus magnum, totum obscure nigrum. Antennae totae testaceae. Thorax laevis lineis nullis impressis. Elytra striata.

95—96. *C. apterus ater thorace linea utrinque impressus.*  
baseos impressa, elytris striatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Paullo minor *C. striola* totus ater, nitens. Caput utrinque ante oculos impressus. Thorax glaber, nitens linea dorsali baseosque utrinque impressa. Elytra striata. Pedes nigri.

102—3. *C. apterus thorace viridi aeneo, elytris posticus.*  
striatis: macula postica pedibusque flavis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus medium. Caput et thorax laevis, glabra viridi aenea. Elytra striata, nigra macula postica fulva. Corpus atrum pedibus fulvis.

126—7. *C. alatus ater capite thoraceque cupreis, tricolor.*  
elytris striatis aeneis.

Habitat Kiliae Dom. Weber.

Statura *C. cuprei* at paullo maior. Caput cupreum ore antennisque nigris. Thorax transuersus, cupreus linea media lineolisque utrinque duabus baseos impressis. Elytra striata, viridia, nitida. Corpus atrum.

- integer.* 128—9. *C. alatus ater nitidus elytrorum striis laevissimis, antennis pedibusque ferrugineis.* Habitat in Americae Insulis Dom. v. Rohr.  
*C. lato maior et omnino distinctus. Caput et thorax atra, laevia, nitida. Elytra striata striis laevissimis. Antennae et pedes ferruginei.*
- alpinus.* 128—9. *C. alatus ater elytris striatis: disco ferrugineo.*  
*Carabus alpinus* Payk. Monogr. 115. 73.  
 Habitat in Sueciae alpibus Mus. Dom. Paykull. Medius. Antennae nigrae articulo primo rufo. Caput atrum. Thorax ater linea media punctisque baseos impressus. Elytra striata obscure rufa margine futuraque nigris. Corpus atrum. Pedes ferruginei.
- St. Crucis.* 139—40. *C. alatus niger elytris striatis pallidis: macula communi dorsali fusca.*  
 Habitat in Americae Insulis Dom. v. Rohr.  
 Statura praecedentis. Caput et thorax atra, nitida, laevia antennis mandibulisque rufis. Elytra striata, pallida macula magna, communi, dorsali, fusca. Pedes pallidi.
- palliatus.* 145—6. *C. alatus nigro aeneus elytris striis duabus punctorum impressorum: margine pedibusque pallidis.*  
 Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.  
 Statura parva praecedentium. Caput nigro aeneum, obscure nitidum ore antennisque testaceis. Thorax immaculatus. Elytra sub-



striata punctisque impressis in duplici serie  
marginisque exteriori pallido. Pedes pallidi.

- 156—7. *C. alatus niger* ore antennisque pedibusque *flavilabris*,  
rufis, elytris subfinuatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Affinis praecedenti at distinctus et paullo ma-  
ior. Elytra striata, apice sinuata.

- 157—8. *C. alatus niger* elytris vitta abbreviata *semivitta-*  
interrupta alba. *tus.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Paruus. Caput atrum ore antennisque piceis.

Thorax transuersus, ater, immaculatus. Ely-  
tra striata, nigra, vitta media pone medium  
interrupta, apice dilatata, sinuata, quae ta-  
men elytrorum apicem haud attingit. Pedes  
picei.

- 160—1. *C. thorace rotundato rufo*, elytris atris: *2vittatus*,  
vittis duabus abbreviatis albis.

Habitat in America Dom. Hybner.

Statura parua praecedentium. Caput atrum.

Thorax rufus, nitidus, immaculatus. Ely-  
tra apice fere emarginata, atra vittis duabus  
abbreviatis albis exteriori breuiore. Corpus  
nigrum.

- 181—2. *C. alatus ater* elytris striatis: punctis *4pustula-*  
duobus albis. Linn. *syft. Nat.* 2. 673. 39. *tus.*

Paykull *Monogr.* 91. 56.

*Carabus 4guttatus* Panz., *Fn. Germ. Init.* 40.  
tab. 5.

Habitat in Europa boreali.

Omnino distinctus a *C. 4maculato*.

- smaragdulus.* 184—5. *C. alatus* coerulefcenti micans elytris puncto poftico antennis pedibusque teftaceis. Habitat in India orientali Dom. Daldorff.  
Corpus paruum atrum. Caput et thorax lae-  
uia, glabra, coeruleo micantia. Elytra ftri-  
ata, coeruleo micantia puncto poftico tefta-  
ceo. Pedes teftacei.
- cruciger.* 185—6. *C. alatus* ater elytris ftriatis bafi futura-  
que ferrugineis.  
Habitat in Saxonia.  
Paruus. Antennae ferrugineae, apice nigrae.  
Caput nigrum. Thorax niger linea media  
impreffus. Elytra ftriata, nigra bafi futura-  
que ferrugineis. Pedes ferruginei.

**CICINDELA.** *Palpi* fex filiformes.  
*poftici* pilofi.

*Labium* corneum, tri-  
dentatum.

*Antennae* fetaceae.

- cyanocephala.* 2—3. *C. thorace* elongato cylindrico rufa capi-  
te elytrorumque fasciis duabus cyaneis.  
Habitat in India orientali Dom. de Seheftedt.  
Corpus paruum, elongatum. Antennae fer-  
rugineae. Caput cyaneo atrum, nitidum.  
Thorax valde elongatus, cylindricus, antice  
parum anguftatus, rufus, immaculatus. Ely-  
tra vix ftriata, rufa fascia parua bafeos alte-  
raque pone medium latiore cyaneis. Corpus  
fubtus cinereo villofum.

10—11. *C. hirta* viridi aenea elytris fascia lunu-*sinuata*.  
 usque duabus, albis.

*Cicindela sinuata* Panz. Fn. Germ.

Habitat in Germania australiori.

Affinis certe *C. hybridae* at duplo minor. Caput viridi aeneum labio albo. Thorax viridi aeneus, albo hirtus. Elytra viridia lunula bateos, fascia media sinuata lunulaque lata apicis albis. Corpus aeneum albo-hirtum.

21—2. *C. nigra* elytris punctis duobus margina-*obscura*.  
 libus lunulaque apicis albis.

Habitat in America boreali Dom. Hirshel.

Statura et magnitudo *C. germanicae*. Caput nigrum labio flavo. Thorax niger lateribus vix albidis. Elytra nigra puncto marginali in ipsa basi, altero marginali in medio lunulaque apicis albis. Corpus nigrum.

21—2. *C. capite thoraceque cupreo nitidis, ely-*micans**.  
 tris obscuris: punctis minutis lunulaque apicis albis.

Habitat in America boreali.

Statura omnino praecedentis et forte eius mera varietas. Caput fuscum, cupro micans labio albo. Thorax fuscus, cupro micans. Elytra fusca, obscura punctis aliquot minutis lunulaque apicis albis. Corpus cyaneum.

30—1. *C. cuprea* elytris virescentibus: margine *longipes*.  
 dentato ranoque flexuoso albis, pedibus posticis longissimis.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentis. Antennae aeneae. Caput et thorax obscure cuprea, immaculata. Elytra obscuriora margine toto albo. Ad basin dens flexuosus, in medio ramus maior et versus apicem denticuli duo. Corpus viridi aeneum pedibus posticis longissimis.

*futuralis.* 31—2. C. viridi aenea elytris albis: futura lunulaque viridi aeneis.

Habitat in America St. Thomas. Mus. Dom. Lund.

Parua. Caput viridi aeneum mandibulis atris labioque albo. Thorax viridi aeneus utrinque pilis albis hirtus. Elytra laevia, alba futura aenea, quae ad basin valde dilatatur. Praeterea in medio ramum parvulum emittit et pone hanc lunulam retroflexam et ramulum includentem. Corpus aeneum lateribus albo hirtis.

*angulata.* 33—4. C. viridi cuprea elytris punctatis viridibus: lunulis duabus ramoque flexuoso medio flavescentibus.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Statura omnino C. trifasciatae. Caput viridi cupreum mandibulis antennisque aeneis. Labium obscure flavescens. Thorax viridi cupreus. Elytra punctata, viridia lunula bascos apicisque ramoque flexuoso medio obscure albido.

*obscura.* 33—4. C. nigra pedibus flavescentibus.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Statura parua *C. angulatae*. Caput cum antennis fuscum oculis valde prominentibus aureis. Thorax rotundatus et elytra nigra, immaculata. Corpus nigrum. Pedes flavescentes, apice nigri.

- 33—4. *C. oblecta* margine exteriori triramoso *melancholica*  
punctoque postico albis. *ca.*

Habitat in Guinea Dom. Lund.

Parua. Caput obscurum, cupro parum nitidum labio transuerso albo, immaculato. Thorax rotundatus, obscurus. Elytra obscura margine ramos tres paruos exferente albo. Punctum album ante apicem.

- 37—8. *C. thorace cylindrico ferruginea elytrorum futura abbreviata fusca, abdomine atro.* *cylindricolis.*

Habitat in Marocco Dr. Schousboe.

Cum *C. emarginata* figura et genere conuenit:

Caput ferrugineum antennarum articulo primo longiori fere fracto. Thorax cylindricus, ferrugineus, immaculatus. Elytra laeua, pallidiora futura ultra medium fusca, qui color basi apiceque dilatatur. Abdomen atrum. Pedes ferruginei.

**ELAPHRUS.** *Palpi sex filiformes.*

*Labium rotundatum, acuminatum, integrum.*

*Antennae setaceae.*

- 3—4. *E. niger* pedibus rufis.

*atratus,*

Habitat in America Dom. Hybner.

Magnitudo praecedentis. Caput nigrum lineis duabus impressis. Elytra striata, nigra. Pedes rufi.

**DYTISCUS.** *Palpi* fix filiformes.

*Labium* corneum, truncatum, integrum.

*Antennae* setaceae.

*lateralis.*

6—7. *D. niger* capitis antico thoracis elytrorumque margine flavis.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Reliquis minor et distinctus. Caput nigrum, antice flavum. Thorax niger margine exteriori flavo. Elytra laevia striis duabus e punctis minutissimis exarata, olivacea margine flavo et in hoc margine lineolae duae e punctis minutis nigricantibus a medio ad apicem ductae. Subtus obscure ferrugineae.

*brunneus.*

34—5. *D. supra ater* subtus brunneus.

Habitat Tangier D. Schousboe Mus. Dom. Lund.

Magnitudo et statura omnino *D. maculati*. Caput, thorax, elytra laevia, glabra, brunnea, immaculata. Corpus atrum. Pedes brunnei.

*haemorrhoidalis.*

38—9. *D. ater* capite thorace elytrorumque apicibus ferrugineis.

Habitat in Germaniae aquis.

*D. notato* paullo minor. Antennae ferrugineae. Caput et thorax laevia, ferruginea, imma-

culata. Elytra laevia, nigra litura baseos apicibusque ferrugineis. Corpus atrum pedibus ferrugineis.

40—1. *D. gibbus ater nitidus capite elytrorum-scriptus. que striis flavis.*

Habitat in Indiae aquis Dom. Daldorff.

Paruus, gibbus. Caput flavum, immaculatum.

Thorax niger. Elytra laevia, nitida, atra striis plurimis basi coeuntibus flavis. Corpus nigrum pedibus piceis.

**GYRINUS.** *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* cornea, unidentata, acutissima.

*Labium* emarginatum.

*Antennae* cylindricae.

8. *G. niger elytris striatis, subtus ferrugineus ab-* *minutus.*  
dominis medio nigro.

Habitat in Europae aquis Mus. Dom. Bosc.

Minutus. Caput nigrum punctis quatuor impressis. Thorax niger lineola transversa, impressa. Elytra striata nigra margine subtus ferrugineo. Corpus ferrugineum abdominis segmento tertio quartoque nigris. Pedes ferruginei.

5—6. *G. laevis niger opacus elytris ante apicem* *indus.*  
unidentatis.

Habitat in Indiae aquis Dom. Daldorff.

Statura omnino et magnitudo *G. micans*, cuius forte mera varietas. Differt tamen ely-

tris ante apicem unidentatis. Corpus supra nigrum, opacum, laeve. Abdomen lateribus ferrugineis. Pedes postici ferruginei.

*nitidulus.* 9. *G. ater nitidus* elytris punctato striatis ano pedibusque rufis.

Habitat in Indiae aquis Dom. Daldorff.

Magnitudo *G. minuti*. Corpus atrum, nitidum. Elytra punctato striata, abdomine breuiora. Anus et pedes rufa.

**NOTOXUS.** *Palpi* quatuor securiformes.

*Maxilla* unidentata.

*Antennae* filiformes, extrorsum crassiores.

*Rhinoceros.* 7—8. *N. thorace* in cornu supra caput protenso, elytris atris immaculatis.

Habitat in Germania Mus. Dom. de Schestedt.

Praecedentibus duobus adhuc minor. Antennae fere longitudine corporis filiformes, ferrugineae. Thorax ferrugineus cornu medio, magno, supra caput protenso, in medio coarctatum, apice ferratum. Elytra laeua, nigra, immaculata. Pedes ferruginei.

*pedestris.* 9—10. *N. ater nitidus* thorace ferrugineo, femoribus anticis dentatis.

*Notoxus pedestris* Ross. Fn. Etr. 1.

Habitat in Italia Dom. Hybner.

Statura omnino *N. floralis* et eiusdem certe generis at triplo maior. Antennae extrorsum



paullo crassiores, nigrae, basi ferrugineae.  
 Caput globosum, atrum, nitidum. Tho-  
 rax postice angustatus, rufus, nitidus, in-  
 maculatus. Elytra laeua, atra, nitida. Pe-  
 des nigri femoribus basi rufis, anticis uni-  
 dentatis.

10—11. *N. ater nitidus thoracis limbo ferru- limbatus,*  
*gineo.*

Habitat Kiliae.

Statura et magnitudo *N. floralis*. Corpus to-  
 tum atrum, nitidum solo thoracis limbo fer-  
 rugineo.

12. *N. pilosus ater thorace obscuro, elytris pun- hirtellus,*  
*cto baseos ferrugineo.*

*Notoxus hirtellus* Panz. Fn. Germ. 35. tab. 3.

Habitat in Germaniae Dom. Panzer.

Affinis certe *N. florali* at distinctus videtur.

Corpus totum pilosum, atrum. Thorax  
 obscurus. Elytra puncto tantum baseos rufo.

13. *N. laeuis testaceus capite nigro.* *populneus.*

*Notoxus populneus* Panz. Fn. Germ. 35. tab. 4.

Habitat in Germaniae Populo Dom. Panzer.

Minutus. Corpus testaceum. Caput nigrum.

CANTHARIS. *Palpi securiformes.*

*Maxilla bifida.*

*Labium integrum.*

*Antennae filiformes.*

3—4. *C. thorace marginato nigro, ore abdomi- abdomina-*  
*neque flavis, elytris coerulefcentibus.* *lis.*

Habitat in Galliae Alpibus Dom. Brogniart.

Statura omnino *C. fuscae*. Caput et thorax atra, nitida. Os flavescens mandibulis sanguineis. Elytra laevia, obscura, coerulescentia. Abdomen flavescens pedibus nigris.

*triflis.*

11—12. *C. thorace marginato* obscure fusca antennarum primo articulo pallido.

Habitat in Galliae Alpibus Dom. Brogniart.

Minor *C. fusca*. Antennae fuscae articulo primo incurvo, ferrugineo. Thorax, elytra, corpus fusca, obscura, immaculata. Pedes nigri.

*diadema.*

12—13. *C. thorace marginato* nigra fascia suboculis thoracisque margine rufo.

Habitat in America boreali Dom. Mauerhoff.

Statura praecedentium. Caput nigrum subtus fasciaque sub antennis rufis. Thorax planus, marginatus, niger margine rufo. Elytra laevia, nigra, immaculata. Corpus et pedes nigra.

*dimidiata.*

19—20. *C. thorace marginato* testacea elytris dimidiato cyaneis.

Habitat in Ceylonia Dom. de Paykull.

Statura et magnitudo *C. melanocephalae*. Antennae nigrae, basi testaceae. Caput et thorax laevia, testacea, nitida, immaculata. Elytra laevia, testacea, apice cyanea. Corpus testaceum ano nigro. Pedes testacei plantis nigris.

27—8. *C. thorace marginato testaceo: macula 2vittata.*  
 oblonga nigra, elytris testaceis: vittis dua-  
 bus postice coeuntibus nigris.

Habitat ad Cap. B. spei Mus. Dom. Lund.

Media. Antennae nigrae. Caput nigrum, in-  
 ter antennis ferrugineum. Thorax testa-  
 ceus macula magna, oblonga, dorsali, ni-  
 gra. Elytra laevis, testacea vittis duabus  
 nigris, ante apicem coeuntibus. Corpus ni-  
 grum abdomine testaceo. Pedes testacei.

29—30. *C. thorace marginato rufo, elytris te- bicolor.*  
 staceis, corpore nigro.

Habitat in Selandia Mus. Dom. Lund.

Media. Antennae fuscae, basi ferrugineae,  
 Caput et thorax laevis, ferruginea, imma-  
 culata. Elytra laevis, testacea. Corpus ni-  
 grum. Pedes ferruginei femoribus posticis  
 basi nigris.

29—30. *C. thorace marginato capiteque testaceo sericea.*  
 nigroque variis elytris viridibus.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff Mus. D.  
 Lund.

Statura parva *C. nitidulae*. Antennae testaceae,  
 apice nigrae. Caput testaceum macula mag-  
 na, media, nigra. Thorax testaceus ma-  
 culis tribus nigris. Elytra sericea, viridia,  
 immaculata. Corpus nigrum pedibus te-  
 staceis.

MALACHIUS. *Palpi* filiformes: articulo ultimo setaceo.  
*Maxilla* unidentata.  
*Labium* rotundatum, membranaceum.  
*Antennae* filiformes.

- elegans*, 4—5. *M. viridis* ore elytrorumque apicibus rufis.  
*Malachius elegans* Oliv. Inf. 27. 6. 5. tab.  
 Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.  
 Paullo minor *M. 2pustulato* totus aeneus solo ore elytrorumque apicibus rufis.
- amaculatus*, 7—8. *M. ater* thorace rubro, elytris sanguineis; maculis duabus cyaneis.  
 Habitat in America boreali Dom. Hybner.  
 Medius. Antennae nigrae, basi rufae. In altero sexu articulus tertius quartusque dilatati, difformes. Caput nigrum. Thorax rufus, immaculatus. Elytra glabra, sanguinea maculis duabus cyaneis, altera bascos, altera apicis maiore. Corpus atrum.
- viridipennis*, 7—8. *M. pubescens* rufus elytris pectoreque viridiaensis.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Paykull.  
 Statura omnino praecedentium. Caput rufum, immaculatum. Thorax rufus macula media obscura. Elytra viridia, nitida, immaculata. Corpus rufum pectore viridi,
- thoracicus*, 7—8. *M. ater* thorace rufo immaculato.  
*Malachius thoracicus* Oliv. Inf. 27. 8. 8. tab.  
 Habitat in Gallia Dom, Bosc.

Paruus, totus ater, nitidus solo thorace tibiisque posticis rufis.

9—10. *M. cyaneus* thoracis margine abdominis *abdomin-*  
que basi rufis. *lis.*

Habitat in Mogador Dom. Schousboe Mus.  
Dom. Lund.

Paruus. Caput cyaneum ore ferrugineo. Thorax cyaneus margine late ferrugineo. Elytra laevia, cyanea, nitida. Abdomen rufum ano cyaneo. Pedes cyanci.

13—14. *M. ater* ore thoraceque rufis, elytrorum *limbatus.*  
margine futuraque albis.

Habitat Tangier Dom. Schousboe Mus. Dom.  
Lund.

Minutus. Caput nigrum ore antennisque rufis. Thorax rufus, nitidus. Elytra glabra, atra futura margineque exteriori albis, quae postice coeunt.

DERMESTES. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* bifida.

*Labium* corneum, obtusum, integrum.

*Antennae* clauato perfoliatae.

4—5. *D. niger* glaber scutello pedibusque testaceis, antennis claua solida elongata. *Megatoma.*

*Megatoma Schaefferi* Herbst. Coleopt.

Habitat in Germania Dom. Hybner.



Affinis certe *D. macellario* cuius varietatem sexus diu credidi. Differt imprimis antennarum claua elongata, cylindrica, solida. Corpus glabrum, nigrum scutello pedibusque testaceis.

- frontalis.* 20—1. *D. oblongus* niger capite elytrorum puncto apiceque pedibusque ferrugineis.  
 Habitat in Gallia Dom. Brongiard.  
 Medius. Caput cum antennis rufum. Thorax laevis, niger, immaculatus. Elytra laevis, nigra puncto paruo baseos apiceque rufis. Pedes rufi.
- crenatus.* 41—2. *D. ouatus* testaceus thorace crenato.  
 Habitat Hafniae Dom. Lund,  
 Corpus paruum, ouatum, testaceum thoracis margine prominulo, crenato.
- 2pustulatus.* 47. *D. ouatus* ater elytris abbreviatis macula pedibusque sanguineis.  
 Habitat in Suecia Dom. de Paykull.  
 Statura et magnitudo praecedentium. Antennae ferrugineae claua perfoliata, nigra. Caput, thorax, corpus atra. Elytra truncata, abbreviata, laevis, atra macula magna, sanguinea. Pedes sanguinei.

**PTILINUS.** *Palpi* quatuor subaequales.

*Maxilla* brevis, bifida.

*Labium* membranaceum, submarginatum.

*Antennae* flabellatae.

3—4. Pt. testaceus immaculatus elytris laevissimis. *Dorcatoma*.

*Dorcatoma* Herbst. Coleopt.

Habitat in Germania Dom. Hybner.

Corpus paruum, gibbum, testaceum, immaculatum. Caput inflexum. Antennae elongatae, testaceae articulis tribus ultimis altero latere valde prominentibus, acutis. Proprii forte generis mihi haud rite examinatus.

5. Pt. niger elytris striatis. *ferratus*.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner,

Praecedentibus minor. Caput inflexum. Antennae valde ferratae, valde flabelliformes, nigrae. Thorax laevis margine deflexo.

**NITIDULA.** *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* cylindrica, membranacea.

*Labium* cylindricum.

*Antennae* claua solida,

6—7. N. ovata pallida pedibus flavescentibus. *pallida*.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Parua tota laevis, glabra, pallida pedibus folis flavescentibus.

*fasciata.* 22—3. N. thorace testaceo: macula atra, elytris testaceis: fascia media nigra testaceo punctata.

Habitat in Holsatia.

Statura parua N. liturae. Caput testaceum, immaculatum. Thorax testaceus macula magna baseos atra. Elytra testacea, glabra fascia lata media nigra puncto uno alterone testaceo.

*humeralis.* 26—7. N. nigra nitida elytris dimidiatis: puncto baseos rufo.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentium. Caput et thorax punctata, atra, nitida. Elytra dimidiata nigra puncto paruo, rufo ad basin. Pedes rufi.

*quadrata.* 27—8. N. nigra elytris dimidiatis pallidis: litura communi fulca.

Habitat Cajennae Dom. Curier.

Parua. Caput et thorax nigra, immaculata. Elytra abdomini dimidio breuiora litura magna communi fusca. Pedes rufi.



HETEROCERUS. *Palpi* breues, fili-  
formes.

*Maxilla* unidentata  
longitudine  
palporum.

*Labium* late emar-  
ginatum.

*Antennae* breues,  
recuruae: articu-  
lo tertio quarto-  
que cordatis, ul-  
timis ferratis.

1. *H. villosus fuscus* elytris fasciis tribus undatis *marginatus* ferrugineis.

*Heterocerus marginatus* Ent. syst. 1. 262, 41.

Bosc. Act. Soc. Hist. Nat. Paris. 1. tab. fig.

Habitat Halae Saxonum Dom, Hybner in Gal-  
lia Mus, D. Bosc,

2. *H. villosus fuscus* elytris macula marginali *fer-dubius*,  
ruginea.

Habitat Tranquebariae Mus. D. de Schestedt.

Paullo praecedente minor. *Antennae* breues,  
crassae huius generis videntur. *Caput et tho-*  
*rax villosa, fusca, immaculata. Elytra vil-*  
*losa, fusca macula marginali punctoque uno*  
*alteroue disci ferrugineis. Pedes breues ti-*  
*biis apice dilatatis ferratis. An potius*  
*Parnus.*

ANTHRENUS. *Palpi* inaequales, filiformes.

*Maxilla* membranaea, linearis, bifida.

*Labium* corneum, integrum.

*Antennae* claua solida.

*Gloriosae.* 4—5. *A. cinereo villosus* elytris nigris: fascia media cinerea.

Habitat in India orientali Mus. Dom. de Sehestedt.

Statura et magnitudo *A. Verbasci*. Caput et thorax cinereo villosa. Elytra laevia, nigra fascia in medio lata, cinerea.

*maculatus.* 6—7. *A. ater* ferrugineo maculatus.

Habitat in America Dom. Hybner.

Statura parva praecedentis. Corpus supra atrum maculis ferrugineis, sparsis, subtus ferrugineo pubescens.

COCCINELLA. *Palpi* *antici* securiformes.

*postici* filiformes.

*Labium* cylindricum.

*Antennae* claua solida.

*diaphana.* 3—4. *C. subrotunda* thorace coleoptrisque testaceo diaphanis immaculatis.

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

Corpus paruum, nigrum. Thorax coleoptraque testacea diaphana, plana, immaculata.

3—4. *C. obscure testacea pubescens oculis nigris. pubescens.*  
 Habitat in India orientali Dom. Daldorff.  
 Minuta tota obscure testacea, pubescens oculis  
 folis nigris.

7—8. *C. subrotunda coleoptris testaceis imma- discolor.*  
*culatis, thorace albo basi punctisque duobus*  
*atris.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura praecedentium. Caput album, imma-  
 culatum. Thorax albus basi late punctisque  
 duobus in medio distinctis atris. Coleoptra  
 immaculata. Corpus nigrum.

8—9. *C. subrotunda flavescens thorace punctis cinctis,*  
*quatuor nigris.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentium at distincta.

Corpus flavescens thorace punctis quatuor  
 nigris. 2. 2. Margo elytrorum parum ob-  
 scurior.

Variat rarius puncto uno alteroue nigro.

13—14. *C. coleoptris rubris: fascia lata nigra; dor- simacu-*  
*punctis duobus rufis.* *la.*

Habitat in India orientali Mus. Dom. de Sehe-  
 stedt.

Media. Caput et thorax atra, nitida, oculo-  
 rum orbita thoracisque margine tenuissime  
 albis. Elytra laevia, basi rufa lineola parua  
 ad futuram nigra pone medium lata, atra  
 puncto distincto, rufa, apice rufa. Corpus  
 nigrum.

Affinis videtur *C. unifasciatae*.

*suturalis.* 16—17. *C. testacea* coleoptris futura vittisque duabus abbreviatis atris.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Parva subrotunda. Caput et thorax testacea, immaculata. Elytra glabra, testacea vitta lata, media, abbreviata futuraque atris. Corpus testaceum.

*varians.* 29—30. *C. coleoptris* flavescentibus: puncto communi fasciisque duabus apicis nigris.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Affinis *C. cingulatae* at distincta videtur. Caput atrum punctis duobus albis. Thorax ater nitidus angulo antico albo. Elytra flavescentia puncto communi baseos futura fasciisque duabus sinuatis ante apicem atris. Corpus nigrum.

Variat interdum puncto uno alteroue ad basin elytrorum.

*gnotata.* 48—9. *C. coleoptris* rubris: punctis nigris novem, capite thoracisque margine albis.

*Coccinella gnotata* Herbst. Coleopt.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Distincta omnino a sequente. Caput album, immaculatum. Thorax ater, nitidus margine antico ad latera imprimis albus. Elytrorum puncta 1. 2. 1. et communi baseos.

*laeta.* 61—2. *C. coleoptris* rubris: punctis nigris tredecim, thorace atro margine punctisque duobus albis.

Habitat in Mogadore Dom. Schousboe Mus. Dom. Lund,

**Corpus paruum.** Caput album margine postico punctisque duobus frontalibus atris. Thorax ater margine antico lateralique, antico lineam mediam abbreviatam exferente punctisque duobus dorsalibus, albis. Elytra rufa punctis nigris sex 1. 2. distantibus, 2. obliquis, 1 et baseos communi. Corpus atrum.

80—1. *C. coleoptris rufis*: striga abbreviata al-*strigata*.  
bida.

Habitat in Tanger Dom. Schousboe Mus. D. Lund.

Parua, tota obscure rufa striga fere obsoleta pallida in medio coleoptrorum, quae tamen margines hinc attingit.

93—4. *C. coleoptris nigris immaculatis*, capite *capitata*.  
ano pedibusque rufis.

*Szymus* Schneider.

Habitat in Suecia Dom. Paykull.

Affinis *C. anah*, at distincta videtur. Caput rufum. Thorax et elytra nigra, villosa, immaculata. Corpus nigrum ano rufo. Pedes rufi.

93—4. *C. coleoptris atris immaculatis rufa tho-* *nigrita*.  
race postice atro.

Habitat Tranquebariae Daldorff Mus. Dom. Lund.

Media. Caput rufum oculis nigris. Thorax ater margine antico inprimis ad latera rufus. Elytra gibba, laeuis, atra, nitida. Corpus cum pedibus rufum.

- rufipes.* 101—2. *C. coleoptris nigris*: macula magna marginali pedibusque rufis.  
 Habitat in Europa australi Dom. Vahl Mus. Dom. Lund.  
 Corpus paruum, ovatum. Caput et thorax nigra, immaculata. Elytra atra, nitida macula magna, marginali, rufa, quae fere ad futuram extenditur. Pedes omnes rufi.
- pustulata.* 110—11. *C. coleoptris nigris*: punctis albis duodecim. Linn. syst. Nat. 2. 585. 45.  
 Habitat in Europae hortis.  
 Margo elytrorum albus.
- argulata.* 116—7. *C. coleoptris atris*: annulis duodecim flavis.  
 Habitat in Africa Mus. Dom. Bosc.  
 Media. Caput et thorax fulva, immaculata. Elytra nitida, atra annulis sex. 2. 2. 2. ultimis obliquis contiguis, distinctis, flavis. Corpus fulvum.
- vulpina.* 116—7. *C. coleoptris atris*, punctis octo flavis lunulisque quatuor rubris.  
 Habitat in India Dom. Daldorff.  
 Magna in hoc genere. Caput album. Thorax ater, nitidus angulo antico albo. Elytra atra, nitida lunulis duabus magnis marginalibus, rufis: anteriore sinuata punctisque quatuor albis ad futuram. 1. 1. 2. Corpus atrum pedibus albis.

CASSIDA. *Palpi antici clauati.*

*postici filiformes.*

*Labium elongatum, integrum.*

*Antennae moniliformes.*

9—10. *C. brunnea* clypei elytrorumque margine *brunnea*.  
ferrugineo.

Habitat Cajennae D. Curier.

Omnino distincta a *C. limbata* maior et magis rotundata. Corpus brunneum. Clypeus et elytra punctata, obscure brunnea margine ferrugineo.

9—10. *C. supra rubra* thorace lineis tribus, ely *vittata*,  
tris vitta interrupta atris.

Habitat in Heluetia Dom. de Clairville.

Distincta omnino a *C. murraea* duplo minor.

Antennae, corpus, pedes atra, immaculata.

Clypeus rufus apice pallidior. Lineae tres latae, atrae, abbreviate: exterioribus marginalibus antice fere coeuntibus. Elytra laevia, rubra futura vittaque lata interrupta nec apicem attingente atris.

13—4. *C. elytris flavis nigro punctatis: futura ornata*.  
ferruginea margineque pallido.

Habitat in India orientali Mus. Dom. de Scheffelt.

Corpus paruum, flavescens. Clypeus flavescens linea media, cuspidata, brunnea, quae tamen marginem anticum haud attingit margineque late pallido. Elytra flava punctis

septem nigris tribus futura brunnea contiguus. Margo late pallidus.

*brachiata.* 16—7. *C. obscura* margine pallido: fascia media obscura.

Habitat — — Mus. Dom. Lund.

Statura omnino praecedentium. Antennae nigrae articulo primo ferrugineo. Clypeus rotundatus, obscurus, immaculatus. Elytra obscura margine pallido et in hoc margine fascia obscura. Sutura parum pallescit.

*6notata.* 18—9. *C. flavescens* elytris punctis tribus nigris. Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Magnitudo *C. nebulosae*. Corpus totum flavescens elytris punctis tribus longitudinaliter dispositis nigris.

*scripta.* 21—2. *C. testacea* thorace maculis sex, elytris plurimis atris.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo *C. jamaicensis*. Antennae obscurae. Thorax rotundatus, integer punctis quatuor dorsalibus maculaque solitaria utrinque marginali atris. Elytra striato punctata, testacea maculis plurimis variis, atris. Corpus testaceum pedibus nigris.

*gibba.* 21—2. *C. obscure rufa* elytris gibbosis: maculis nigris numerosissimis.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura et magnitudo omnino *C. cribrariae* at omnino distincta. Clypeus antice subemarginatus, obscure rufus margine tenuissime pun-



Etisque duobus dorsalibus obsoletis nigris. Elytra punctata, in medio clauata, gibba maculis numerosissimis, fuscis. Margo etiam tenuissime niger. Pedes rufi.

22. *C. rufescens* thorace punctis nouem, elytris *clathrata*.  
clathratis nigro maculatis.

Habitat in India orientali Mus. D. de Sehestedt. Statura et magnitudo *C. deustae*. Antennae flavae, apice nigrae. Corpus flauescens abdominis medio nigro. Clypeus rotundatus, integer, pallide rufus punctis nouem nigris 4. 3. 2. ultimis duobus in ipsa basi. Elytra striata, rufa et inter strias puncta magna impressa. Versus basin macula magna, transuersa, communis, in medio macula distincta et versus apicem macula altera communis transuersa. Praeterea maculae tres marginales, ultima in ipsa apice.

- 24—5. *C. clypeo elytrisque* griseis: margine pal-*bicolor*.  
lidiore, corpore atro.

Habitat in America boreali Dom. Mauerhoff. Statura *C. margaritaceae* at paullo maior. Corpus atrum pedibus totis testaceis.

- 30—1. *C. flauescens* elytris tuberculatis medio *clauata*.  
nodosis fuscis: maculis duabus lateralibus pallidis.

Habitat in America boreali Dom. Hirshel.

Statura et magnitudo *C. cinctae*. Corpus flauescens, immaculatum. Antennae flauescentes articulo ultimo fusco. Clypeus pallidus

macula baseos obscuriore. Elytra fusca, in medio tuberculo communi punctisque plurimis, eleuatis, sparsis, atris. Maculae duae pallidae in margine, altera in medio maiori, altera in apice.

*chinesis.* 42—3. *C. testacea* margine pallidior: macula nigra.

Habitat in China Mus. Dom. Lund.

Statura praecedentium. Antennae testaceae articulo ultimo nigro. Elytra basi parum eleuata, subrugosa, testacea margine pallidior macula pone medium atra. Corpus testaceum.

*transuersa.* 52—3. *C. rufa* elytrorum margine futura vitta media lineolaque utrinque transuersa nigris.

*Cossida clathrata* Linn. syst. Nat. 2. 576. 16.

Habitat — — Mus. Dom. Lund.

Magnitudo praecedentium. Clypeus rotundatus, breuis, rufus, immaculatus. Elytra laeuis margine, vitta media futuraque nigris. Inter vittam et marginem exteriorem in medio linea transuersa, nigra, quae fere et vittam et marginem exteriorem attingit. Corpus obscureum.

*venosa.* 56—7. *C. nigra* thorace immaculato, coleoptorum disco rufo reticulato: margine maculato.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Magna. Clypeus niger, immaculatus, vix emarginatus. Coleoptra nigra, cyaneo parum nitida disco rufo reticulato margine utrinque

interne maculis quatuor, externe tribus minoribus, approximatis, rufis. Corpus nigrum.

- 67—8. *C. clypeo cupreo, elytris viridi aeneis: 12 pustulata,*  
maculis sex rubris.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Media. Corpus nigrum. Clypeus submarginatus, cupreus, immaculatus. Elytra punctata, viridi aenea punctis sex primo in ipsa curvatura bascos ad scutellum, reliquis 2. 2. 1. Maculae interiores elytrorum interdum confluunt.

**CHRYSOMELA.** *Palpi sex extrorsum crassiores.*

*Labium corneum, integrum.*

*Antennae moniliformes.*

- 18—9. *C. supra obscure aenea thorace glaberrimo, elytris vage punctatis. obscurata.*

Habitat in Germania Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo *C. Bankii*. Caput et thorax obscure aenea, nitida, glaberrima thoracis margine nullo modo incrassato. Elytra vage punctata. Antennae, corpus, pedes nigra, immaculata.

- 28—9. *C. obscure testacea elytris punctis sex 14 guttata.*  
albis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.

Magnitudo et statura *C. Staphylaeae*. Caput et thorax obscure brunnea, immaculata. Elytra subtilissime striato punctata, obscure brunnea punctis sex albis 2. 2. 2. Corpus obscure brunneum.

*ebraea.*

29—30. *C. atra nitida* elytris albis: maculis variis atris.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Lund.

Statura praecedentis paullo minor. Caput et thorax glabra, atra, nitida, immaculata. Elytra laevia, pallida macula magna, suturali, atra et in hac puncta duo alba. Versus apicem puncta tria nigra 2. 1. Corpus nigrum.

*exclamatio-  
nis.*

53—4. *C. ovata* thorace pedibusque ferrugineis, coleoptris flavis: striis novem atris; exterioribus interruptis abbreviatisque.

Habitat in America boreali Dom. Prof. Smidt Barton.

Statura et magnitudo *C. stolidae*. Caput ferrugineum, immaculatum. Thorax laevis, ferrugineus margine antico pallido. Scutellum ferrugineum. Elytra laevia, flava sutura striisque quatuor nec apicem, nec basin, attingentibus atris. Stria ultima basium cum tertia coit, nec ultra medium extenditur et puncto distincto terminatur.

*6 notata.*

63—4 *C. nigra* thorace elytrisque pallidis: punctis duobus nigris.

Habitat in Tanager Dom. Schousboe Mus. Dom. Lund.

Statura et magnitudo omnino praecedentis.

Caput pallidum, nigro varium. Thorax pallidus, nitidus punctis duobus nigris. Elytra vix striata, pallida punctorum pari in medio. Corpus nigrum. Pedes pallidi femoribus apice puncto nigro.

63—4. *C. pallida* thorace punctis duobus, elytris striis quibusdam punctatis nigris. *ely-aegrota.*

Habitat in Hispania Mus. Dom. Lond.

Statura omnino *C. pallidae*. Caput pallidum margine postico nigro. Thorax laevis, pallidus, nitidus punctis duobus nigris. Elytra laevis, pallida striis plurimis nigris quibusdam punctatis, ante apicem coeuntibus.

70—1. *C. oblonga* nigra thoracis margine antico elytrisque flavis nigro maculatis. *marmorata.*

Habitat Cajennae Dom. Cuvier.

Statura et magnitudo *C. lapponicae*. Caput nigrum antennis basi flavis. Thorax ater laevis nitidus margine antico tridentato, flavo dente intermedio minore. Versus marginem posticum lineola transversa, flava. Elytra laevis flava lineolis maculisque variis nigris. Pedes flavi femoribus nigris.

70—1. *C. oblonga* ferruginea elytris maculis quatuor fasciaeque media nigris. *cajennensis.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura et magnitudo omnino *C. lapponicae*. Caput obscure ferrugineum linea frontali antennisque nigris. Thorax oblongus, obscure ferrugineus, immaculatus. Elytra lae-

uia, ferruginea pari macularum ad basin fascia media maculisque duabus posticis 1. 1. nigris. Corpus ferrugineum.

*sumptuosa.* 85. *C. nitidissima* capite thoraceque aeneis, elytris violaceis.

Habitat in Insula Trinidad Dom. Ryan Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo omnino *C. auratae*. Caput et thorax subtilissime punctata, aenea, nitidissima. Elytra glaberrima, violacea, nitidissima. Corpus viridi aeneum.

*bulgharensis.* 109—110. *C. oblonga* cyanea nitida elytris vage punctatis, antennis fuscis.

*Chrysomela bulgharensis* Schrank. Enum.

Habitat in Germania Dom. Daldorff.

Omnino distincta videtur. Corpus cyaneum, nitidum. Thorax planiusculus margine incrassato. Elytra vix punctata. Pedes cyanei. Antennae fuscae articulis 3. 4. ferrugineis.

**CRIOCERIS.** *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* bifida.

*Labium* corneum, integrum.

*Antennae* filiformes.

*pallida.* 110—111. *C. pallida* antennis pectoreque nigris.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Parua. Antennae nigrae, basi pallidae. Caput, thorax, elytra, laevia, glabra, pallida, immaculata. Corpus pallidum pectore nigro. Pedes pallidi.

1—2. *C. ferruginea* pectore clytrorum fasciis 2 *spinosa*.  
duabus pedibusque nigris.

Habitat in Africa Dom. Bose.

Magna, crassa. Caput cum antennis et thorax glabra, ferruginea, immaculata. Elytra laevia, ferruginea fascia duabus nigris altera in medio, altera apicis, futura connexis. Corpus ferrugineum pectore pedibusque nigris.

Variat sexu tuberculis coleoptorum duobus ba-  
feos approximatis, elevatis, compressis.

35—6. *C. fusca* capite clytrisque atris, thorace *bicolor*.  
pedibusque rufis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Maior *C. melanopa* et distincta. Caput atrum ore rufo antennisque fuscis. Thorax laevis rufus, nitidus. Elytra laevia, atra, nitida, immaculata. Corpus fuscum pedibus rufis.

10—11. *C. nigra* thorace ferrugineo: lineola dor- *lineola*.  
fali nigra, clytris pallidis.

*Crioceris lineola* Panz. Fn. Germ. 34. tab. 5.

Habitat in Germania Dom. Panzer.

Statura *C. Betulae* at paullo minor. Antennae ferrugineae apice obscuriores. Caput nigrum. Thorax pallide ferrugineus lineola lata dorsali nigra, quae tamen nec basin nec apicem attingit. Elytra laevia, pallida. Abdomen et pedes ferruginea.

10—11. *C. glabra* atra clytris punctatis, pedi- *glabrata*.  
bus rufis.

*Crioceris glabrata* Panz. Fn. Germ. 34. tab. 6.

Habitat in Germania Dom. Panzer.

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae subferrugineae. Thorax rotundatus margine medio prominulo subspinoso. Elytra punctata. Corpus nigrum pedibus rufis.

LEMA. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* cornea, bifida.

*Labium* membranaceum, bifidum.

*Antennae* filiformes.

- apustulata*. 1. L. nigra elytris maculis duabus testaceis.  
*Crioceris apustulata* Ent. syst. 1. 2. 5. 15.  
 Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.
- impressa*. 2. L. atra elytris rubris.  
*Crioceris impressa* Ent. syst. 1. 2. 6. 16.  
 Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.
- brunnea*. 3. L. ferruginea antennis pectore abdominisque basi nigris.  
*Crioceris brunnea* Ent. syst. 1. 2. 6. 17.  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.
- retusa*. 4. L. thorace ferrugineo, elytris testaceis: lineola baseos atra.

---

Lemae corpus paruum, oblongum, immarginatum, tardum, capite ovaro, exserto, oculis prominulis, rotundatis, lateralibus, antennis thorace longioribus in cantho anteriori oculorum inferis, thorace cylindrico, saepius impresso, scutello parvo, rotundato, elytris longitudine abdominis, pedibus mediocribus, tenuibus, tarsis quadriarticulatis, colore vario.



*Crioceris retusa* Ent. syst. 1. 2. 6. 18.

Habitat in Insula Guadeloupe Mus. Dom. Bosc.

5. L. supra rubra subtus nigra.

*merdigera.*

*Crioceris merdigera* Ent. syst. 1. 2. 6. 19.

Habitat in Europae Convallaria.

6. L. rubra elytris punctis sex nigris.

*12punctata.*

*Crioceris 12punctata* Ent. syst. 1. 2. 7. 20.

Habitat in Europae Asparago.

7. L. thorace fulvo: punctis quinque nigris, elytris flavis: punctis septem.

*14punctata.*

*Crioceris 14punctata* Ent. syst. 1. 2. 7. 21.

Habitat in Germania Dr. Schulz.

8. L. thorace rufo, elytris flavis: fasciis duabus *ruficollis* nigris.

*Crioceris ruficollis* Ent. syst. 1. 2. 7. 22.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

9. L. nigra thorace rufo, coleoptris flavescen- *5punctata*. tibus: maculis quinque nigris.

*Crioceris 5punctata* Ent. syst. 1. 2. 7. 23.

Habitat in Germania Dr. Schulz.

10. L. rufa coleoptris maculis quatuor nigris: *nigricornis*. duabus communibus.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura *C. ruficollis* at minor. Antennae nigrae articulo primo rufo. Caput et thorax rufa, immaculata. Elytra crenato striata, rufa puncto humerali maculisque duabus communibus, altera in medio, altera versus apicem cyaneo nigris.

11. L. rufa elytris apice atris.

*praeusta.*

*Crioceris praeusta* Ent. syst. 1. 2. 8. 25.

Habitat Mus. Dom. Lund.

*unifasciata.* 12. *L. rufa* elytris fascia atra.

*Crioceris unifasciata* Ent. syst. 1. 2. 8. 26.

Habitat in noua Hollandia Mus. Dom. Banks.

*2fasciata.* 13. *L. rufa* elytris fasciis duabus atris.

*Crioceris 2fasciata* Ent. syst. 1. 2. 8. 27.

Habitat in noua Hollandia Mus. Dom. Banks.

*nigripes.* 14. *L. flaua* antennis pectore pedibusque nigris.

*Crioceris nigripes* Ent. syst. 1. 2. 8. 28.

Habitat in noua Hollandia Mus. Dom. Banks.

*tranquebarica.* 15. *L. rufa* elytris punctato striatis cyaneis.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff Mus. D. Lund.

Statura praecedentium. Corpus totum rufum elytris folis punctato striatis cyaneis.

Varietas chinensis antennis pedibusque nigris, nullo modo differt.

*melanura.* 16. *L. rufa* elytris punctato striatis apice cyaneis.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Caput rufum antennis nigris. Thorax cylindricus, rufus, immaculatus. Elytra punctato striata, rufa, apice late cyanea. Corpus rufum pedibus nigris.

*cyanea.* 17. *L. viridis* elytris striato punctatis cyaneis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Paullo maior *L. cyanellae*. Caput viridi antennis oculisque nigris. Thorax utrinque subspinosus strigis duabus impressis viridis, ni-

tidus, immaculatus. Elytra punctato striata, violacea. Corpus et pedes nigra.

18. L. thorace rufo elytris cyaneis margine fasciisque media flavis. *Solani.*  
 Habitat in Carolinae Solano nigro Dom. Bosc. Statura praecedentium. Caput cum antennis nigrum. Thorax cylindricus, rufus, immaculatus. Elytra punctato striata, nitida margini laterali fasciisque media flavis. Corpus nigrum abdomine flavo.
19. L. coerulea antennis pedibusque nigris. *cyanella.*  
*Crioceris cyanella* Ent. syst. 1. 2. 9. 55.  
 Habitat in Europae plantis.
20. L. coerulea thorace pedibusque rufis. *melanopa.*  
*Crioceris melanopa* Ent. syst. 1. 2. 10. 36.  
 Habitat in Europa boreali.
21. L. nigra thorace pedibusque flavis. *flavipes.*  
*Crioceris flavipes* Ent. syst. 1. 2. 10. 37.  
 Habitat in Germania.
22. L. nigra capite thorace pedibusque rufis thorace spinolo. *subspinosa.*  
*Crioceris subspinosa* Ent. syst. 1. 2. 10. 38.  
 Habitat in Europae Betula.
23. L. atra nitida antennarum basi pedibusque rufipes. *rufipes.*  
*Crioceris rufipes* Ent. syst. 1. 2. 10. 39.  
 Habitat in Germaniae fruticibus.
24. L. thorace rubro: punctis duobus nigris, coleopttris flavis: cruce punctisque quatuor nigris. *Asparagi.*

*Crioceris Asparagi* Ent. syst. 1. 2. 10. 41.

Habitat in Europae Alparago.

*campestris.* 25. L. nigro coerulescens thoracis limbo rufo, elytris punctis tribus: posticis margine flavo connexis.

*Crioceris campestris* Ent. syst. 1. 2. 10. 44.

Habitat in Europae australiori.

*equestris.* 26. L. capite thoraceque testaceis, elytris brunneis: margine lineola baseos fasciaque media flavis.

*Crioceris equestris* Ent. syst. 1. 2. 10. 47.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

GALLERUCA. *Palpi* sex: articulo ultimo acuto.

*Labium* bifidum.

*Antennae* moniliformes.

*brunnea.* 4—5. G. punctata testacea elytrorum margine tenuissime abdomineque nigris.

Habitat in America Dom. Hybner.

Statura omnino G. flavicornis at minor. Corpus totum porrectum, testaceum, margine elytrorum subtus abdomineque nigris. Pedes postici elongati at femora laud incrassata, vix saltatoria.

*viridis.* 5—6. G. thorace aeneo nitido, elytris punctatis obscure viridibus antennis testaceis.

Habitat in Carolinae Quercu Dom. Bosc.

Statura G. flavicornis at paullo minor. Caput viridi aeneum antennis flavis. Thorax lae-

nis, aeneus, nitidus. Elytra punctata, viridia, obscura. Corpus et pedes nigra.

6—7. *G. supra ferruginea elytris apice lunula tranquebarica.*  
*cyanea. rica.*

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Magna. Antennae nigrae articulo octavo in altero sexu longiori, apice dilatato, primo ferrugineo. Caput ferrugineum. Thorax ferrugineus puncto utrinque impresso. Elytra laevia, glabra ferruginea, apice lunula magna, cyanea. Corpus et pedes atra.

14—5. *G. oblonga cyanea antennis oculis pedibusque nigris.* *Lausoniae.*

Habitat in Lawsonia spinosa Indiae orientalis Daldorff.

Nimis affinis *G. Bassiae* at paullo minor et oculi semper nigri. Corpus supra cyaneum, nitidum.

20—1. *G. capite thoraceque testaceis fusco maculatis, elytris viridibus.* *sericea.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Affinis videtur *G. tricolor*. Antennae testaceae. Caput obscure testaceum macula magna, verticali, fusca. Thorax obscure testaceus maculis tribus fuscis. Elytra sericea, viridia, nitida. Corpus testaceo griseum.

53—4. *G. flavelescens elytris ferrugineis: margine punctisque duobus albis.* *melanocephala.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura et magnitudo praecedentium. Pedes mihi desunt et forte saltatorii. Caput ni-

grum. Thorax pallidus, nitidus, immaculatus. Elytra laevia, ferruginea margine apice dilatato punctisque duobus dorsalibus albis.

*aeruginea.* 53—4. *G. pallida* elytris viridibus, capite pectoreque nigris.

*Cistela aeruginea* Ent. syst. 1. 1. 46. 27. A.

Habitat in Aeschynomene Africae floribus, quos destruit.

*albicornis.* 53—4. *G. capite* thoraceque, fulvis, elytris nigris: fasciis duabus albis.

Habitat in St. Domingo Insula Dom. Brongiart. Statura et magnitudo *G. denticornis* haud saltatoria. Antennae albae articulis prioribus duobus nigris. Caput et thorax laevia, glabra, fulva, immaculata. Elytra laevia nigra fasciis duabus undatis, albis, altera in medio, altera versus apicem. Corpus nigrum.

*limbata.* 54—5. *G. saltatoria* nigra thoracis limbo elytrorum margine vittaque fulvis.

Habitat in Tangier Dom. Schousboe.

Statura et magnitudo *G. caroliniana*. Caput cum antennis nigrum. Thorax scaber, niger margine omni fulvo. Elytra coerulea, nitida margine exteriori vittaque dorsali quae ante apicem cum margine coit fulvis. Corpus nigrum femoribus posticis valde compressis, incrassatis.

*fasciata.* 55—6. *G. saltatoria* pallida elytris cyaneis: fascia pallida.

Habitat in St. Domingo Insula Dom. Brongiart.

Magna in hac familia. Antennae basi pallidae, apice fuscae. Caput et thorax pallida, immaculata. Elytra laevia, glabra, cyanea, nitida: fascia lata pallida, versus futuram attenuata. Corpus pallidum femoribus posticis incrassatis, cyaneis.

57—8. *G. saltatoria nigra* thorace anoque rufis. *collaris*.  
Habitat in America Dom. Hybner.

Statura et magitudo praecedentium. Caput cum antennis nigrum, immaculatum. Thorax rufus macula una alteraque dorsali, nigra. Elytra glabra, nigra, immaculata. Abdomen nigrum ano rufo. Pedes nigri femoribus posticis incrassatis.

57—8. *G. saltatoria ferruginea* capite elytrisque cyaneis. *cyanipennis*.

Habitat in St. Domingo Insula Dom. Brongiart.  
Caput nigrum fronte fulva. Thorax laevis, glaber, ferrugineus, immaculatus. Elytra laevia, cyanea, immaculata. Corpus ferrugineum. Pedes nigri femoribus posticis incrassatis, ferrugineis.

63—4. *G. saltatoria nigra* thorace elytrorumque *abbreviata*. fasciis duabus albis.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Magna in hac familia. Caput nigrum fronte late alba. Thorax albus, nitens, immaculatus. Elytra violacea, nitida fasciis duabus latis albis, quae tamen nec marginem nec futuram attingunt. Corpus nigrum abdomini pallidiore. Pedes nigri.



*strata.* 66—7. *G. saltatoria ferruginea* capite thoraceque albis, elytris ferrugineis: punctis albis quatuor simplicibus.

Habitat Cajennae Dom. Cuvier.

Statura omnino et summa affinitas *G. albicollis*. Caput album antennis ferrugineis. Thorax albus nitidus, immaculatus. Elytra laevia, ferruginea punctis quatuor albis 1. 2. 1. annulo obscuriori cinctis. Corpus ferrugineum.

*liturata.* 69—70. *G. saltatoria supra pallida*: elytris linea media atra.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Media. Antennae nigrae basi pallidae. Caput et thorax pallida, immaculata. Elytra laevia, pallida, nitida basi litura, in medio linea atris. Corpus nigrum pedibus pallidis. Femora postica valde incrassata, ferruginea apice nigra.

*indica.* 71—2. *G. saltatoria cyanea* capite thorace pedibusque rufis.

Habitat in India orientali Mus. Dom. de Scheffelt.

Media. Caput et thorax rufa, immaculata. Elytra cyanea, immaculata. Corpus nigricans pedibus rufis femoribus posticis incrassatis.

*flavicollis.* 72—3. *G. saltatoria coerulea* nitens thorace pectore pedibusque pallidis.

Habitat in America australi lecta inter Cocos Caeti Mus. Dom. Lund.



**Media.** Caput cyaneum. Thorax glaber, nitidus, pallidus. Elytra laevia, cyanea, nitida. Pectus pallidum. Pedes pallidi.

72—3. *G. saltatoria* ovata atra elytris testaceis *gibba*.  
apice nigris.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

**Media**, reliquis magis *gibba*. Caput et thorax atra, immaculata. Antennae testaceae. Elytra laevia, glabra, nitida, testacea, apice nigra. Corpus nigrum femoribus posticis incrassatis.

93—4. *G. saltatoria* atra capite thoraceque rufis. *dimidiata*.  
thorace puncto medio nigro.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura et magnitudo *G. rufipis*. Caput cum antennis rufum. Thorax rufus puncto medio nigro. Elytra striata, atra. Corpus pedesque nigra.

119—20. *G. saltatoria* nigro aenea elytris vitta *elongata*.  
albida.

Habitat in America boreali Dom Smith Barton.

Parua at reliquis longior. Antennae mihi defunt. Caput et thorax nigro aenea, immaculata. Elytra laevia vitta media, lata, albida. Corpus nigro aeneum femoribus posticis valde incrassatis.

ENDOMYCHUS. *Palpi* quatuor inaequales: articulo ultimo truncato.

*Labium* elongatum, corneum, integrum.

*Antennae* apice moniliformes.

- cruentus*. 1. *E. fanguineus* thorace immaculato, clytris punctis tribus nigris.  
*Galleruca cruenta* Ent. syst. 1. 2. 19. 30. \*  
 Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.
- coccineus*. 2. *E. thorace fanguineo*: macula nigra, clytris fanguineis: maculis duabus nigris.  
*Galleruca coccinea* Ent. syst. 1. 2. 20. 31. \*  
 Habitat in Europae borealis Corylo.
- cruciatus*. 3. *E. ruber* coleoptris cruce nigra.  
*Galleruca cruciata* Ent. syst. 1. 2. 20. 32. \*  
 Habitat Halae Saxonum.
- 4pustulatus*. 4. *E. niger* thoracis margine elytrorum maculis duabus pedibusque rufis.  
*Galleruca 4pustulata* Ent. syst. 1. 2. 20. 33. \*

---

Endomychi corpus paruum, depressiusculum, glabrum, tardum, capite exserto, ovato, plano, oculis vix prominulis, rotundatis lateralibus, antennis thorace longioribus, distantibus, ante oculos insertis, thorace plano, marginato: margine subreflexo, scutello minuto, rotundato, elytris abdomine longioribus deflexis, pedibus, breuibus, validis, tarsis quadriarticulatis: penultimo bifido, colore nitido.

Habitat in Germaniae Lycoperdis.

5. *E. ater nitidus* antennis pedibusque rufis. *Bouiffae.*  
*Galleruca Bouiffae* Ent. syst. 1. 2. 20. 34. \*  
 Habitat in Germaniae Lycoperdo Bouiffa.

**EROTYLUS.** *Palpi* quatuor inaequales,

*antici* securiformes.

*postici* clauati.

*Labium* corneum, dilatatum, emarginatum.

*Antennae* perfoliatae.

- 14—5. *E. ater* elytris flauis: fascia media lata atra. *unifasciatus.*  
 Habitat — — Mus. Dom. Lund.

Medius. Caput et thorax laeuia, atra, immaculata. Elytra basi apiceque flaua, in medio fascia lata, atra. Sutura margoque tenuissime nigra. Corpus et pedes nigra.

- 18—9. *E. flauescens* elytris nigris: margine omni flauescente. *marginatus.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura omnino *E. surinamensis*. Antennae elongatae clauatae claua compressa nigrae, basi flauescentes. Caput flauescens vertice obscuriori. Thorax marginatus, depressus, flauescens, immaculatus. Elytra punctata, nigra margine suturaque flauescantibus. Corpus flauescens.

*Palpi* antici filiformes. *Antennae* claua compressa, vix perfoliata. Forte proprii generis.

*tristis.*23—4. *E. oblongus niger elytris cyaneis.*

Habitat — —

Praecedentibus duplo minor et distinctus. Caput et thorax nigra, immaculata. Elytra striata, cyanea. Pedes nigri plantis fuscis.

CEBRIO, *Palpi* quatuor filiformes.*Maxilla* membranacea, vix unidentata.*Labium* apice palpigerum.*Antennae* filiformes.*ruficollis.*3. *C. fuscus* thorace femoribusque rufis, elytris testaceis,

Habitat in Marocco Schousboe Mus. Dom. Sehestedt.

Affinis certe *C. gigas* at minor. Caput nigrum. Thorax villosus, rufus lateribus fuscis. Elytra substriata, pallida. Pedes fusci femoribus omnibus crassis rufis.

CISTELA, *Palpi* quatuor filiformes.*Maxilla* unidentata.*Labium* membranaceum, bifidum.*Antennae* filiformes.*fuscata.*22—3. *C. nigra* elytris striatis, antennis pedibusque testaceis,

Habitat Kiliae,

Media. Caput et thorax fusca, immaculata.

Antennae testaceae. Elytra striata, fusca.

Pedes testacei.

- 25—6. *C. nigra* thorace marginato: margine *marginata*.  
rufo.

Habitat in Dalecarliae Alpibus Dom. Paykull.

Reliquis magis rotundata. Caput nigrum antennarum articulo primo rufo. Thorax marginatus, rotundatus, margine anteriori et laterali rufo. Elytra laevia, nigra. Corpus nigrum.

ZONITIS. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* palpis longior, integra.

*Labium* emarginatum.

*Antennae* sericeae.

1. *Z. thorace* mutico rufo, elytris pectoreque *nigripennis*.  
nigris.

Habitat in Marocco Mus. Dom. Lund.

Summa affinis *Z. praeustae*. Differt tamen elytris totis pectoreque nigris.

*Variat* forte sexu elytris apice tantum nigris pectore tamen semper nigro.

2. *Z. thorace* rufo elytris viridibus.

*viridipennis*.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Lund.

Minor *Z. flavae*. Caput atrum antennis fuscis. Thorax gibbus, rufus, nitidus, immaculatus. Elytra sublaevia, viridia. Pectus atrum. Abdomen rufum. Pedes nigri.

*piazata.* 7—8. *Z. ferruginea* elytris testaceis: vitta lata atra.

Habitat in Carolina Dom. Bosc.

Statura praecedentium. Caput ferrugineum antennis nigris. Maxillae exsertae longitudine corporis. Thorax punctatus, ferrugineus, immaculatus. Elytra laeuis, testacea vitta lata nigra, quae tamen basin haud attingit. Corpus ferrugineum. Pedes nigri femoribus ferrugineis. Variat sexu ore thorace corporeque nigris.

SAGRA. *Palpi* quatuor inaequales, filiformes.

*Maxilla* cornea, unidentata,

*Labium* breue, corneum, rotundatum, ciliatum, fissum,

*Antennae* cylindricae.

*triflis.* 1—2. *S. obscure viridis* femoribus obscure bidentatis, tibiis unidentatis,

Habitat Cajennae.

Statura et summa affinitas praecedentis. Antennae corpore breuiores, cyanae. Caput, thorax, elytra, corpus obscure viridia, minime nitida. Abdomen subtus basi macula media villosa, ferruginea. Femora postica incrassata basi interiori macula magna aurea apice bidentata dente posteriori longiore. Tibiae incuruae apice unidentatae,

**CRYPTOCEPHALUS.** *Palpi* quatuor  
filiformes.

*Maxilla* uni-  
dentata.

*Labium* cor-  
neum, inte-  
grum.

*Antennae* fili-  
formes.

17—8. *C. glaber* ater elytris punctis sex albis, *6guttatus*.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

Paullo minor *C. Gorteriae*. Caput atrum, im-  
maculatum. Thorax ater margine antico et  
lateralis pallido. Elytra substriata atra pun-  
ctis trium parium albis. Corpus nigrum.

32—3. *C. thorace* atro albo trilineato, elytris *variabilis*.  
rubris: punctis tribus nigris.

*Cryptocephalus variabilis* Schneid. Magaz. 2.

Habitat in Germaniae Salice.

Affinis certe *C. cordigero*, cuius varietatem  
olim credidi. Antennae nigrae, basi flaves-  
centes. Caput nigrum puncto inter anten-  
nas flavo. Thorax ater, nitidus, lineis tri-  
bus albis exterioribus fere marginalibus mar-  
gine tamen ipso tenuissime atro, intermedia  
basi dilatata: lineola nigra. Elytra rubra,  
punctis tribus nigris. Corpus nigrum.

Numerus punctorum in elytris variat 2. 3. 4.

32—3. *C. niger* thorace lineis tribus flavis, *trilineatus*,

Habitat in Germania.

Statura C. bothnici at duplo maior. Antennae nigrae, basi flavae. Caput nigrum macula magna, frontali, flava. Thorax niger lineis tribus latis flavis cum margine antico flavo cocuntibus. Elytra vix punctata, nigra. Pedes flavi.

*atratus.* 34—5. C. ater nitidus antennis ferrugineis.

Habitat in America Dom. Hybner.

Statura omnino C. obscuri at duplo minor. Antennae ferrugineae: articulo ultimo nigro. Thorax laevis, glaber, ater, nitidus. Elytra punctato striata, nitida, immaculata. Pedes nigri.

*luridus.* 34—5. C. niger obscurus elytris subreticulatis.

Habitat in America boreali Dom. Mauerhoff.

Medius. Caput obscurum antennis longioribus tenuissimis. Thorax obscurus, mox immaculatus, mox margine obscure cinereo. Elytra rugosa, mox immaculata, mox cinereo varia. Corpus obscurum.

*imperialis.* 44—5. C. ater nitidus elytris testaceis: punctis quinque nigris.

*Cryptocephalus imperialis* Laichart. Tyrol.

Habitat in Gallia Mus. D. Bosc.

Statura et magnitudo omnino C. 6punctati. Antennae nigrae articulo 2. 3. 4. testaceis. Caput et thorax atra, immaculata. Elytra laevis, testacea punctis quinque nigris 2. 2. 1.

*ornatus.* 44—5. C. rufus elytris flavis: vittis duabus abbreviatis atris.



Habitat in Carolina Mus. Dom. Bosc.

Corpus maiusculum, rufum. Antennae supra nigrae, subtus rufae. Caput et thorax rufa, glabra, nitida. Elytra punctato striata, flava margine futuraque tenuissime vittisque duabus latis atris, quarum exterior apicem haud attingit, interior ante apicem cum futura coit. *Mas* minor, pallidior.

44—5. *C. rufus* elytris nigro flauoque variis. *congestus.*

Habitat in Carolina Dom. Bosc.

Praecedente minor. Antennae nigrae, basi ferrugineae. Caput rufum, Thorax laevis, rufus margine lineolisque duabus baseos flauis. Elytra punctato striata, nigra margine maculisque variis numerosis, flauis. Corpus rufum,

54—5. *C. supra* testaceus oculis atris. *Lundii.*

Habitat Tranquebariae Mus. D. de Sehestedt.

Statura praecedentium. Caput, thorax, elytra laeua, glabra, testacea, immaculata oculis solis nigris. Corpus nigrum, mox testaceum,

54—5. *C. capite* thoraceque rufis nitidis, elytris flauis: vitta lata atra. *Sehestedii.*

Habitat Tranquebariae Mus. D. de Sehestedt.

Corpus paruum, gibbum. Caput rufum antennis elongatis fuscis. Oculi nigri. Thorax gibbus, rufus, nitidus margine parum flauescente. Elytra punctato striata, flava vitta lata, atra, quae apicem haud attingit. Abdomen nigricans margine flauo. Pedes flau.

*VahlII.*

54—5. *C. rufus* thorace maculis duabus atris, elytris atris: fascia punctoque rufis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff Mus. Dom. Lund.

Medius. Caput rufum oculis cinereis. Thorax glaber, rufus, nitidus maculis duabus magnis, oblongis, atris. Elytra subtilissime punctato striata atra fascia media rufa, quae ad futuram extenditur. Versus apicem punctum paruum, rufum. Corpus rufum.

*postulatus.* 58—9. ater thoracis margine antico elytrorumque basi maculisque tribus rubris.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.

Medius. Caput nigrum ore fronteque rufis. Thorax glaber, ater, nitidus margine antico lateralique rufo. Elytra substriata, basi dentata maculis duabus in medio lunulaque media ante apicem rufis aut potius elytra rufa fasciis duabus dentatis futura lineaque media connexis, nigris. Corpus nigrum pedibus rufis.

*coloratus.* 71—2. *C. niger* thorace fuluo: punctis quatuor nigris, elytris testaceis: lineola baseos punctisque duobus nigris.

Habitat in Germania Dom. Mauerhoff.

Medius. Antennae nigrae, basi flavae. Caput nigrum, obscurum, immaculatum. Thorax flavus punctis quatuor nigris in strigam dispositis. Elytra laevia, testacea lineola baseos punctisque duobus oblique positis nigris. Corpus nigrum.

81—2. *C. thorace rufo nitido, punctis duobus Spengleri,*  
nigris, elytris testaceis: macula postica cy-  
anea.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff Mus. de  
Sehestedt.

Statura praecedentium. Antennae nigrae basi  
rufae. Caput rufum orbita oculorum nigra.  
Thorax rufus, nitidus punctis duobus dor-  
salibus atris. Elytra laevia, testacea macu-  
la postica cyanea. Corpus obscurum pedi-  
bus testaceis.

87—8. *C. ater nitidus capite thoraceque rufis, parvulus,*  
pedibus flavis.

Habitat in America boreali Dom. Mauerhoff.

Statura parva praecedentium. Caput rufum an-  
tennis flavis apice fuscis. Thorax rufus, ni-  
tidus macula bascos nigra. Elytra puncta-  
ta. Pedes flavi.

90. *C. fuscus obscurus immaculatus.*

*arenarius.*

Habitat in Germania Dom. Panzer.

Minutus, totus fuscus, immaculatus. Anten-  
nae porrectae nigricantes.

**CLYTHRA,** *Palpi* quatuor inaequa-  
les filiformes.

*Labium* apice dilatatum,  
emarginatum.

*Antennae* breves, ferra-  
tae.

1. *C. nigra obscura elytris pallidis: maculis tribus longipes,*  
nigris, pedibus anticis elongatis.

*Cryptocephalus longipes* Ent. syst. 1. 2. 52. 1.  
Habitat in Germaniae Corylo.

*3punctata*. 2. *C. nigro cyanea* elytris testaceis: punctis tribus  
nigris, pedibus anticis elongatis.

*Cryptocephalus 3punctatus* Ent. syst. 1. 2. 53. 2.  
Habitat in Italia Dr. Allioni.

*6maculata*. 3. *C. nigra* thorace rubro immaculato, elytris  
rubris: punctis tribus nigris.

*Cryptocephalus 6maculatus* Ent. syst. 1. 2. 53. 5.  
Habitat in Italia Dr. Allioni.

*4punctata*. 4. *C. nigra* elytris rubris: punctis duobus nigris.

*Cryptocephalus 4punctatus* Ent. syst. 1. 2. 54. 6.  
Habitat in Europae Corylo.

*4notata*. 5. *C. cyaneo nigra* elytris rubris: maculis duabus  
cyaneis.

*Cryptocephalus 4notatus* Ent. syst. 1. 2. 54. 7.  
Habitat in Barbaria D. Prof. Vahl.

*3maculata*. 6. *C. nigra* cinereo villosa elytris rufis: maculis  
tribus cyaneis; posteriore maiore transuersa.  
Habitat in India orientali Dom. Daldorff Mus.  
de Sehestedt.

---

Clythrae corpus paruum, immarginatum, cylindricum, saepius glabrum, tardum, capite retracto, oculis oblongis, lateralibus vix prominulis, antennis thoracis longitudine, ferratis, distantibus, ante oculos insertis, thorace transuerso, rotundato; margine deflexo scutello minuto, rotundato, elytris abdomine longioribus fornicatis pedibus, validis, anticis elongatis, tarsis quadriarticulatis: articulo penultimo bifido, colore vario.

Præcedentibus minor. Antennae valde ferratae, nigrae. Caput et thorax nigra, cinereo villosa, immaculata. Elytra punctata, rufa maculis tribus cyaneis: anticis duabus approximatis, tertia maiori, transuersa. Pedes rufi femoribus nigris.

7. *C. atra* elytris testaceis: fasciis duabus atris. *rugosa.*

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.

Statura omnino *C. 4punctatae* at duplo minor.

Caput et thorax atra, nitida, immaculata.

Elytra subrugosa, flaua fasciis duabus undatis atris, quae nec marginem nec futuram attingunt. Corpus nigrum.

8. *C. nigra* thorace rubro trimaculato, elytris *Atraphaxi-*  
testaceis: maculis tribus nigris, tibiis rufis. *dis.*

*Cryptocephalus Atraphaxidis* Ent. syst. 1. 2. 54. 9.

Habitat in Sibiriae Atraphaxide.

9. *C. viridi* cyanea thorace elytrisque eleuato tuberculatis. *monstrosa.*

*Clythra monstrosa* Oliv. Inf.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Bosc.

Corpus magnum, totum cyaneum antennis pedibusque nigris. Thorax holosericeus dorso gibbo, eleuato, bidentato. Elytra rugosa basi tuberculo eleuato, acuto, apice tuberculis minoribus.

10. *C. obscura* thorace elytrisque eleuato tuberculatis. *plicata.*

Habitat in Carolina Dom. Bosc.

Statura omnino praecedentis at triplo minor.

Corpus totum obscure, fuscum. Thorax

tuberculis duobus dorsalibus, eleuatis, approximatis. Elytra tuberculis plurimis eleuatis acutiusculis. Mas minor colore oliuaceo.

*gibber.*

11. *C. nigra* thorace gibbo, elytris tuberculatis. Habitat in Carolina Dom. Bosc.

Minuta. Antennae testaceae. Thorax eleuatus, gibbosus, immaculatus. Elytra nigra tuberculis plurimis paruis eleuatis. Pedes nigri.

*lunulata.*

12. *C. atra nitida* elytris flauis: lunula fascia punctoque apicis nigris.

*Cryptocephalus lunulatus* Ent. syst. 1. 2. 55. 10. Habitat — — Mus. Dom. Banks.

*12maculata.*

13. *C. nigra* thorace elytrisque rubris: punctis quatuor nigris.

*Cryptocephalus 12maculatus* Ent. syst. 1. 2. 55. 11. Habitat ad Cap. B. spei Mus. D. Banks.

*obsita.*

14. *C. testacea* antennis elytrorumque margine nigris.

*Cryptocephalus obsitus* Ent. syst. 1. 2. 55. 12. Habitat in America Dom. Drury.

*tridentata.*

15. *C. coerulescens* elytris testaceis: puncto humerali nigro.

*Cryptocephalus tridentatus* Ent. syst. 1. 2. 55. 14. Habitat in Europae Lonicera Xylosteo.

*taxicornis.*

16. *C. cyanea* elytris testaceis immaculatis.

*Cryptocephalus taxicornis* Ent. syst. 1. 2. 56. 15. Habitat in Italia Dr. Allioni.

*spunctata.*

17. *C. nigra* thorace rufo, elytris testaceis; punctis quatuor nigris,

*Cryptocephalus punctatus* Ent. syst. 1. 2. 56. 18.

Habitat in Barbariae plantis Dom. Vahl.

18. C. capite thoraceque fulvis, elytris flavis: *maxillofa*.  
puncto baseos scutelloque nigris.

*Cryptocephalus maxillosus* Ent. syst. 1. 2. 56. 19.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. B. nks.

19. C. atra thorace utrinque macula lutea, tibiis *aurita*.  
flavis.

*Cryptocephalus auritus* Ent. syst. 1. 2. 57. 20.

Habitat in Germaniae Corylo.

20. C. coerulea elytris sanguineis: maculis coeruleis *Lentisci*.  
leis cicatricibus.

*Cryptocephalus Lentisci* Ent. syst. 1. 2. 57. 21.

Habitat in Africae Lentisco.

21. C. rufa capitis basi elytrorumque maculis duabus *4maculata*.  
cyaneis.

*Cryptocephalus 4maculatus* Ent. syst. 1. 2. 57. 23.

Habitat in Saxoniae Corylo.

22. C. obscure aenea elytris testaceis: puncto baseos nigro. *longimana*.

*Cryptocephalus longimanus* Ent. syst. 1. 2. 58. 25.

Habitat in Trifolbo montano.

23. C. rufa elytris fuscis cyaneo nitidis, pedibus *Lar*.  
anticis elongatis.

*Cryptocephalus Lar* Ent. syst. 1. 2. 58. 26.

Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.

24. C. nigra thorace elytrisque testaceis, capite *plagioccephala*.  
crassiusculo.

*Cryptocephalus plagioccephalus* Ent. syst. 1. 2.  
60. 37.

Habitat in Gallia meridionali Mus. Dom. de Sehestedt.

- pallens.* 25. *C. nigra* cinereo villosa thorace elytrisque pallidis.  
*Cryptocephalus pallens* Ent. syst. 1. 2. 61. 39.  
 Habitat in China Dr. Pflug.
- ruficollis.* 26. *C. nigra* thorace rufo, elytris testaceis, pedibus anticis elongatis: femoribus apice unidentatis.  
*Cryptocephalus ruficollis* Ent. syst. 1. 2. 61. 42.  
 Habitat in Insula St. Helenae.
- nigripes.* 27. *C. capite* thoraceque rufis, elytris pallidis, pedibus apice nigris.  
*Cryptocephalus nigripes* Ent. syst. 1. 2. 61. 43.  
 Habitat in America.
- cuprea.* 28. *C. rubro* cuprea nitida subtus cyanea.  
*Cryptocephalus cupreus* Ent. syst. 1. 2. 62. 47.  
 Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
- cyanea.* 29. *C. cyanea* thorace pedibusque rufis.  
*Cryptocephalus cyaneus* Ent. syst. 1. 2. 63. 52.  
 Habitat in Gallia Dom. Mallet.
- bucephala.* 30. *C. cyanea* ore thoracis marginibus pedibusque rubris.  
*Cryptocephalus bucephalus* Ent. syst. 1. 2. 63. 54.  
 Habitat in Anthylli vulneraria.
- Scopolina.* 31. *C. nigra* thorace rufo, elytris rufis: fasciis duabus cyaneis pedibus nigris.  
*Cryptocephalus Scopolinus* Ent. syst. 1. 2. 68. 79.  
 Habitat in America, Europa australi.
- Koenigii.* 32. *C. rufa* elytris punctis duobus coeruleo-  
 tibus.



*Cryptocephalus Koenigii* Ent. syst. 1. 2. 68. 80.

Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.

33. *C. elytris flavis*: lineola punctisque tribus nigris. *paracenthesis.*

*Cryptocephalus paracenthesis* Ent. syst. 1. 2. 68. 81.

Habitat in Europae Salice, Betula.

34. *C. aenea nitida fronte cuprea.* *Hordei.*

*Cryptocephalus Hordei* Ent. syst. 1. 2. 69. 82.

Habitat in Barbariae Hordeo murino D. Vahl.

35. *C. viridi aenea nitida antennis basi flavescentibus, fronte impressa.* *concolor.*

*Cryptocephalus concolor* Ent. syst. 1. 2. 69. 83.

Habitat in Europa.

36. *C. flava thorace maculato, elytris vittis duabus postice coeuntibus atris.* *picta.*

Habitat in Guinea Dom. Lund.

Magna in hoc genere. Antennae breves, serratae, nigrae, basi pallidae. Caput nigrum. Thorax nitidus, glaber flavus maculis duabus dorsalibus margine postico lunato nigro connexis. Elytra nitida, flava vittis duabus magnis, quarum interior basin haud attingit pone medium fere in falciam dilatatis, coeuntibus et postice in unam terminantibus. Corpus nigrum cinereo nitidulum pedibus anticis elongatis.

HISPA. *Palpi* aequales, medio crassiores filiformes.

*Maxilla* bifida.

*Labium* corneum, integrum.

*Antennae* cylindricae.

*hystrix.* 2—3. H. antennis fusiformibus testaceo nigroque variegata, thorace utrinque dilatato quinque spinoso.

Habitat in India Mimosis Dom. Daldoiff.

Statura praecedentis. Caput testaceum oculis nigris. Thorax planus testaceus linea media abbreviataque laterali nigris. Margo utrinque prominens, dilatatus spinis quinque validis, acutissimis, testaceis, apice nigris. Elytra punctato striata, testaceo nigroque varia spinis plurimis, elevatis, sparsis, atris. Margo postice dilatatus, niger spinis plurimis, acutis, ferratis. Corpus et pedes testacea.

*apustulata.* 3—4. H. antennis ferratis hirta atra elytris maculis duabus rufis.

Habitat in Gallia Dom. Brongiard.

Statura et magnitudo H. *apustulatae* at elytra maculis duabus rufis. Vix huius generis videtur, potius forte *Lagria*.

*gibba.* 13. H. ferruginea elytris basi utrinque gibbis apice unguato dentatis coeruleis.

*Hispa gibba* Olivier.

Habita. in Insula St. Domingo Dom. Bosc.

**Parua.** Antennae filiformes, atrae. Caput et thorax rufa, immaculata. Elytra punctato striata, rufa basi utrinque tuberculo magno, elenato, apice angulata, dentata, cyanea. Pedes rufi.

14. *H. nigra elytris obscure aeneis: vitta rufa. vittata.*  
Habitat in Carolina D. Bose.

Statura praecedentium. Caput obscure rufum antennis nigris. Thorax obscure aeneo nitens lateribus rufis. Elytra striata punctataque obscure aenea, nitidula vitta lata, rufa. Corpus nigrum.

15. *H. atra capite villoso fulvo. capitata.*  
Habitat in Carolina Dom. Bose.

Reliquis longior. Caput inaequale fulvum antennis nigris. Thorax quadratus angulo antice subspinoso. Elytra fulcata punctataque atra margine integro.

**TILLUS.** *Palpi* quatuor inaequales.  
*antici* filiformes.  
*postici* securiformes.  
*Labium* membranaceum, inter palpos porrectum, integrum.  
*Antennae* serratae.

1—2. *T. villosus niger thorace rufo, antenna-damicornis.*  
rum articulis duobus ultimis dilatato compressis acutis.

Habitat in America boreali Dom. Hirschell.

Statura et magnitudo omnino *T. elongati*. Antennae singulares, nigrae articulis duobus ultimis maioribus dilatatis, compressis, acuminatis. Corpus totum villosum, nigrum, obscurum thorace solo rufo.

*Weberi.* 1—2. *T. hirtus* niger thorace rufo elytris coeruleis, antennarum articulis tribus ultimis dilatato compressis.

Habitat in Germania Dom. Weber.

Statura omnino praecedentis at alius et maior. Antennae vix huius generis nigrae articulis tribus ultimis maioribus, compressis, altero latere dilatatis. Corpus hirtum, nigrum. Thorax rufus. Elytra hirta, coerulea. Pedes nigri.

**LAGRIA.** *Palpi* quatuor inaequales.  
*antici* securiformes.  
*postici* extrorsum crassiores.

*Labium* membranaceum,  
integrum.

*Antennae* filiformes.

*viridipennis.* 1—2. *L. villosa* atra elytris viridibus.

Habitat in Tanager Schousboe Mus. Dom. Lund.

Statura et magnitudo praecedentium at tota atra elytris folis viridibus cyaneo nitidis.

*haemorrhoidalis.* 10—11. *L. hirta* atra elytris macula apicis rufa.

Habitat in Tanager Dom. Schousboe.

Paullo minor L. atra at eiusdem staturae. Distincta macula magna communi, rufa ad apicem coleoptrorum.

14—15. L. villosa aenea antennis pedibusque *aenea*.  
nigris.

Habitat in Tanger Dom. Schousboe.

Statura et summa affinitas L. coeruleae. Corpus totum villosum, viridiaeneum pedibus antennisque totis nigris.

15—6. L. liuida pedibus flavescentibus. *liuida*.

Habitat in Germania Dom. Hybner.

Statura parva praecedentium. Antennae breves, filiformes. Corpus totum villosum, liuidum pedibus folis flavescentibus.

LYTTA. Palpi quatuor inaequales.

*postici clauati.*

*Maxilla bifida.*

*Labium truncatum.*

*Antennae filiformes.*

12—3. L. corpore nigro cinereo tomentoso. *cinerea*.

Habitat in America Dom. Hybner.

Nimis reliquis affinis at tota tomento cinereo tecta.

15—6. L. cinereo villosa elytrorum marginibus *villosa*.  
albis.

Pall. Icon. tab. E. fig. 30.

Habitat in Guinea Dom. Lund.

Statura et magnitudo L. collaris et omnino distincta. Antennae nigrae articulo 1. 2. 3.

rufis. Corpus totum cinereo villosum elytrorum margine et futura albis.

**MYLABRIS.** *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* cornea, compressa, bifida.

*Labium* membranaceum, submarginatum.

*Antennae* moniliformes.

*Sidae.* 7—8. *M. villosa* nigra elytris macula baseos fasciisque duabus dentatis ferrugineis, antennis nigris.

Habitat ad Cap. Bon. spei.

Nimis affinis *M. Hermanniae* at differt antennis totis nigris elytrorumque fasciis obscure ferrugineis.

*Emaculata.* 9—10. *M. atra* elytris testaceis: punctis tribus nigris.

Habitat in Rossia meridionali Dom. Boeber.

An. latis distincta a *M. 10punctata*. Differt tantum punctis elytrorum tribus. 2. 1. Antennae pedesque nigrae.

*geminata.* 9—10. *M. atra* nitida elytris pallidis: punctis duorum parium fasciisque media nigris.

Habitat in Rossia Dom. Boeber.

Parva, atra, nitida. Elytra laevia, pallida pari punctorum ad basin alteroque versus apicem fasciisque media, sinuata, tuturam haud attingente atis.

- 10—11. *M. atra* antennis ferrugineis, elytris pal-*ruficornis*.  
 lidis, punctis tribus fasciisque duabus atris.  
 Habitat in Mogador Africae Dom. Schousboe.  
 Parva. Caput et thorax hirta, atra antennis  
 ferrugineis. Elytra laevia pallida punctis tri-  
 bus fasciisque duabus posticis  
 sinuatis, quarum anterior futuram haud at-  
 tingit, atris. Corpus atrum pedibus flavis.
12. *M. hirta nigra* elytris fascia postica puncto-*minuta*,  
 que apicis flavis.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Dr. Weber.  
 Parva an a praecedentibus satis distincta tota  
 hirta nigra. Elytra fascia postica dentata et  
 puncto magno apicis flavis.

**DIRCAEA.** *Palpi* quatuor inaequales,  
*anteriores* porrecti arti-  
 culo ultimo maximo  
 trilobo.

*Antennae* filiformes.

1. *D. fusca* antennis tibiisque piceis. *barbata*,  
*Lymexylon barbatum* Ent. syst. 1. 2. 92. 4. Oliv.  
 Inf. 25. 5. 3. tab. 1. fig. 3.  
*Mordella barbata* Schall. Act. Hall. 1. 322. tab.  
 1. fig. 7.  
*Serropalpus Hellenii* Act. Suec.  
*Serropalpus* Latreille Inf. 30. 56.  
 Habitat in Germaniae lignis.
2. *D. nigra* elytris obscure testaceis. *discolor*.  
*Serropalpus laevigatus* Hellen. Act. Suec.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura omnino praecedentis at duplo minor.

Antennae filiformes, fuscae. Caput et thorax nigra, obscura. Elytra laevia, obscure testacea. Pedes nigri tibiis fuscis. Variat forte sexu elytris totis nigris.

*aguttata*: 3. *D. atra* elytris maculis quatuor fulvis.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Statura et magnitudo praecedentis. Caput fulvum antennis nigricantibus. Thorax porrectus, laevis, ater, opacus, immaculatus. Elytra laevia, nigra maculis duabus fulvis. Pedes nigri tarsis pallidioribus.

*ruficollis*, 4. *D. nigricans* thorace anoque fulvis.

Habitat sub arborum corticibus Finlandiae.

Huius generis videtur. Caput atrum. Thorax fulvus, immaculatus. Elytra laevia, atra, immaculata. Corpus atrum ano late fulvo.

Dircaeae corpus elongatum, subcylindricum, immarginatum, laeve, tardum, capite inflexo, oculis rotundatis vix prominulis, lateralibus, antennis corpore brevioribus ante oculos insertis, thorace gibbo, elevato, angulo postico utrinque prominulo, elytris corpore paullo longioribus, pedibus cursoriis, compressis, tarsis quatuor anticis quinque articulatis, posticis quadriarticulatis: articulo secundo bilobo, colore obscuro.



**CUCUIUS.** *Palpi* quatuor aequales:  
articulo ultimo crassiori,  
truncato.

*Labium* breue, bifidum  
laciniis linearibus, distan-  
tibus.

*Antennae* moniliformes  
et filiformes.

2—3. *C. depressus rufus* elytris striatis. *rufus.*

Habitat in Carolina Dom. Bosc.

Magnus in hoc genere. *Antennae* corpore paulo breuiore, crassae, rufae: articulis distinctis, cylindricis. Caput rufum. Thorax planus, depressus margine utrinque antice posticeque acutiusculo. *Elytra* striata. *Pedes* breues, compressi.

**COSSYPHUS.** *Palpi* quatuor inaequales.

*antici* securiformes.

*Maxilla* bifida.

*Antennae* claua perfoliata.

1. *C. antennis clypeo breuioribus* Ent. syst. 1. 2. *depressus.*  
97. 1\*.

Habitat in India orientali, Mauritania.

2. *C. antennis clypeo longioribus.*

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Schestedt.

Praecedenti nimis affinis et forte mera eius varietas duplo maior.

**LAMPYRIS.** *Palpi* quatuor subclauati.

*Maxilla* bifida.

*Labium* integrum, corneum.

*Antennae* filiformes.

*pallens.* 15—6. *L. pallida* abdominis segmento quarto albissimo.

Brown. Jamaic. tab. 4. fig. 9. a. b.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Mus. D. Lund.

Statura media praecedentium. Clypeus antice parum angustatus elytraque laevia, glabra, pallida, immaculata. Corpus pallidum segmento abdominis quarto albissimo.

*vespertina.* 18—9. *L. testacea* elytris apice nigris, abdomine apice albissimo.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Media. Caput nigrum oculis magnis, globosis. Thorax rotundatus, testaceus. Elytra laevia, testacea, apice nigra. Corpus testaceum abdomine apice albissimo.

*cajennensis.* 20—1. *L. nigra* thoracis clypeo rufo: margine rufescente, antennis flabellatis.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Magnitudo *L. italicae* at omnino distincta. Antennae flabellatae, nigrae articulo primo pal-

lido. Thoracis clypeus rotundatus, rufus margine hyalino. Elytra atra. Pedes antici testacei. Abdomen mihi deest.

21—2. *L. nigra* thorace maculato elytris margi-*versicolor*,  
ne vittaque media flavescentibus, abdomine  
apice albitimo.

Habitat in America boreali Dom. Hirschelt.

Corpus magnum. Antennae nigrae articulis  
basi parum flavescentibus. Caput flavescens  
ore nigro. Thorax rotundatus, planus, in  
medio niger utrinque macula magna rufa  
marginique late flavescente. Elytra laevia,  
nigra margine, sutura vittaque abbreviata  
flavescentibus. Abdomen apice late albissi-  
mum. Pedes nigri geniculis flavescentibus.

21—3. *L. pallida* testacea thorace elytrisque ma-*maculata*,  
culis duabus marginalibus nigris.

*Lampyris maculata* Oliv. Inf. 28. tab. 1. fig. 3.

Habitat Surinamo Mus. Dom. Holthuyfén.

Statura et magnitudo *L. mauritanicae*. Clypeus  
rotundatus macula utrinque magna margina-  
li bascos nigra. Elytra laevia litura dorsali  
bascos maculisque duabus marginalibus ante  
medium nigris. Corpus ferrugineum abdo-  
minis segmentis ultimis albissimis.

**LYCUS.** Os rostro cylindrico, incurvo.

*Palpi* quatuor: articulo uli-  
mo crassiori, truncato.

*Antennae* filiformes.

4—5. *L. niger* thoracis lateribus elytrisque *ferrugineus*,  
rufis.

Habitat in India orientali Mus. Dom. de Sehe-  
stedt.

Statura praecedentis. Antennae compressae,  
ferratae, atrae. Corpus atrum. Thorax in  
medio ater lateribus rufis. Elytra lata, striata,  
ferruginea, immaculata. Pedes atrii.

RIPIPHORUS. *Palpi* quatuor filiformes.  
*Maxilla* ovata, brevif-  
sima.  
*Labium* acutum.  
*Antennae* flabelliformes.

*spinosus.* 3—4. R. ater elytris basi flavis, thorace postice  
dente compresso recumbente.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom.  
v. Rohr.

Magnus. Caput et thorax atra, immaculata.  
Thorax dente magno recumbente supra scu-  
tellum. Elytra attenuata, nigra, basi flava.  
Corpus atrum abdominis primo segmento  
sanguineo.

*litturatus.* 8—9. R. capite thoraceque ferrugineis, elytris  
testaceis: litura baleos punctoque apicis atris.

Habitat — — —

Affinis certe R. 2maculato at triplo maior. Ca-  
put elevatum, ferrugineum ore atro. Tho-  
rax obscure ferrugineus, immaculatus. Ely-  
tra attenuata, testacea lunula in ipsa basi  
punctoque versus apicem nigris. Corpus  
atrum uno late ferrugineo. Pedes nigri.

MORDELLA. *Palpi* quatuor inaequales.

*antici* clauati.

*postici* filiformes.

*Maxilla* bifida.

*Labium* membranaceum, bifidum.

*Antennae* moniliformes.

3—4. M. ano aculeato atra thorace rufo: macula *variegata*.  
la nigra elytris basi macula rufa.

Habitat Parisiis Mus. Dom. Bose.

Statura et magnitudo praecedentium. Caput nigrum. Thorax rufus macula magna baseos nigra. Elytra nigra macula magna, oblonga baseos rufa. Pedes rufi.

3—4. M. ano aculeato griseo pubescens thorace *pubescens*.  
macula dorsali, elytris puncto baseos fasciisque duabus atris.

Habitat in America Dom. Hybner.

Statura et magnitudo praecedentium. Corpus griseo pubescens. Thorax macula magna, dorsali, atra, glabra. Elytra puncto distincto baseos, fascisque duabus atris. Abdomen in altero sexu aculeatum.

4—5. M. ano aculeato ferruginea elytris nigris. *nigripennis*.

Habitat in America Dom. Hybner.

Statura praecedentium. Corpus totum ferrugineum elytris solis nigris.

**DONACIA.** *Palpi* quatuor filiformes.  
*Maxilla* unidentata.  
*Labium* membranaceum,  
 integrum.  
*Antennae* setaceae.

*Equiseti.* 1—2. *D. nigra* thorace elytrisque pallidis, elytris unispinosis.  
 Habitat in Franconiae Equiseto limoso Dom. Hoppe.  
 Reliquis minor. Caput cum antennis nigrum. Thorax pallidus lineolis duabus abbreviatis, obliquis, nigris. Elytra punctato striata, pallida apice spina porrecta, acuta. Pedes elongati, pallidi. Corpus nigrum.

**TRICHIUS.** *Palpi* quatuor filiformes.  
*Maxilla* bifida.  
*Antennae* clauato lamellatae.

*hirtus.* 17—18. *T. hirtus* supra niger, subtus albidus.  
 Habitat ad Cap. B. spei D. Daldorff.  
 Statura fere Melolonthae at huius generis. Capitis clypeus porrectus, acutus, bidentatus. Caput, thorax, elytra hirta nigra scutellum triangulum. Corpus subtus pilis albis densis hirtum. Pedes elongati, mutici, nigri.

*pilosus.* 17—18. *T. hirtus* subtestaceus capite thoraceque nigris elytris piceis.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei D. Daldorff.

Statura praecedentis. Clypeus porrectus, acutus, bidentatus. Caput et thorax hirta, atra. Elytra picea. Scutellum triangulum. Corpus subtus testaceo hirtum.

**CETONIA.** *Maxilla* apice setosa.

*Labium* coriaceum, emarginatum, palpos tegens.

*Antennae* lamellatae.

25—6. *C.* obscure viridis thoracis margine flavescente. *Francisca.*

Habitat in India Dom. Daldorff.

Duplo maior *C.* Chrysis supra tota obscure viridis, nullo modo nitida thoracis margine solo flavescente. Subtus cupro nitida sterno porrecto, cornuto.

44—5. *C.* obscure brunnea thorace punctis quatuor atris, elytris macula magna flexuosa flava. *flavomaculata.*

*Cetonia flavomaculata* Degeer Inf. 7.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.

Magnitudo *C.* sinuatae. Capitis clypeus porrectus subemarginatus, brunneus. Thorax laevis, obscure brunneus, nitidus punctis quatuor atris 2. 2. Elytra subtilissime punctato striata macula magna pone medium flexuosa flava. Sternum porrectum.

89—90. *C.* thorace ferrugineo: punctis quatuor nigris, elytris ferrugineis; limbo atro albo punctato. *athopunctata.*

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.

Media. Caput nigrum, immaculatum clypeo emarginato. Thorax obscure brunneus punctis quatuor atris, anticis submarginalibus. Elytra vix striata, ferruginea margine exteriori atro punctis quatuor albis, futura atra lineola alba. Anus niger prominet punctis quatuor albis. Corpus atrum abdomine utrinque lineis duabus punctorum alborum.

*cinerascens.* 89—90. C. thoracis dorso atro: linea cinerascens, elytris cinereis nigro maculatis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.

Statura parua praecedentium. Caput cinerascens clypeo emarginato. Thorax dorso atro linea media postice bifida, cinerea. Margo cinereus puncto nigro. Elytra vix striata, cinerea, atro maculata. Corpus cinereum abdomine atro maculis lateralibus transuersis albis.

*irrorata.* 89—90. C. nigra elytris striatis ferrugineis nigro maculatis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.

Statura praecedentium. Caput nigrum clypeo emarginato. Thorax niger margine antico in medio parum eleuato. Elytra striata, ferruginea punctis maculisque numerosis, nigris. Corpus nigrum.

*furuata.* 89—90. C. thorace elytrisque testaceis nigro punctatis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.



Parua. Caput nigrum. Thorax testaceus lineolis punctisque nigris. Elytra vix striata, testacea punctis numerosis nigris. Corpus cinereo villosum.

MELOLONTHA. *Maxilla* brevis, cornea, apice multidentata: dentibus simplicibus, acutis.

*Antennae* lamellatae.

27—8. *M. glabra* atra thorace punctato, elytris *Morio* substriatis.

Habitat in *Nymphaeae* floribus Indiae orientalis Mus. Dom. Lund.

Statura et magnitudo omnino *M. barbatae*. Caput nigrum puncto frontali impresso. Thorax ater, punctatus. Elytra substriata. Corpus atrum.

37—8. *M. glabra* obscura elytris testaceis, cly *quadridens*, peo quadridentato.

Habitat in India orientali Dom. Hybner.

Statura parua *M. rufi* ovis. Clypeus rotundatus, niger, acute quadridentatus. Thorax obscurus, glaber, immaculatus. Elytra laevia, testacea.

43—4. *M. glabra* punctata rufa capite nigro. *ferruginea*.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Affinis *M. melanocephalae* at distincta. Caput

nigrum, immaculatum. Thorax et elytra punctata, rufa, immaculata. Corpus rufum.

*pallens.*

43—4. *M. glabra pallida* capitis basi thoracisque punctis duobus nigris.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Affinis videtur *M. erythrocephalae* paullo maior. Caput basi nigrum, apice pallidum. Thorax pallidus punctis duobus anticis nigris. Corpus pallidum.

*moerens.*

64—5. *M. rufa* elytris testaceis, pectore nigro. Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura *M. horticolae*. Antennarum claua nigra. Caput et thorax glabra, laeuis, ferruginea. Elytra striata, testacea, abdomine breuiora. Corpus ferrugineum pectore nigro.

*lucicola.*

66—7. *M. glabra nigra* thoracis margine elytris-que testaceis.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura omnino *M. horticolae* paullo minor. Caput glabrum, nigrum, immaculatum. Thorax glaber, niger margine testaceo. Elytra substriata, testacea, immaculata. Corpus nigrum.

*atrata.*

66—7. *M. glabra atra* elytris striatis.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Nimis reliquis affinis attamen distincta videtur.

Caput et thorax laeuis, glabra, atra. Elytra striata abdomini breuiore,

- 74—5. *M. villosa* capite thoraceque obscure ac-*lineata*.  
neis, elytris testaceis: marginibus lineolisque  
duabus nigris.  
Habitat in Africae borealis arboribus Dom.  
Schousboe.  
Statura omnino et summa affinitas praecedentium.  
Corpus nigrum, cinereo villosum, Caput et thorax  
obscurae aeneae, villosa, clypeo reflexo. Elytra  
substriata, testacea margine exteriori, sutura  
lineolaque baseos alteraque apicis nigris.
- 90—1. *M. nigra* elytris flavis: fascia atra femo-*calcarata*.  
ribus tibiisque posticis rufis spinosis.  
Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Lund.  
Parua. Caput et thorax subvillosa, nigra, im-  
maculata. Elytra flava margine exteriori  
fasciaque postica, quae ad futuram valde  
extenditur, atris. Pedes rufi femoribus  
posticis incrassatis, compressis, versus apicem  
unispinosis, tibiis incurvis basi apiceque uni-  
spinosis.
- 81—2. *M. glabra* atra basi maculaque media pal-*pygmaea*.  
lidis.  
Habitat in Carolina Dom. Bosc.  
*M. graminicola* minor. Caput nigrum clypeo  
reflexo, submarginato. Thorax glaber, ater,  
aeneo parum nitidulus. Elytra striata basi  
late maculaque media pallidis. Corpus et  
pedes atra.

**BUPRESTIS.** *Palpi* quatuor filiformes:  
articulo ultimo obtuso,  
truncato.

*Maxilla* obtusa, unidentata.

*Labium* cylindricum, acuminatum.

*Antennae* ferratae.

*nigrita.* 3—4. *B. elytris acuminatis nigra glabra uno bidentato.*

Habitat in Tangier Mus. Schousboe Mus. Dom. Lund.

Corpus paruum, atrum, immaculatum. Elytra valde acuminata. Anus bidentatus. Subtus aeneo nitens. Magnitudo parua *B. cyaneae*.

*melancholica.* 20—1. *B. elytris bidentatis aeneo nigra thorace punctato nigra, elytris striatis.*

Habitat in Indiis Mus. Dom. de Scheestedt.

Magnitudo fere *B. Berolinensis*. Corpus nigrum oculis pallide testaceis. Thorax punctatus, niger, obscurus. Elytra striata, bidentata, nigra, aeneo nitida, inprimis versus futuram. Corpus nigrum, aeneo nitidum. Abdomen atrum, nitidum.

*manipularis.* 73—4. *B. elytris integris violaceis: strigis duabus e punctis fasciculato albis.*

Habitat in Tanger Mus. Dom. Lund.

*B. Onopordi* paullo maior. Antennae nigrae. Thorax hirtus, variolatus, violaceus. Ely-

tra integra, violacea strigis duabus e punctis fasciculato pilosis, albis. Pedes nigri anterioribus longioribus.

- 75—6. *B. elytris integris aenea hirta pedibus con-pilosa. coloribus.*

Habitat in Marocco Mus. Dom. Lund.

Statura et magnitudo omnino *B. Onopordi* at distincta videtur. Antennae valde ferratae, nigrae. Corpus totum viridi aeneum pilis longioribus cinerascens hirtum. Pedes aenei.

- 82—3. *B. elytris integris elongato attenuatis truncatis aenea thorace elytrisque reticulato punctatis. reticulata.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Maior *B. acuminata* et omnino distincta. Corpus totum obscure aeneum, minime nitidum. Thorax et elytra punctis plurimis impressis, confluentibus reticulata. Elytra postice elongata at obtusa truncata. Abdomen subtus scabrum.

- 88—9. *B. elytris integris striatis coeruleo maculatis, corpore rufo. sanguinea.*

Habitat in Mogador Schousboe Mus. Dom. Lund.

Statura et magnitudo *B. tenebricosae*. Caput canaliculatum, nigrum macula magna frontali, rufa punctis duobus parvis, nigris. Thorax subpunctatus, rufus punctis tribus transversim positus, nigris. Elytra integra, striata, rufa punctis coeruleis, a base ad mar-

ginem 3. interiori communi, longiori 2. interiori minori 1. marginali transverso, ultimo apicis communi. Subtus tomento fuluo hirta. Pedes nigri,

- 1 opunctata.* 90—1. B. elytris integris viridi aenea thorace punctis duobus elytris quinque atris.  
 Habitat Galliae Alpibus Dom. Brongiart.  
 Statura B. Rubi tota aenea, nitida. Antennae nigro aeneae. Thorax punctis duobus dorsalis elytraque quinque atris annulo coeruleo cinctis. Elytra striata,
- angulata.* 91—2. B. elytris integris: basi fasciisque undatis cinereis, corpore aeneo cinereo villosa.  
 Habitat in India Mus. Dom. de Sehestedt.  
 Statura B. Rubi at triplo minor. Caput et thorax aenea, cinereo villosa. Elytra integra, nigra basi fasciisque duabus undatis, cinereis. Corpus aeneum, cinereo villosum.
- exaltata.* 97—8. B. elytris integris supra viridis thoracis margine corporeque aureis.  
 Habitat Cajennae,  
 Media. Caput viridi fronte aurea antennisque nigris. Thorax scaber obscure viridis linea dorsali pallidior margineque aureo. Elytra subscabra obscure viridia, immaculata. Corpus aureum, nitidissimum pedibus viridibus.
- 1 Aguttata.* 98—9. B. elytris integris nigra thoracis punctis utrinque tribus marginalibus elytris septem flavescens.
- Habitat — — Dom. Weber.

Parua. Caput fuscum. Thorax fuscus margine utrinque punctis tribus flavis posteriore paullo maiore. Elytra crenato striata, nigra punctis 1. 2. 2. 2. flavis baseos linearibus. Corpus nigrum.

104—5. B. elytris integris laevibus ferrugineo ir- *adspersa*,  
roratis, corpore nigro obscuro.

Habitat in Africa Mus. Dom. de Sehestedt.

Statura omnino B. umbellatarum. Caput et thorax nigra, immaculata. Elytra substriata, nigra imprimis apice ferrugineo irrorata.

111—2. B. elytris integris: strigis cinereis, cor- *puffilla*,  
pore aeneo.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff Mus. D. de Sehestedt.

Statura omnino B. minutae at duplo adhuc minor tota aenea strigis aliquot elytrorum cinereis, undatis.

113—4. B. elytris integris linearibus: lineis dua- *plana*,  
bus elevatis, thorace inaequali, corpore atro.

Habitat in Senegallia Mus. Dom. de Sehestedt.

Paullo maior B. viridis. Caput valde canaliculatum oculis prominulis. Thorax inaequalis, niger, immaculatus. Elytra integra, nigra lineis duabus elevatis atomisque rarioribus, cinereis.

127—8. B. elytris integris substriatis cuprea tho- *parvula*,  
race cylindrico.

Habitat Tangier Dom. Schousboe Mus. Dom. de Sehestedt.

Corpus paruum cylindricum, cupreum, nitidum, immaculatum. Differt imprimis thorace haud depresso marginato, sed cylindrico. Elytra substriata.

*thoracica.* 128—9. *B. elytris* integris obscuris: maculis tribus viridibus impressis, thorace aureo.

Habitat in Insula St. Thomas Americae Dom. Lund.

Statura et magnitudo *B. candens*. Caput viride fronte rufescente. Thorax rufo aureus, nitidus, immaculatus. Elytra integra, fusca maculis tribus impressis, viridibus anteriori maiori baseos duabusque in medio una pone alteram. Corpus atrum, nitidum.

ELATER. *Palpi* securiformes.

*Maxilla* unidentata, obtusa.

*Labium* bifidum.

*Antennae* filiformes.

*tomentosus.* 4—5. *E. niger* ferrugineo tomentosus, elytris striatis.

Habitat in India orientali.

Corpus magnum *E. lurido* affine at distinctum totum nigrum, tomento ferrugineo vestitum. Elytra magis rotundata, striata.

*morio.* 16—17. *E. ater* elytris striatis, scutello griseo.

Habitat in America boreali Dom. Hybner.

Statura *E. aterrimi* at duplo maior, totus ater, nitidus. Elytra crenato striata. Scutellum villoso griseum.



16—17. *E. ater nitidus* antennis pedibusque *fus-laeuigatus*.  
eis, elytris laeuissimis.

Habitat in America boreali Dom. Hybner.

Statura et magnitudo praecedentis totus ater,  
nitidus, immaculatus. Elytra laeuissima.  
Antennae et pedes fusca.

28—9 *E. corpore atro: atomis numerosissimis atomarius*.  
albis.

*Elater atomarius* Linn. syst. Nat. 2. 655. 28.  
Fn. Sv. 738.

*Elater pulverulentus* Panzer. Fn. Germ.

Habitat in Germania Dom. Panzer.

Statura *E. fasciati* paullo minor totus ater, ob-  
scurus atomis numerosissimis, paruis undi-  
que irroratus. Thorax in medio impressus.

33—4. *E. subpubescens* obscure cupreus scutello *aeruginoso*.  
pallido. *pus.*

*Elater aeruginosus* Oliv. Inf. 31. tab. 3.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bose.

Statura omnino *E. pectinicornis*. Antennae fer-  
ratae, nigrae. Caput et thorax obscure cu-  
prea, minime nitida. Scutellum cinereo vil-  
losum. Elytra striata.

66—7. *E. ater* elytris striatis obscure aeneis. *melancholi-*  
cus.

Habitat in Dalekarliae Alpibus D. de Paykull.

Statura et magnitudo omnino *E. pilosi*. Cor-  
pus totum atrum. Elytra striata, obscure  
aenea. Pedes fasci femoribus nigris.

71—2. *E. cinereus* thorace postice tridentato. *tridentatus*.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff Mus. D.  
Lund.

Paruus. Thorax obscure cinereus punctis duobus dorsalibus, eleuatis, minutis. Margo posticus tridentatus ordinariis duobus lateralibus et medio valido, compresso. Elytra striata, cinerea. Pedes flauescentes.

*equestris.* 78—9. E. ater nitens elytris fascia lata fulua.

Habitat in Germania Dom. Mauerohoff.

Statura parua praecedentium. Caput, thorax, elytra atra, nitida, laeuissima elytris solis fascia lata fulua.

*punctatus.* 78—9. E. niger elytris testaceis: punctis duobus nigris.

Habitat in Tangier Dom. Schousboe Mus. D. Lund.

Paruus. Caput, thorax, corpus nigra, immaculata. Elytra striata, testacea punctis duobus magnis nigris.

LUCANUS. *Penicilli* duo sub labio palpigeri.  
*Antennae* pectinato fissiles.

*rufipes.* 15. L. mandibulis lunatis virescens abdomine pedibusque rufis.

Habitat in Germania.

Nimis affinis praecedenti et forte mera eius varietas. Differt tantum colore magis virescente abdomineque et pedibus rufis.

PRIONUS. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* cylindrica, integra.

*Labium* brevissimum, membranaceum.

*Antennae* setaceae.

6—7. P. thorace submarginato unidentato pubescente, corpore pallido, antennis mediocribus.

Habitat in Africa Mus. Dom. Lund.

Statura omnino P. depfarii at duplo fere maior.

*Antennae* longitudine corporis subferrugineae. Caput et thorax nigra, cinereo pubescentia. *Elytra* laevia, pallida, apice mucronata. Pectus cinereo pubescens. Abdomen pallidum. Pedes nigri.

10—11. P. thorace bidentato: dente posteriori longiori arcuato, antennarum articulis ultimis apice spinosis.

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. de Sehestedt.

Medius. *Antennae* breves, nigrae articulis ultimis apice spinosis. *Mandibulae* breves, arcuatae, validae. Thorax dentibus duobus validis, acutis anteriore minore, recto, posteriore arcuato. *Elytra* vix striata, picea. Corpus nigrum subtus aureo pubescens.

14—15. P. thorace utrinque tridentato ater *elytris* ferrugineis, antennis compressis brevibus, *mandibulis* elongatis forficatis extus unidentatis.

Habitat in Tangier Dom. Schousboe Mus. D. Lund.

Statura magna P. buphtalmi. Mandibulae magnae, incuruae, elongatae, forficatae, in medio incrassatae, extus dente paruo, apice acutae. Antennae breues, compressae, nigrae. Thorax planus, ater utrinque dentibus duobus recuruis, acutis, tertio baseos minuto. Elytra laeuia, ferruginea, mucronata. Pedes nigri.

**CERAMBYX.** *Palpi* quatuor filiformes.  
*Maxilla* obtusa, unidentata.  
*Labium* bifidum.  
*Antennae* fetaceae.

*longimanus*. 1. C. thorace spinis mobilibus, elytris basi unidentatis apiceque bidentatis, antennis longis.  
*Prionus longimanus* Ent. syst. 1. 2. 242. 1.  
 Habitat in America meridionali.

*cyanicornis*. 12—3. C. thorace subspinoso viridis nitens antennis breuibus, coeruleis, femoribus anticis clauatis ferrugineis.  
 Habitat in Aquapim Guineae Mus. D. Lund.  
 Corpus paruum, viride. Antennae breues, coeruleae: articulo tertio longiore, incuruo. Thorax rotundatus, punctatus, vix spinosus. Elytra laeuia, viridia. Pedes coerulei femoribus clauatis anticis quatuor ferrugineis.

- 17—18. *C. niger* thorace spinoso tuberculatoque *tubercula-*  
 elytris basi scabris apice emarginatis, anten- *tus.*  
 nis longis.

Habitat Cajennae Dom. Cuvier.

Magnus. Antennae corpore longiores, inermes.

Thorax niger spinis utrinque duabus laterali-  
 bus, una supra alteram tuberculis tribus dor-  
 salibus obtusis. Elytra obscura basi punctis  
 elevatis scabra apice late emarginata.

- 26—7. *C. thorace* spinoso, elytris macula ba- *humeralis.*  
 feos sanguinea.

Habitat in America boreali Dom. Hirshel.

Statura et magnitudo omnino praecedentis. An-

tennae corpore paullo longiores, nigrae.

Thorax scaber spinosusque. Elytra apice  
 emarginata, nigra macula magna, humera-  
 li, sanguinea. Pedes nigri.

- 48—9. *C. thorace* inermi nigro: lineis quatuor *scriptus.*  
 albis, elytris obscure cyaneis: lineolis fascia-  
 que media abbreviata impressis cinereis.

Habitat in Isle de France Mus. Dom. Bosc.

Medius. Antennae in altero sexu longissimae,

in altero mediocres, nigrae. Caput nigrum,

cinereo tomentosum. Thorax inermis, ni-

ger lineis quatuor albis. Elytra obscure cy-

anea, apice bidentata linea suturali integra,

lineolis tribus baseos: interiore longiore,

intermedia interrupta, exterior breuissima,

in medio fascia lata, utrinque abbreviata

apiceque lineola solitaria griseis. Corpus et

pedes nigri.

**LAMIA.** *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* cornea, bifida.

*Labium* corneum, bifidum.

*Antennae* setaceae.

*marmorata.* 6—7. L. thorace acute spinoso cinereo fuscoque varia elytris basi tuberculatis antennis longis.

Habitat in Africa Mus. D. B. sc.

Statura et magnitudo L. textor. Antennae corpore longiores, obscurae. Caput cinereum punctis duobus verticalibus fuscis. Thorax acute spinosus utrinque maculis tribus dorsalibus fuscis. Elytra cinereo fuscoque varia, basi scabra tuberculis duobus elevatis: exteriore acutiore. Pedes cinerei femoribus compressis tibiisque anticis apice barbatis.

*mixta.* 26—7. L. thorace spinoso cinereo fuscoque variegato antennis longis.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura praecedentium at minor. Thorax spinosus at haud tuberculatus. Antennae corpore longiores uti totum corpus varieg. Femora clauata.

*obscura.* 26—7. L. thorace spinoso fusca elytris striatis apice pallidis, antennis longis.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura praecedentis at duplo minor. Antennae corpore longiores, albo nigroque variae. Thorax spinosus, subtuberculatus fuscus. Elytra lineis elevatis striata, fulco cinereo

paullo mixta, apice cinerea. Corpus fuscum.  
Femora clauata.

51—2. L. thorace spinoso nigra elytris fasciis *bicincta*.  
duabus continuis rufis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino L. capensis at distincta. Cor-  
pus punctatum, atrum, fasciis duabus ely-  
trorum continuis, rufis. Pedes nigri.

92—3. L. thorace spinoso elytris testaceo cinereo- *spinator*.  
que articulatis: basi punctis eleuatis scabris.

Habitat in India orientali D. Daldorff.

Affinis certe L. scabrator at distincta videtur.

Antennae mediocres articulorum apicibus ni-  
gris. Caput cinereum. Thorax acute spi-  
nosus, cinereus lineis duabus dorsalibus, la-  
tis, testaceis. Elytra testaceo cinereoque re-  
ticulata angulo bascos parum prominulo  
punctisque eleuatis plurimis atris apice emar-  
ginata. Corpus cinereum linea laterali te-  
stacea. Pedes cinerei.

92—3. L. thorace spinoso elytrisque fusco nigro- *barbicornis*.  
que variis albo maculatis antennarum articu-  
lo tertio fasciculo pilorum.

Habitat in Guinea Dom. Lund.

Animalculum pulcherrimum. Antennae me-  
diocres fulcae articulo tertio fasciculo magno  
pilorum nigrorum quarto paruo. Caput  
fuscum, nigro varium. Thorax fuscus ni-  
gro varius linea dorsali interrupta maculis-  
que lateralibus lacte albis. Elytra fusco ni-  
groque fere undata macula geminata in me-

dio marginis exterioris duabusque versus apicem, punctisque dorsilibus minutis lacte albis.

*Scheffeldii.* 93—4. L. thorace spinoso elytrisque fuscis: maculis holosericeis niueis.

Olivier 67. tab. 10. fig. 68.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Animalculum pulcherrimum. Antennae mediocres, nigrae. Caput fuscum, immaculatum. Thorax acute unispinosus, fuscus, utrinque macula magna longitudinali lineolaque parva supra pedes holosericeo niueis. Elytra fusca macula anteriore magna, triangulari versus futuram, secunda in medio majori, postice sinuata et in hoc sinu punctum distinctum, tertia denique versus apicem antice sinuata holosericeis, niueis, nitidis. Corpus et pedes fusca.

**STENOCORUS.** *Palpi* quatuor.

*antici* filiformes.

*postici* clavati.

*Antennae* setaceae.

*cylindricolis.* 16—7. St. thorace mutico cylindrico cinereo, elytris ferrugineis: maculis duabus flavescentibus obsoletis.

Habitat in Americae Insulis Dom. v. Rohr.

Corpus paruum, cylindricum. Antennae mediocres, flavae articulo primo reliquorum, apicibus ferrugineis. Caput cinereum. Thorax cylindricus, muticus punctis duobus dor-



salibus, minutis, elevatis. Elytra integra, obscure ferruginea maculis duabus flavis, obsoletis: anteriore maiore. Corpus ferrugineum femoribus elevatis.

29—30. St. thorace spinoso fusco cinereoque gri-*plebejus*.  
leus elytris bidentatis punctato striatis.

Habitat in America Dom. Hybner.

Corpus mediocre, angustum. Antennae corpore paullo longiores, griseae. Caput et thorax spinosus obscure grisea. Elytra bidentata, punctato striata fusco cinereoque mixta, obscura. Pedes grisei.

SAPERDA. *Palpi* quatuor filiformes.  
*Maxilla* membranacea,  
bifida.

*Labium* cordatum, truncatum.

*Antennae* setaceae.

4—5. S. liuida antennis elytrorumque punctis *morbillosa*.  
atris.

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.

Statura magna S. populneae. Antennae vix longitudine corporis, nigrae. Caput et thorax liuida, immaculata. Elytra supra plana liuida punctis impressis, sparsis, atris, apice truncata. Corpus liuidum.

18—19. S. thorace villosa virescens coleoptro-*discoidea*.  
rum disco fusco: punctis duobus fasciaque  
communi lunata virescentibus.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Media. Caput fuscum antennis breuibus. Thorax rotundatus, villosus, virescens. Elytra punctata, fusca margine apiceque late punctato ante medium lunulaque in medio virescentibus. Corpus virescens. Pedes picei.

*hirticornis*. 50—1. S. grisea antennis longis hirtis.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.

Statura parua, cylindrica S. hirtae. Antennae corpore paullo longiores, pilis longioribus hirtae. Corpus totum griseum siue cinereo fuscoque mixtum.

*necydalea*. 52—3. S. obscura elytris abbreviatis pallidis, antennis longis ferrugineis.

Habitat in Insula St. Thomas Americae Mus. Dom. Lund.

Parua. Antennae corpore longiores, ferrugineae. Caput et thorax fusca ferrugineo hinc inde maculata. Elytra laeuia abdomine multo breuiora, pallida fasciola aut lineola fusca. Corpus fulcum ano ferrugineo. Pedes testacei.

*marginata*. 47—8. S. glabra atra thoracis margine flauo.

Habitat in Carolina Dom. Bose.

Statura et magnitudo s. violaceae. Antennae medioeres nigrae. Caput atrum orbita oculorum flaua. Thorax cylindricus, ater margine flauo. Elytra punctata, atra margine baseos parum albicante. Corpus atrum.

**CALLIDIUM.** *Palpi* quatuor clauati.  
*Maxilla* membranacea,  
 bifida.  
*Labium* bifidam: laci-  
 niis tenuissimis,  
*Antennae* setaceae.

9—10. C. thorace pubescente nigrum punctatum *punctatum*.  
 femoribus rubris, antennis medioeribus.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura sequentium at omnino distinctum. Tho-  
 race elytrisque utrinque punctatis.

15—6. C. thorace glabro subspinoso nigrum ely- *hungari-*  
 tris obscure aeneis. *cum*.

*Callidium hungaricum* Herbst: Arch. tab. 26.  
 fig. 12.

Habitat in Germania Dom. Hybner.

Statura omnino C. variabilis at duplo maior.  
 Antennae medioeres, nigrae. Thorax pla-  
 nus, laevis, utrinque subspinosus. Elytra  
 subrugosa, obscure aenea. Corpus nigrum  
 femoribus clauatis.

17—8. C. thorace elytrisque cinereo villosis, an- *concolor*.  
 tennarum articulis basi scutelloque niueis.

Habitat — — —

Medium. Antennae vix corporis longitudine  
 testaceae articulis basi niueis. Caput, thorax,  
 elytra punctata cinereo villosa, immaculata.  
 Corpus et pedes concolora.

18—9. C. thorace subtuberculato nigrum elytris *variolosum*.  
 variolosis: futura acuminata.

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.

Statura et magnitudo *C. rustici*. Antennae mediocres, obscure ferrugineae: articulo primo crassiori, nigro. Caput punctatum, atrum orbita oculorum cinerea. Thorax variolosus, subtuberculatus, niger. Elytra variolosa siue punctis cicatrisantibus impressa, apice futura acuminata. Corpus obscure nigrum.

*strepens.*

19—20. *C. thorace rotundato pubescente ferrugineo elytrorum futura acuminata, corpore testaceo, antennis longis.*

Habitat in Tanger Dom. Schousboe.

Magnitudo fere *C. rustici*. Antennae corpore longiores, pubescentes, ferrugineae. Caput et thorax obscure ferruginea, immaculata, pubescentia. Elytra laevia, pallide testacea apice futura acuminata. Corpus pallide testaceum.

*mixtum.*

29—30. *C. thorace rotundato ferrugineo cinereo lineato, elytris testaceis macula grisea fusca.*

*Callidium griseum* Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bose.

Medium. Antennae mediocres, cinereo villosae. Caput ferrugineum oculis nigris. Thorax rotundatus, subpubescens, ferrugineus utrinque linea extus repanda, cinerascens. Elytra laevia, testacea macula magna antice grisea postice fusca. Pedes testacei femoribus clauatis.

43—1. *C. thorace plano nudo: macula dorsali melancholiflua fuscum pedibus testaceis, antennis cum breuibus.*

Habitat in Germaniae Quercu Dom. Hybner.  
Corpus paruum, fuscum. Antennae breues, obscure piceae. Thorax planus, nudus, fuscus macula media obscure flua. Elytra laevia fusca. Pedes testacei femoribus compressis, vix clavatis.

48—9. *C. nigrum thorace atro nitido, antennis aulicum breuibus.*

*Callidium aulicum* sp. Inf. 1.

Habitat in Daniae nemoribus.

Statura praecedentium at differt thorace glabro, atro, nitido.

56—7. *C. thorace rotundato elytris fasciis tribus terminans cineris: tertia terminali.*

Habitat in America boreali Dom. Hirschel.

Maior *C. undato*. Antennae breues, ferrugineae. Caput et thorax scabra, obscure nigra pube flavescente. Elytra nigra litura basios flavescente fasciisque tribus latis cineris tertia in ipsa apice. Corpus piceum, utrinque maculis tribus pectoralibus fluis. Pedes picei.

62—3. *C. thorace globoso nigro, punctis tribus semipunctulatis, elytris nigris: punctis duobus lunulisque tribus albis.*

Habitat in Germania.

Magnitudo et statura *C. atomarii*. Caput nigrum antennis mediocribus, ferrugineis.

Thorax globosus, niger punctis siue lineis tribus paruis, dorsalibus, albis. Scutellum album. Elytra laeui, nigra puncto altero in ipsa basi, altero subscutello in futura fere communi, lunula prima antrosum arcuata, secunda retrosum, tertia terminali. Corpus nigrum segmentorum marginibus albis. Pedes ferruginei femoribus apice nigris.

*luscum.*

63—4. C. thorace globoso virescente: maculis duabus ferrugineis, elytris bidentatis nigris: strigis flauis basi rufis.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura magna C. arcuati. Antennae breues, ferruginae. Caput virescens. Thorax virescens margine antico et postico flauescente maculis duabus magnis, obscure rufis scutellum nigrum margine flauo. Elytra apice bidentata, nigra, basi rufa, qui color striga flaua cingitur, postice striga altera obliqua, abbreviata, flaua. Abdomen flauum. Pedes subferruginei, postici elongati femoribus compressis nigris.

*senile.*

71—2. C. thorace rotundato nigro: tuberculis transversis, elytris testaceis: basi marginique omni cinereis.

Habitat: Cajennae Dom. Cuvier.

Corpus paruum, nigrum. Caput nigrum antennis ferrugineis. Thorax niger tuberculis plurimis, elevatis, transversis. Elytra apice acuminata, testacea basi late margine

futuraque cinereis. Pedes testacei femoribus  
nigris, posticis elongatis, compressis.

LEPTURA. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* unidentata, apice  
setosa.

*Labium* membranaceum,  
bifidum.

*Antennae* setaceae.

4—5. L. thorace laevi nigra elytris testaceis apice nigris, antennarum articulis basi flavis. *maculicor- nis.*

Habitat in Germania.

Statura et summa affinitas L. tomentosae. Antennae nigrae articulis aliquot basi nigris. Thorax rotundatus, laevis, niger. Elytra testacea apice nigra. Margo exterior itidem parum nigricat. Corpus et pedes nigra.

19—20. L. aureo pubescens elytris ferrugineis: *fugax*.  
macula apicis flava.

Habitat in America Dom. Hybner.

Corpus medium. - Antennae nigrae. Caput et thorax tomento denso, aureo tecta. Elytra abdomine breviora, acuta et fere subspinosa, ferruginea macula flava ante apicem. Corpus nigrum pube aurea. Pedes ferruginei.

32—3. L. thorace subspinoso pubescente, elytris *lamed*.  
fastigiatis lividis: taenia obicura longitudinali sinuata.

*Stenocorus lamed* Ent. syst. 1. 2. 293. 2.

*Cerambyx lamed* Linn. syst. nat. 2. 630. 46. Fn.  
Sn. 649.

Geoff. Inf. 1. 226. C.

Habitat in Europae floribus.

Affinis L. 4maculatae.

*connexa*, 47—8. L. fusca elytris fasciis duabus cinereis futura connexis.

Habitat Tangier Dom. Schousboe.

Parua. Caput nigrum palpis basi rufescentibus. Thorax cylindricus, niger lineis duabus dorsalibus, cinereis, quae tamen marginem anticum haud attingunt. Elytra laevia, fusca fasciis duabus cinereis, futura connexis. Corpus nigrum.

*tranquebarica*. 53. L. rufa elytris nigris.

Habitat in India orientali Mus. Dom. de Sehestedt.

Statura parua praecedentium. Caput cum antennis rufum, ore nigro. Thorax cylindricus, rufus, immaculatus. Elytra laevia, nigra. Corpus rufum.

*coromandeliana*. 54. L. rufa pectore elytris pedibusque cyaneis.

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. de Sehestedt.

Caput rufum antennis nigris: articulo ultimo rufo. Thorax cylindricus, rufus. Elytra punctato striata, cyanea. Pectus cyaneum. Abdomen rufum. Pedes cyanei.



NECYDALIS. *Palpi filiformes.*

*Maxilla unidentata.*

*Labium* membrana-  
ceum, late emargi-  
natum.

*Antennae filiformes.*

16—7. *N. nigra* elytris aurulentis dorso cinereis, *longipes*,  
pedibus posticis quatuor elongatis compresso  
clauatis.

Habitat in Insula St. Domingo Mus. Dom. Bosc.

Præcedentibus maior. Caput nigrum fronte  
antennisque rufis. Thorax niger. Elytra  
subulata, aurulenta dorso inprimis ad basin  
cinereo hirto, apice emarginata. Pedes an-  
tici breues, testacei, postici quatuor valde  
elongati femoribus compressis, clauatis: cla-  
ua nigra. Tibiæ testaceæ apice nigrae.

23—4. *N. nigra* elytris testaceis; margine omni *marginata*.  
nigro.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc,

Statura præcedentium. Caput et thorax atra,  
immaculata. Elytra subulata, testacea mar-  
gine omni atro. Abdomen nigrum lateri-  
bus testaceis. Pedes nigri.

SYNODENDRON, *Palpi* filiformes, inaequales.

*Maxilla* unidentata.

*Labium* filiforme, corneum, apice palpigerum.

*Antennae* lamellatae.

*gibbum.* 1—2. S. thorace muricato gibbo, elytris retusis striatis.

Habitat in India orientali D. Daldorff.

Maior. S. muricato. *Antennae* lamellatae, flavescentes. Caput inflexum, fuscum fronte rufa pilosa. Thorax valde gibbus, elevatus, antice muricatus. Elytra striata, picea, apice retusa, integra nifiltriae parum prominent.

*pufillum.* 5. S. ferrugineum elytris punctato striatis integris. Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus paruum, cylindricum, totum ferrugineum, immaculatum. *Antennae* omnino lamellatae huius generis. Thorax gibbus, punctatus. Elytra striato punctata, integra.

APATE. *Palpi* filiformes, aequales.

*Maxilla* unidentata.

*Labium* membranaceum, truncatum.

*Antennae* perfoliatae.

*gonagra.* 6—7. A. elytris retusis punctatis cylindricis niger femoribus anticis incrassatis compressis.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom.  
v. Rohr.

Statura omnino A. femoralis at duplo minor.  
Antennae crassae, perfoliatae, flavae. Caput et thorax laevis, nigra. Elytra punctata, postice retusa. Pedes parvi femoribus anticis incrassatis, compressis.

- 10—11. A. elytris striatis retusis bidentatis: *den-bidens*,  
te interiore elongato, thorace antice muricato.

Habitat in Tangier Dom. Schousboe Mus. D.  
Lund.

Statura et magnitudo A. tridens at differt elytris striatis apiceque denticulis duobus: interiore multo maiore.

16. A. thorace rugoso niger elytris piceis. *Fagi.*

Habitat in Saxoniae Fago Dom. Hybner.

Minutus. Antennae perfoliatae videntur. Thorax niger rugis plurimis, transversis, elevatis. Elytra laevis, picea. Pedes obscuri.

17. A. thorace scabro elytris pedibusque griseis. *Tiliae*,  
*Apate Tiliae* Panz. Fn. Germ. 3. tab. 14.

Habitat in Germaniae Tilia.

Minutus. Thorax scaber griseus, Elytra punctata integra pedesque grisea.

BOSTRICHUS. *Maxilla* cornea.

*Labium* cylindricum,  
integrum, apice pal-  
pigerum.

*Antennae* claua solida.

- minimus.* 24—5. *B. cinereus* elytris laevibus obscurioribus.  
Habitat sub Abietis cortice Saxoniae D. Hybner.  
Minutus. Thorax laevis, cinereus. Elytra in-  
tegra, obscuriora. *Variat* thorace nigrican-  
te forte aetate.

BRUCHUS. *Palpi* aequales, filiformes.  
*Maxilla* membranacea, bi-  
fida.

*Labium* acuminatum.  
*Antennae* filiformes.

- punctatus.* 6—7. *B. fuscus* thorace elytrisque cinereo pun-  
ctatis.

Habitat — — —

Forte potius *Brachycerus*. Magnitudo fere *B.*  
*umbellatarum*. Corpus nigrum supra pun-  
ctis numerosis, cinereis.

- femoratus.* 7—8. *B. obscure ferrugineus* elytris fusco macu-  
latis, femoribus posticis elongatis clauatis.

Habitat in Indiae orientalis feminibus Dom.  
Daldorff.

Magnitudo *B. Robiniae*. *Antennae* filiformes,  
ferratae. Caput et thorax obscure ferrugi-  
nea, immaculata. Elytra vix striata, fer-  
ruginea maculis aliquot indistinctis nigris.

Pedes ferrugini femoribus posticis elongatis, clauatis.

8—9. *B. aeneus* elytris basi prominulis. *aeneus.*

Habitat in Italia orientali Dom. Daldorff.

Corpus *B. gibboso* paullo minus, totum obscure aeneum, immaculatum. Antennae fuscae. Elytra substriata angulo bascos prominulo.

10—11. *B. niger* elytris striatis ferrugineis: maculis tribus nigris margini connexis. *maculatus.*

Habitat in India orientali Dom. Hybner.

Corpus paruum, nigrum. Elytra striata, ferruginea puncto paruo bascos, maiori in medio posticoque marginali atris. Corpus nigrum pedibus ferrugineis.

11—12. *B. cinereo villosus* elytris striatis, femoribus posticis incrassatis compressis. *gonagra.*

Habitat in India orientali D. Daldorff.

Medius. Antennae filiformes, ferrugineae. Corpus totum ferrugineum, cinereo villosum. Femora postica magna, compressa, incrassata tibiisque incurvis.

14—5. *B. ferrugineus cinereo villosus* antennarum articulis tribus ultimis incrassatis. *crassicornis*

Habitat in Indiae orientalis feminibus D. Daldorff.

Huius generis videtur. Antennae elongatae at ultimi articuli dilatati. Corpus ferrugineum, cinereo pubescens. Elytra substriata. Pedes simplices, testacei.

22—3. *B. testaceus cinereo villosus* pedibus simplicibus. *capficola*

Habitat in Cajennae feminibus.

Parvus, totus testaceus villis cinereis hinc inde maculatus.

**ANTHRIBUS.** *Palpi* aequales, filiformes.

*Maxilla* breuissima, bifida.

*Labium* bifidum.

*Antennae* articulis ultimis tribus ovatis, longioribus, crassioribus: ultimo acuto infidentes rostro breui, plano.

*longicornis.* 1. *A. griseus* antennis corpore longioribus.

Habitat in India orientali Mus. Dom. de Scheffedt.

Statura et magnitudo sequentium. *Antennae* corpore longiores, nigrae articulis apice cinereis, ultimis tribus paullo crassioribus, unicoloribus; ultimo longiori, setaceo. Corpus totum griseum.

*niueirostris.* 3—4. *A. rostro* latissimo plano elytrorumque apicibus anoque albis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura et magnitudo omnino *A. albirostris*. Caput nigrum rostro plano, breuissimo, albo. Thorax niger punctis quatuor dorsalibus, ferrugineis. Scutellum nueum. Elytra striata.

ta punctis rarioribus, albis eleuatisque pilosis nigris, apice alba, immaculata. Anus albus prominens. Pedes nigri.

4—5. A. rostro plano latissimo nigro aeneus ro-*Roboris*.  
stro thorace pedibusque rufis.

*Attelabus ruficollis* Herbst. Arch.

Habitat in Kiliae Robore.

Nimis affinis A. planirostri paullo tamen maior et thorax rufus, immaculatus, nitidus. Elytra magis nigra, nitida.

8—9. A. obscure ferrugineus griseo pubescens ely-*pubescens*.  
tris apice griseis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus paruum A. varii. Antennae ferrugineae, breues claua elongata. Frons pubes cinerea. Thorax brunneus tomentoso cinereus. Elytra striata, ferruginea, apice cinerea. Corpus cinereo pubescens.

**BRACHYCERUS.** *Palpi* breuissimi.

*antici* biarticulati.

*Labium* rotundatum, corneum.

*Antennae* breues, extrorsum crassiores, rostro insidentes.

15—16. B. thorace crista duplici dentata, elytris *cristatus*.  
dorso planis reticulatis.

Habitat ad Cap. Bon. Ipei Mus. Dom. Lund.

Statura et magnitudo omnino *B. muricati*: Caput planum oculis eleuatis, rotundatis. Thorax crista duplici longitudinali, valde dentata, in medio interrupta. Elytra connata dorso plano, reticulato. Pedes grisei.

*undatus.* 8—9. *B.* thorace spinoso canaliculatoque, elytris lineis eleuatis crispatis, corpore nigro.

Habitat in Gallia, Africa.

Affinis certe *B. barbaro* cuius varietatem olim credidi. Differt tamen magnitudine duplo minore, corpore toto nigro, elytrorumque lineis magis eleuatis, crispatis punctisque interiectis paucioribus, magis concatenatis.

**ATTELABUS.** *Palpi* filiformes.

*Maxilla* bifida.

*Labium* corneum, palpos tegens.

*Antennae* moniliformes, rostro insidentes.

*aqueba ricus.* 6—7. *A.* rufus elytris fasciis duabus nigris: anteriore interrupta.

Habitat in Tranquebar Dom. de Sehestedt.

Caput postice attenuatum, rufum ore nigro: Thorax rufus lineis duabus fuscis. Elytra punctato striata, rufa fasciis duabus fuscis, altera baseos interrupta, altera in medio continua. Pedes elongati rufi.



- 7—8. *A. fuscus* elytris variolosis basi unispino-*dentipes*.  
 sis, pedibus anticis elongatis: femoribus uni-  
 dentatis.

Habitat in Americae Insulis Mus. Dom. Lund.

Statura praecedentium. Antennae rufae claua  
 fusca. Caput et thorax punctata, fusca, im-  
 maculata. Elytra variolosa, fusca dente ba-  
 seos valido, eleuato. Corpus fuscum pedi-  
 bus rufis, antici elongati femoribus clauatis,  
 unidentatis.

Femora in altero sexu aenea, nitida.

- 13—14. *A. ater* thorace postice attenuato rufo, *formicari-*  
 Habitat in India orientali Mus. Dom. de Sche-  
 stedt. *us*.

Corpus elongatum, atrum. Caput nigrum ro-  
 stro breui, cylindrico. Antennae monili-  
 formes, rufae. Thorax oblongus, antice  
 incrassatus, rufus, immaculatus. Elytra gla-  
 bra, laeua, atra. Pedes rufi femoribus om-  
 nibus apice incrassatis annulo nigro.

- 22—3. *A. coeruleus* antennis tibiisque fuscis. *coeruleus*.  
 Habitat in Germania Dom. Daldorff.

Statura parua praecedentium. Corpus totum  
 coeruleum antennis tibiisque fuscis.

- 26—7. *A. cinereus* rostro arcuato atro, pedibus *nigrirostris*.  
 testaceis.

Habitat in Onobrychis floribus Tangier Dom.  
 Schousboe Mus. Dom. de Schestedt.

Minutus. Rostrum arcuatum, atrum. Tho-  
 rax et elytra cinerea, immaculata. Pedes  
 testacei.

*Pomona*. 27—8. *A. niger* obscurus elytris striatis obscure coeruleis, rostro basi compresso apice subulato.

Habitat in Kiliae Pomona.

Affinis certe *A. Craccae* at distinctus et paullo maior. Rostrum basi compressum, apice subulatum. Thorax obscurus. Elytra striata, magis coerulea.

**RHINOMACER.** *Palpi* extrorsum crassiores: articulo ultimo truncato.

*Antennae* fetaceae rostro infidentes.

*varius*. 1. *R. albo nigroque varius.*

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Weber.

Sequentibus quadruplo maior. *Antennae* fetaceae, nigrae. Rostrum breue, planum, incrassatum. Caput nigrum lineis duabus albis. Thorax niger dorso albo reticulato. Elytra glabra, nigra, albo variegata. Abdomen atrum utrinque lineis duabus punctorum alborum. Pedes nigri.

**CURCULIO.** *Palpi filiformes.*

*Maxilla* cylindrica, unidentata.

*Antennae* clauatae: articulo primo longissimo, infidentes rostro cornuco.

6—7. *C. longirostris* griseus rostro bidentato, *guineensis*.  
elytris subspinosis.

Habitat in Guinea Dom. Lund.

Corpus magnum, griseum, obscurum. Antennae fuscae, apice cinerascens. Rostrum basi sulcatum, griseum, ante antennas utrinque dente valido acuto, apice rotundatum, atrum. Thorax planus, punctis impressis variolosus. Elytra punctato striata punctis eleuatis albis subspinosa. Pedes antici elongati.

9—10. *C. longirostris* niger thorace elytrisque *cribrarius*.  
purpureis nigro punctatis.

Habitat in America boreali Dom. Mauerhoff.

Affinis videtur praecedenti. Antennae nigrae claua compressa. Caput atrum rostro arcuato. Thorax supra purpureus punctis sex. 3. 3. intermedio antico maiori. Elytra abbreviata, striata, purpurea punctis quinque 2. 2. 1. ultimo maiori, transuerso. Corpus nigrum. Pedes nigri.

19—20. *C. longirostris* ouatus cinereo villosus *puadicus*.  
thorace elytrorumque fascia ferrugineis.



Habitat in Isle de France Dom. Billardiere.

Statura et magnitudo praecequentium. Rostrum cylindricum, inflexum. Thorax punctatus, obscure rufus. Elytra striato punctata, villoso cinerea, fascia lata, media, ferruginea, apice retusa. Corpus cinereo villosum. Pedes inermes, antici parum elongati.

*porculus.* 37—8. *C. longirostris* ater thorace elytrisque obscuris griseo punctatis.

Habitat Halae Saxonum.

Statura et magnitudo *C. abbreviati*. Caput cum rostro et antennis atrum, nitidum, immaculatum. Thorax magnus, planus, nigricans punctis griseis impressus. Elytra vix abbreviata, obscure punctis parvis griseis striata. Pedes atrii, validi, simplices.

*famulus.* 41—2. *C. longirostris* supra ferrugineus thoracis dorso elytrorum futura inaequaliter atris.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff Mus. D. Lund.

Corpus medium, griseo pubescens. Rostrum elongatum, arcuatum, atrum. Thorax ferrugineo villosus dorso inprimis baseos atro, nitido. Elytra ferruginea villosa futura inaequaliter atra. Pedes cinerei, inermes.

*Chloris.* 46—7. *C. longirostris* thorace elytrisque obscure viridibus, corpore nigro.

*Curculio Chloris* Panz. Fn. Germ. 18. tab. 8.

Habitat in Germania Dr. Panzer.

Paruus. Corpus cum rostro arcuato atrum.

Thorax punctatus obscure viridis. Elytra

striata, obscure viridia, immaculata. Corpus atrum.

54—5. *C. longirostris testaceus capite thoracis macula pectoreque nigris.* *Chamaeropsis.*

Habitat in floribus *Chamaeropsis humilis* Tangier Dom. Schousboe Mus. Dom. de Scheffedt.

Statura parva praecedentium. Caput cum rostro incuruo nigrum antennis testaceis. Thorax testaceus macula magna.

101—2. *C. longirostris ater thorace elytrisque scabris fuscis, femoribus anticis incrassatis.* *melanoccephalus.*

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Statura et fere magnitudo *C. paraplectici*. Antennae ferrugineae. Caput atrum, nitidum rostro breui, truncato. Thorax transuersus, scaber, fuscus margine antico parum flavescente. Elytra punctis eleuatis scabra ad futuram laeuia, atra margineque subseriato. Corpus atrum femoribus anticis valde incrassatis.

106—7. *C. longirostris cylindricus niger albo variegatus pedibus anticis elongatis.* *Pica.*

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Statura cylindrica praecedentium. Caput cum rostro nigrum orbita oculorum alba. Thorax punctatus, ater utrinque macula magna, palmata, alba. Elytra punctato striata, atra maculis variis, albis. Corpus albidum pedibus anticis parum elongatis.

- truncatus.* 107—8. *C. longirostris cylindricus fuscus obscurus*, elytris punctato striatis, rostro truncato. Habitat in India orientali Dom. Daldorff.  
Statura et magnitudo *C. Bardanae*. Rostrum nigrum, obscurum, apice truncatum. Thorax rotundatus, obscurus. Elytra punctato striata. Pedes fusci, subelongati.
- volvulus.* 107—8. *C. longirostris cylindricus fuscus elytris castaneis griseo variis*. Habitat in India orientali Mus. Dom. Daldorff. Omnino distinctus. Thorax punctatus, fulvus. Elytra castanea, griseo variegata.
- elongatus.* 111—12. *C. longirostris elongatus depressus ferrugineus femoribus breuibus compressis*. Habitat ad Cap. Bon. Ipei Dom. Daldorff. Paruus in hac familia. Caput nigrum rostro breuiusculo ferrugineo. Thorax punctatus, in medio parum canaliculatus, ferrugineus. Elytra striato punctata, depressa, ferruginea. Corpus ferrugineum femoribus breuibus, compressis.
- pictus.* 157—8. *C. longirostris femoribus dentatis supra fuscus thorace elytrisque albo striatis*. Habitat in Tangier Dom. Schousboe Mus. D. Lund.  
Statura praecedentium. Caput fuscum, immaculatum. Thorax albus lineis duabus latis dorsalibus lituraque utrinque laterali fuscis lineis lineolisque variis albis. Corpus albido villotum pedibus fulcis.

157—8. *C. longirostris femoribus dentatis niger Fabricii.*  
 elytris striatis ferrugineis; lineis posticis duabus albidis.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Medius. Rostrum cylindricum, atrum. Thorax scaber, ater lateribus villosis albidis. Elytra striata, ferruginea pone medium lineis duabus apicem tamen haud attingentibus villosis albidis. Pedes nigri femoribus acute dentatis.

160—1. *C. longirostris femoribus dentatis thopiger.*  
 race brunneo, elytris punctato striatis cinereis: macula marginali brunnea.

Habitat in Insula Trinidad Dom. Ryan. Mus. Dom. Lund.

Statura et magnitudo *C. Mangiferae*. Caput griseum rostro sub pedore inflexo. Thorax brunneus, immaculatus. Elytra punctato striata, cinerea macula magna, marginali, brunnea, versus apicem parum recula. Pedes grisei femoribus dentatis.

170—1. *C. longirostris femoribus dentatis cinereolens.*  
 reo pilosus, coleoptris macula dorsali atra.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bose.

Statura omnino praecedentium. Rostrum nigrum. Thorax cinereo pilosus, immaculatus. Elytra cinereo pilosa macula magna suturali, atra. Versus apicem macula alba suturalis ac minuta, vix observanda. Praeterea striae et punctis versus marginem anteriorem punctumque unum alterumne in disco nigra,

- plagiatus*. 184—5. *C. longirostris femoribus dentatis ater*  
 elytris striatis: plaga rufa.  
 Habitat in Carolina Dom. Bosc.  
 Paruus. Corpus rostro cylindrico antennisque  
 atrum. Thorax gibbus, punctatus, ater.  
 Elytra striata, rufa margine omni atro. Cor-  
 pus atrum.
- aurus*. 196—7. *C. longirostris femoribus dentatis ob-*  
 scure ferrugineus thorace linea dorsali, ely-  
 tris fascia postica albis.  
 Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.  
 Statura et magnitudo omnino *C. esuriens* at to-  
 tus obscure ferrugineus et rostrum multo  
 brevius. Thoracis linea dorsalis fasciaque  
 postica elytrorum scutellumque laete alba.  
 Pedes antici elongati. Femora acute den-  
 tata.
- c album*. 197—8. *C. longirostris femoribus dentatis ater*  
 coleoptris c. duplici albo notatis.  
 Habitat in India orientali Mus. Dom. de Sche-  
 stedt.  
 Statura omnino *C. Nucum*. Rostrum longissi-  
 mum, tenue, incuruum, ferrugineum, basi  
 apiceque nigrum. Thorax planus, niger  
 maculis duabus baseos strigaque interrupta  
 marginis antici albis. Elytra substriata, ni-  
 gra futura Cque magno, quod a basi ad me-  
 dium ducitur dorso futurae contiguo albis.  
 Pedes nigri femoribus dentatis.
- prodigus*. 238—9. *C. breuirostris variolosus niger* atomis  
 aureis numerosissimis.



Habitat in Tangier Dom. Schousboe.

Medius. Caput nigrum atomis aureis rostroque breui, late emarginato. Thorax et elytra punctis latis cicatrisantibus excavata et in his atomi aurei numerosissimi, cinereo micantes. Corpus nigrum. Pedes inermes, cinerei.

244—5. *C. breuirostris cylindricus niger elytris moratus*, puncto baseos apicisque viridi.

Habitat in Isle de France D. Billardiere.

Medius. Caput planum, fuscum rostro breui antennisque nigris. Thorax cylindricus, subpunctatus, fuscus, immaculatus. Elytra subpunctato striata puncto oblongo baseos apicisque viridi nitidis. Corpus lateribus viridi squamosum, Pedes nigri, antici parum elongati.

255. *C. breuirostris virescens thoracis dorso fuluo, sellatus*.

Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.

Statura et magnitudo *C. viridis*. Caput canaliculatum, emarginatum, viride. Thorax viridis macula magna, dorsali, fulua. Elytra striata, viridia, subacuminata.

292—3. *C. breuirostris griseus elytris nigro punctatis*.

*Curculio fritillum* Panz. Fn. Germ. 18. tab. 19. *fritillum*.

Habitat in Germania Dr. Panzer.

Statura praecedentium. Caput griseum rostro subcanaliculato. Thorax cylindricus, griseus linea dorsali, in medio dilatata fusca. Elytra

striato punctata, grisea, fusco punctata. Corpus griseum.

*striga.*

328—9. *C. breuirostris niger* coleoptris striatis fuscis: striga baseos niuea.

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Caput cum rostro breuissimo, subcanaliculato atrum. Thorax punctatus, ater. Elytra scabra striata obscura, fusca striga in ipsa basi niuea. Corpus atrum.

*verruca.*

353—4. *C. breuirostris niger obscurus* thorace varioloso, elytris crenato striatis.

Habitat in Europa.

Medius. Antennae omnino huius generis. Rostrium breue obtusum, punctatum. Thorax punctis latioribus impressus lineaque dorsali parum eleuata. Elytra connata, obscura, striato punctata.

*punctum.*

381—2. *C. breuirostris femoribus anticis acute dentatis niger* scutello niueo.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Daldorff.

Corpus *C. nigrita* paullo maius, magis oblongum totum nigrum, obscurum scutello solo niueo. Femora antica acute dentata, reliqua inermia.

*brunnipes.*

381—2. *C. breuirostris femoribus anticis dentatis fuscus* thorace pedibusque brunneis:

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Daldorff.

Præcedente paullo minor. Thorax punctatus, obscure rufus. Elytra punctato striata, fusca, vix acuminata. Pedes rufi femoribus anticis acute dentatis, reliquis inermibus.

381—2. *C. breuirostris* femoribus obtuse denta- *denticornis*.  
tis niger elytris cinereo maculatis, antenna-  
rum primo articulo apice prominulo.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Daldorff.

Magnitudo *C. falcati*. Antennae nigrae articu-  
lo primo longo apice prominente, dentem  
efficiente. Thorax gibbus, niger. Elytra  
striata, nigra, cinereo maculata.

390—1. *C. breuirostris* femoribus anticis acute *roralis*.  
dentatis viridis nigro irroratus.

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

*C. Pyri* paullo maior. Thorax et elytra viri-  
dia, nitida atomis minutis, numerosissimis  
atris irrorata. Pedes cinerei femoribus an-  
ticis acute dentatis, reliquis inermibus.

397—8. *C. breuirostris* femoribus dentatis flaves- *dorsatus*.  
cens capite thoraceque trilineatis, coleoptro-  
rum disco fusco.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et summa affinitas *C. curuicornis*. An-  
tennae valde elongatae articulo primo incur-  
uo. Caput et thorax flavescentia lineis tri-  
bus latis brunneis. Elytra striata flava ad  
futuram late brunnea futura tamen ipsa flava.  
Pedes rufi femoribus acute dentatis.

BRENTUS. *Os* rostro porrecto, cylindrico.

*Antennae* moniliformes intra rostri medium infer-tae.

*formicarius* 5—6. *B. oblongus* ater thorace ferrugineo.

*us*;

Habitat Tranquebariae Daldorff Mus. Dom. Lund.

Paruus in hoc genere. *Rostrum* cylindricum, atrum *antennis* rufis. *Thorax* laevis, rufus, antice globosus. *Elytra* laevia, atra, nitida. *Pedes* rufi femoribus clauatis at muticis annulo nigro.

COLYDIUM. *Palpi* quatuor clauati: articulo ultimo maiori.

*Labium* membranaceum, emarginatum.

*Antennae* perfoliatae.

*rufum*.

4. *C. rufum* elytris punctato striatis.

Habitat Parisiis Dom. Brongniart.

Corpus paruum, totum rufum. *Thorax* punctatus. *Elytra* punctato striata. *Femora* compressa.

MYCETOPHAGUS. *Palpi* quatuor in-  
acquales.

*Maxilla* mem-  
branacea, uni-  
dentata.

*Labium* rotun-  
datum, inte-  
grum.

*Antennae* extror-  
sum crassiores.

1—2. *M. niger* elytris striatis: fascia apiceque ru-*fasciatus*.  
fis, antennis pedibusque ferrugineis.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Paullo minor *M. 4maculato*. *Antennae* extror-  
sum crassiores, ferrugineae. *Caput* et tho-  
rax nigra, immaculata. *Elytra* striata fascia  
ante medium futuram haud attingente rufa,  
Apex late rufescit. *Pedes* rufi.

12—13. *M. testaceus* elytris fasciis duabus fuscis. *Populi*.

Habitat in Sueciae Populo Mus. Dom. Lund.

*Statura* parva praecedentium. *Caput* nigrum  
ore antennisque testaceis. *Thorax* laevis,  
testaceus, immaculatus. *Elytra* striata, te-  
stacea fasciis duabus latis fuscis vel potius ful-  
ca basi maculaque versus apicem testaceis.  
*Corpus* et *pedes* testacea.

**TETRATOMA.** *Palpi* quatuor inaequales, crassifasculi.

*Maxilla* membranacea, bitida.

*Labium* brevissimum, rotundatum, integrum.

*Antennae* articulis quatuor ultimis clauato perfoliatis.

*ruficollis.* 1—2. T. nigra thorace pedibusque rufis.

Habitat in Selandia Mus. Dom. Lund.

Affinis praecedenti. *Antennae* rufae claua nigra. *Caput* nigrum. *Thorax* laevis, rufus, nitidus. *Elytra* nigro cyanea, nitida. *Corpus* nigrum pedibus rufis.

*gazella.* 1—2. T. nigra obscura capite cornibus duobus erectis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Maior T. *Fungorum* tota nigra, minime nitida. *Antennae* articulis ultimis quatuor crassioribus, perfoliatis. *Caput* cornibus duobus erectis, compressis, validis. *Thorax* laevis, niger. *Elytra* substriata.

LYCTUS. *Palpi* quatuor breuissimi, filiformes.

*Maxilla* brevis, membranacea, bifida.

*Labium* integrum.

*Antennae* claua solida.

2—3. L. glaber ater nitidus capite elytrorum basi *nitidulus*. pedibusque ferrugineis.

Habitat in Germania Dom. Mauerhoff.

Statura parua praecedentium elongata. Caput cum antennis ferrugineum. Thorax laevis, ater, nitidus. Elytra laeuis, atra, nitida, basi ferruginea. Corpus atrum pedibus ferrugineis.

TRITOMA. *Palpi* antichi securiformes.

*Labium* emarginatum.

*Antennae* claua perfoliata.

4—5. T. nitida rufa elytris atris. *pulchella*.

Habitat in India Mut. Dom. de Sehestedt.

Statura et magnitudo T. rufipes. Caput et thorax rufa, nitida, immaculata. Elytra atra, Pedes rufi.

DIAPERIS. *Palpi* quatuor subfiliformes.  
*Maxilla* bifida.

*Labium* cylindricum, apice palpigerum.

*Antennae* secundum totam longitudinem perfoliatae: foliolis compressis; ultimo ovato.

*hydatina*. 1—2. *D. atra* elytris rufis: puncto futura fasciaque atris.

Habitat in Carolinae Hydno candido Dom. Bose.

Statura et magnitudo *D. Boleti*. Caput et thorax laevis, atra, nitida. Elytra striato punctata, rufa puncto ante medium fascia postica, quae ad marginem exteriorem extenditur futuraeque atris. Corpus atrum.

SCAPHIDIUM. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* bifida.

*Labium* corneum, rotundatum, integrum.

*Antennae* articulis quinque clauato perfoliatis.

*immaculata*. 2—3. *S. atrum* nitidum elytris immaculatis.

*Scaphidium immaculatum* Olivier Inf. 2. 20. tab.

1. fig. 3.



Habitat in Gallia Mus. Dom. Bose.

Statura et magnitudo omnino S. 4maculati at  
tota atra, immaculata.

2—3. S. atrum nitidum capite thoraceque obscu- *bicolor.*  
re rufis. *Scaly?*  
*fungo*

Habitat in Europae Boletis.

Statura et magnitudo praecedentium. Caput  
et thorax obscure rufa, immaculata, Elytra  
laevia, nigra. Pedes antici rufi.

IPS. *Palpi* aequales, breuissimi: articu-  
lo ultimo quato.

*Maxilla* bifida.

*Labium* membranaceum, con-  
icum, emarginatum.

*Antennae* perfoliatae.

6—7. I. nigra elytris striatis: punctis quatuor *4notata.*  
rufis.

Habitat in Germania.

Summa affinitas I. 4pustulatae. Differt tantum  
elytris striatis paullo obscurioribus.

14—5. I. testacea elytris substriatis. *testacea.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus paruum, testaceum, immaculatum.  
*Antennae* articulis tribus perfoliatis.

STAPHYLINUS. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* unidentata.

*Labium* membranaceum, trifidum.

*Antennae* moniliformes.

*plagiatus.* 32—3. St. ater elytris fuscis: linea media pedibusque testaceis.

*Staphylinus plagiatus* Paykull Monogr.

Habitat in Europa boreali.

Medius. *Antennae* fuscae. Thorax planus, rotundatus, ater, immaculatus. Elytra laevia, fusca linea lata in medio testacea, quae tamen nec basin nec apicem attingit. Corpus atrum pedibus pallide testaceis.

*linearis.* 41—2. St. elongatus ater elytris fuscis, antennis pedibusque rufis.

*Staphylinus linearis* Oliv.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bose.

Paruus, elongatus et fere filiformis. *Antennae* ferrugineae: articulo primo longiori subclavato. Caput et thorax laevia, atra, nitida. Elytra laevia, fusca, immaculata. Pedes rufi.

*brunneus.* 44. St. brunneus capite abdominisque medio atris.

*Staphylinus brunneus* Paykull Monograph.

Habitat in Suecia.

Paruus, filiformis. *Antennae* nigrae basi brunneae. Caput atrum, nitidum. Thorax et

elytra laeua, brunnea, immaculata. Abdomen brunneum, in medio nigrum. Pedes brunnei.

- 46—7. *St. ater nitidus* elytris pallidis: margine *philanthus*. nigro.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Daldorff.

Paruus. Antennae moniliformes, flavescentes. Caput et thorax atra, nitida, laeua, immaculata. Elytra laeua, pallida margine exteriori tenuissime apicis parum latiori nigro. Corpus nigrum parum ferrugineis.

- 49—50. *St. niger* elytris testaceis ad futuram *nituberculatus*.  
gris, capite tuberculato.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Paruus. Caput magnum, nigrum mandibulis exsertis, elongatis tuberculisque duobus eleuatis, obtusis. Antennae testaceae. Thorax niger. Elytra testacea, ad futuram nigra. Abdomen nigrum ano testaceo. Pedes testacei.

**OXYPORUS.** *Palpi* quatuor inaequales, *antici* filiformes.

*postici* securiformes.

*Labium* emarginatum cum mucrone.

*Antennae* moniliformes.

- 15—6. *O. ater nitidus* thoracis margine postico, *dimidiatus*.  
elytris, abdominis segmentorum marginibus pedibusque testaceis.

---

Habitat in Germania Dom. Daldorff.

Paruus. Antennae nigrae, basi testaceae. Caput atrum, nitidum, immaculatum. Thorax ater, nitidus margine postico inprimis ad latera testaceo. Elytra testacea basi parum nigra. Abdomen nigrum segmentorum marginibus testaceis. Pedes testacei.

---

---

## CLASSIS II.

### U L O N A T A.

*MAXILLA* TECTA GALEA OBTUSA.

---

### P H A S M A.

Os.

*Palpi* quatuor, inaequales, compressi, filiformes, *anteriores* longiores, 5 articulati: articulis subaequalibus, ultimo oblongo adhaerentes maxillae dorso.

*posteriores* triarticulati: articulis subaequalibus, ultimo oblongo acutiusculo longitudine laciniarum exteriorum labii adnati labii medio.

*Mandibula* porrecta, cornea, arcuata, dentata.

*Maxilla* crassa, obtusa, compressa, apice dentata. *Galea* crassa, obtusa, longitudine maxillae.

*Labium* porrectum, planum, membranaceum, quadrifidum: laciniis inaequalibus; exterioribus duplo longioribus, filiformibus, obtusiusculis, interioribus breuibus, exterioribus fere connatis.

*Antennae* filiformes.

### MANTIS.

Os.

*Palpi* quatuor inaequales, filiformes.

*anteriores* paullo longiores, 5articulati: articulo primo brevissimo, reliquis longioribus, cylindricis, subaequalibus adhaerentes maxillae dorso.

*posteriores* paullo breviores, triarticulati: articulis aequalibus, cylindricis adnati labii medio.

*Mandibula* porrecta, cornea, arcuata, acuta, dentata.

*Maxilla* porrecta, compressa, intus ciliata, dentata, acuta. *Galea* incurva, apice incrassata, obtusa.

*Labium* porrectum, membranaceum, planum, apice quadrifidum; laciniis aequalibus subacutis.

*Antennae* setaceae.

## ACRYDIUM.

Os clypeo rotundato, integro.

*Mandibula* cornea, arcuata, acuta, dentata.

*Maxilla* apice bidentata.

*Galea* basi latiore, apice subulata.

*Labium* quadrifidum: laciniis exterioribus maioribus, linearibus, interioribus minutis, subulatis.

## ACHETA.

Os clypeo prominente, orbiculato, integro.

*Mandibula* cornea, arcuata, acuta dentata.

*Maxilla* apice tridentata dente inferiore remotiore.

*Galea* linearis, obtusa.

*Labium* elongatum, quadrifidum: laciniis exterioribus dilatatis, rotundatis, interioribus subulatis, acutis.

FORFICULA. *Palpi* filiformes.

*Labium* trifidum.

*Antennae* setaceae.

1. *F. forcipe* elongata medio unidentata atra pe-*herculeana*,  
dibus rufis.

Habitat in Insula St. Helena Mus. Dom. de Se-  
hestedt,

Gigas in hoc genere. Caput nigrum antennis  
ferrugineis. Thorax planus, laevis, niger.  
Elytra brevia, atra, immaculata. Corpus  
atrum, nitidum. Forceps longitudine fe-  
re corporis atra, in medio unidentata. Pe-  
des rufi.

- 11—12. *F. nigra* thorace elytrorum disco pedi-*ruficollis*.  
busque ferrugineis.

Habitat in Tangier Dom. Schousboe Mus. D.  
Lund.

Magna. Caput atrum antennis 11 articulis,  
testaceis. Thorax planus, rufus, postice  
parum fuscescens. Elytra nigra disco palli-  
do. Abdomen nigrum. Forceps elongata,  
incurva, nigra, basi unidentata, testacea.  
Pedes rufi.

BLATTA. *Palpi* inaequales filiformes:

*Labium* bifidum: laciniis  
filis; pinnis inaequalibus.

*Antennae* setaceae.

- 20—1. *B. flavescens* thorace nigro: margine al-*longipalpa*.  
bo, palpis elongatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino *B. lapponicae* at paullo maior.

Antennae corpore longiores, brunneae. Caput nigrum. Thoracis clypeus planus, ater margine laterali hyalino albo. Elytra transversim striata, flavescentia. Corpus flavescens. Palpi anteriores elongati, articulo ultimo cylindrico, obtuso, subcrassiori.

*reticulata.* 22—3. *B. flavescens* thoracis elytrorumque margine albo pellucido, elytris reticulatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Bl. germanica paullo minor. Caput flavescens antennis testaceis. Thorax flavescens margine albido pellucido. Elytra reticulata, flavescentia margine albido pellucido.

*palliat.* 24—5. *B. atra* thoracis margine postico ferrugineo.

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.

Statura omnino *B. lapponicae*. Caput nigrum. Thorax laevis, niger nitidus margine postico ferrugineo. Elytra substriata, atra. Corpus atrum.

PHASMA. *Palpi* inaequales, filiformes. *Labium* quadrifidum: lacinis lateralibus duplo longioribus.

*Antennae* filiformes.

*filiformis.* 1. *P.* corpore filiformi aptero fusco, pedibus corpore longioribus inermibus.



*Mantis filiformis* Ent. syst. 2. 12. 1.

Herbst. Arch. tab. 51. fig. 2.

Brown. Jamaic. tab. 42. fig. 5.

Petiv. Gazoph. tab. 60. fig. 2.

Habitat in America meridionali.

2. P. corpore filiformi aptero viridi, pedibus longitudine corporis, femoribus posticis apice spinosis, *ferula*.

*Mantis ferula* Ent. syst. 2. 12. 2.

Habitat in Insula Guadeloupe.

3. P. corpore filiformi aptero virescente, femoribus striatis, *calamus*.

*Mantis calamus* Ent. syst. 2. 13. 3.

Habitat in Insula St. Croix Americæ.

4. P. corpore filiformi aptero viridi, femoribus dentatis, *Rossia*.

*Mantis Rossia* Ent. syst. 2. 13. 4.

*Mantis Rossia* Ross. Fn. Etr. 1. 259. 636. tab. 8. fig. 1.

Habitat in Italia Dom. Rossi.

*angulata*.

5. P. aptera capite thoraceque spinosis, elytris rotundatis brevissimis, femoribus subtus angulatis.

*Mantis angulata* Ent. syst. 2. 13. 5.

*Mantis gigas* Drury Inf. 2. tab. 50.

Habitat in Insula Guadeloupe.

*gigas*.

6. P. thorace teretiusculo scabro, elytris brevissimis, pedibus spinosis. Stoll. Spectr. tab. 2. fig. 5.

*Mantis gigas* Ent. syst. 2. 14. 6. Linn. syst. nat.

2 689. 1.

Bradl. nat. tab. 27. fig. 6.

Petiv. Gazoph. tab. 60. fig. 2.

Seb. Mus. 4. tab. 77. fig. 1, 2.

Habitat in Asia.

- necydaloides*. 7. P. thorace scabro elytris ovatis angulatis brevissimis, alis oblongis.

*Mantis necydaloides* Ent. syst. 2. 14. 7. Linn. syst.

Nat. 2. 691. 14. Amoen. acad. 6. 397. 3.

Degeer Inf. 3. 404. 1. tab. 36. fig. 1.

Roess. Inf. 2. Gryll. tab. 19.

Stoll. Spectr. tab. 3. fig. 3. tab. 4. fig. 11.

Habitat in Asia.

- atrophica*. 8. P. thorace quadrispinoso, elytris brevissimis basi aristato mucronatis.

*Mantis atrophica* Ent. syst. 2. 14. 8.

*Mantis atrophica* Pall. spicil. fasc. 9. tab. 1. fig. 7.

Habitat in Insula Java.

- spinosa*. 9. P. capite thoraceque spinosis, elytris brevissimis acutis.

*Mantis spinosa* Ent. syst. 2. 14. 9.

Habitat in Indiis.

- 2spinosa*. 10. P. thorace teretiusculo antice bispinoso, elytris brevissimis: margine flavo.

*Mantis 2spinosa* Ent. syst. 2. 15. 10.

Habitat in America.

- jamaicensis*. 11. P. linearis viridis elytris brevissimis: margine exteriori flavo.

*Mantis jamaicensis* Ent. syst. 2. 15. 11.

*Spectrum viride* Stoll. tab. 6. fig. 20. 21.

Drury Inf. 2. tab. 49. fig. 1.

Habitat in Jamaica.

- lateralis*. 12. P. linearis nigra elytris brevissimis nigris: lateribus flavis.

*Mantis lateralis* Ent. syst. 2. 15. 12.

*Specillum nigrum* Stoll. tab. 10. fig. 36. 37.

Habitat in Brasilia.

13. *P. linearis* fusca clytris brevissimis unidentata-*annulata*,  
tis antennis longis albo annulatis.

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.

Statura omnino praecedentis. Antennae corpore duplo fere longiores, fuscae annulis quatuor albis. Caput et thorax linearia, fusca, immaculata. Elytra brevissima, fusca margine exteriori flavo. Dens brevis, elevatus in medio. Alae fuscae. Pedes ferruginei.

14. *P. capite* thoraceque spinosis, clytris brevif-*aurita*,  
simis: tuberculo medio subcompresso.

*Mantis aurita* Ent. syst. 2. 15. 13.

Habitat in India orientali.

15. *P. linearis* fusca clytris brevissimis basi subspi-*linearis*,  
nosis.

*Mantis linearis* Ent. syst. 2. 15. 14.

Habitat in India.

16. *P. linearis* fusca clytris brevissimis, alis ni-*variegata*,  
gris basi albis: costa flavo fasciata.

Habitat — — Dom. Weber.

Statura *P. roseae*. Caput et thorax fusca utrinque linea laterali, flava. Elytra brevissima, fornicata, fusca macula magna baseos flava. Alae longitudine corporis nigrae, basi late albae costa tota atra fasciis quatuor flavis. Corpus fuscum.

*rosea.*

17. *P. linearis viridis* fronte fulua, elytris breuifimis unispinosis, alis roseis: costa viridi.

*Mantis rosea* Ent. syst. 2. 16. 15.

Stoll. tab. 5. fig. 17.

Habitat in India orientali Mus. D. Lund.

**MANTIS.** *Palpi* subaequales filiformes.

*Labium* quadrifidum: laciniis aequalibus.

*Antennae* setaceae.

*cordata.*

- 21—22. *M. thorace* utrinque membranaceo dilatato, elytris alis dimidio breuioribus.

Habitat in Indiis Mus. Galliae.

Statura omnino *M. strumaria* at paullo minor et distincta. Caput pallide testaceum antennis longitudine corporis, setaceis. Thorax lobo antico cordato, virecente, postico lateribus ferrulatis. Elytra viridia abdomine duplo breuiora neruo medio eleuato. Alae longitudine corporis magnae, virides. Abdomen depresso, foliaceum, viride subtus linea media, eleuata, fusca. Pedes femoribus foliaceis anticis posticisque intus ferratis.

*lobata.*

- 27—8. *M. thorace* utrinque ferrato grisea elytrorum margine viridi albo, pedibus posticis lobatis.

Habitat Cajennae Dom. Bose.

Magnitudo et statura *M. oratoriae*. Caput et thorax grisea, immaculata margine valde ferrato. Elytra grisea, subhyalina, fusco maculata linea marginali ultra medium viridi

marginē vero ipso niuco. Pedes griseo fuscoque varii. Pedes postici lobo ad apicem femorum et in medio tiliarum.

- 37—38. *M. thorace laevi griseo, elytris obscure marginata, hyalinis: maculis lateralibus fuscis margineque viridi.*

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Magna. Caput inerme, griseum. Thorax filiformis, apice parum dilatatus, griseus, immaculatus. Elytra obscure hyalina maculis plurimis, lateralibus fuscis margineque exteriori deflexo, viridi. Alae obscure hyalinae macula una alteraue nigra. Pedes anteriores falcati posteriores simplices virescentes.

- 48—9. *M. cinerea elytris hyalinis, fronte porrecta lanceolata, et lanceolata.*

Habitat in India orientali Mus. Dom. de Scheffdt.

Corpus paruum, cinereum, immaculatum elytris hyalinis longitudine abdominis. Antennae setaceae longitudine corporis. Frons inter oculos porrecta, plana, acuta.

**ACHETA.** *Palpi inaequales, filiformes.*

*Labium quadrifidum: lacinis lateralibus dilatatis rotundatis.*

*Antennae setaceae.*

- 1—2. *A. elytris brevissimis apice atris, pedibus fossor. anticis palmatis.*

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Daldorff.

Minuta. Caput et thorax cinereo immaculata.

Elytra corpore triplo breuiora, alba apice macula atra. Alae elongatae, corpore longiores, haud caudatae, compressae, basi albae, apice fuscae. Abdomen supra albo nigroque fasciatum, subtus cinereum. Pedes antici breues, palmati, reliqui nigro fasciati.

*maculata.* 13—4. A. alis caudatis elytro longioribus fusca capite thoraceque testaceis nigro maculatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus medium. Antennae fuscae. Caput gibbosum nigrum vertice testaceo lineis quinque nigris: lateralibus breuioribus. Thorax testaceus maculis punctisque nigris variegatus. Elytra plana, nigra margine deflexo, abdomine breuiora. Alae caudatae elytris paullo longiores, albae. Corpus fuscum ano fetis duabus villosis absque stylo.

*aquea.* 14—5. A. elytris albo hyalinis alis breuioribus, corpore flauescente.

Habitat in Rossia meridionali Dom. Boeber.

Corpus totum flauescens, immaculatum. Elytra omnino ouata, hyalina. Alae elytris longiores. Pedes postici parum elongati.

LOCUSTA. *Palpi filiformes.*

*Maxilla apice tridentata.*

*Labium bifidum: laciniis  
seta subulata.*

*Antennae setaceae.*

44—5. *L. viridis* thorace linea laterali ferruginea *ferricauda*,  
elytris brevissimis, ense recurvo, ferrato.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Præcedentibus paullo minor. Antennae longissimae, virides. Caput viride, immaculatum. Thorax viridis linea laterali ferruginea. Elytra brevia, plana, rotundata. Entis brevis, recurvus utrinque ferratus.

44—5. *L. viridis* elytris compressis abdomine dimidio brevioribus, ense recurvo inermi.

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Corpus paruum, totum viride, immaculatum. Antennae elongatae, setaceae. Elytra compressa, striata abdomine dimidio breviora. Entis brevis, recurvus margine integro.

46. *L. aptera atra* thorace plano: margine dilatato ferrato.

Habitat in Rossia meridionali Dom. Boeber.

Parua, tota atra. Antennae setaceae. Thorax magnus, planus margine undique dilatato ferrato. Abdomen brevissimum. Tibiae valde ferratae.

GRYLLUS. *Palpi* filiformes.

*Labium* rotundatum, bifidum: laciniis rotundatis.

*Antennae* filiformes.

- obscurus.* 33—4. *G. obscurus* linea dorsali flava.  
 Habitat in America boreali Dom; v. Rohr.  
 Statura et magnitudo *G. nervosi*. Caput obscurum antennis ferrugineis punctoque verticali flava. Thorax scaber, fuscus linea dorsali flava, postice rotundatus. Elytra obscure testacea margine tenuiori flavo. Alae obscurae. Pedes virescentes tibiis posticis spinis flavis apice nigris.
- Banian.* 33—4. *G. flavesceus* thorace plicis quatuor: secunda abbreviata.  
 Habitat in India orientali Dom. Daldorff.  
 Caput flavesceus fronte obtusa. Thorax plicis quatuor secunda abbreviata, inflexa, postice rotundatus. Elytra longitudine alarum virescentia. Pedes flavi tibiis posticis biferratis, virescentibus.
- muricatus.* 36—7. *G. thorace muricato*: crista postice bidentata, alis cinereis: fascia nigra.  
*Gryllus muricatus* Pallas Iter.  
 Habitat in Rossia meridionali Dom. Boeber valde sonorus.  
 Statura et magnitudo *G. striduli*. Thorax fuscus margine antico parum pallescente, muricatus antice, crista eleuata, postice bidenta-



10. Elytra obscura. Alae hyalinae fascia nigra.

59—60. *G. virefcens* thoracis dorso elytrisquc *f. quinipes.*  
 fuscis, tibus sanguineis.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura praecedentium. Antennae ferrugineae, apice nigrae. Caput virefcens vertice fusco. Thoracis dorsum late fuscum. Elytra fusca. Abdomen virefcens. Tibiae posticae sanguineae dentibus nigris.

61—2. *G. fuscus* elytris basi linea marginali viridi *Tamulus.*  
 di apice maculatis, pedibus posticis variegatis.

Habitat in India orientali D. Daldorff.

Statura parva praecedentium. Caput fuscum fronte vix prominula. Thorax fuscus linea dorsali subearinata, testacea. Elytra basi fusca linea marginali viridi, apice hyalina, fusco maculata. Alae fuscae, basi flavescentes. Pedes fulci, postici femoribus extus fuscis, apice albis, intus basi fuscis margine rufis, tunc annulo albo, fusco, albo apiceque nigris. Tibiae basi nigrae, tunc albae, tandem cyanae, denique rufae.

61—2. *G. thorace carinato obscurus* alis sanguineis, femoribus posticis ciliatis. *ciliatus.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Parvus. Caput fuscum fronte vix prominula. Thorax carinatus, fuscus. Elytra testacea,

---

immaculata. Alae sanguineae. Pedes fusc  
ci, postici testacei femoribus compressis:  
magine superiori pilis breuibus albis ci  
liato.

*scaber.*

62—3. G. scaber fuscus elytris abbreviatis,

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

An declaratus? Corpus paruum, fuscum, pun  
ctis eleuatis scabrum. Elytra corpore paul  
lo breuiora.

---

---

CLASSIS III.  
SYNISTATA.

MAXILLA BASI GENICULATA, CON-  
NATA CUM LABIO,

---

LEPISMA.

**O**s clypeo breui, rotundato, integro.

*Palpi* quatuor inaequales.

*anteriores* longiores filiformes, 6articulati: articulo ultimo longiori, subulato adnati maxillae dorso.

*posteriores* breviores, triarticulati: articulo ultimo crassiori, subsecuriformi adhaerentes labii medio.

*Mandibula* cornea, arcuata, acuta, edentula.

*Maxilla* bifida: laciniis aequalibus: exteriore rotundata, setosa, interiore acuta.

*Labium* membranaceum, rotundatum, profunde emarginatum.

*Antennae* setaceae.

PHRYGANEAE.

**O**s clypeo porrecto, angusto, acuto.

*Mandibulae* nullae.

*Labium* porrectum, acutum, membranaceum, apice submarginatum.

## PSOCUS.

Os clypeo parum porrecto, rotundato, emarginato.

*Palpi* quatuor inaequales.

*anteriores* subfiliformes quadriarticulati: articulis subaequalibus; exteriore parum crassiore adhaerentes maxillae dorso.

*posteriores* longiores quadriarticulati adnati labii medio.

*Mandibula* lata, cornea, arcuata, intus unidentata.

*Maxilla* cornea, elongata, linearis, apice bicrenata in vagina membranacea, obtusa latens, basi squama duplici suffulta.

*Labium* membranaceum, apice quadrifidum: lacinis lateralibus maioribus, palpiformibus.

*Antennae* setaceae.

## PANORPA.

Os clypeo ovato, fornicato, ciliato.

*Palpi* posteriores biarticulati, articulo baseos ovato, crassiori, secundo cylindrico, obtuso.

*Mandibula* cornea, recta, apice unidentata.

*Labium* breve, rotundatum, apice emarginatum, palpigerum.

LEPISMA. *Palpi* inaequales.

*Labium* membranaceum,  
rotundatum, emargina-  
tum.

*Antennae* fetaceae.

1—2. L. grisea nitens cauda trifeta: intermedia *thoracica*.  
longissima.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bose.

Statura et magnitudo L. polypodae. Anten-  
nae corpore fere longiores, fusco pallidoque  
variae. Corpus totum squamosum, grise-  
um, nitidum. Cauda trifeta setis albis: in-  
termedia corporis longitudine, lateralibus  
duplo minoribus.

3—4. L. cauda trifeta, thorace membranaceo ro-*vittata*.  
tunda, abdomine lineato.

Habitat in Italia Mus. Dom. Bose.

Statura et magnitudo L. lineatae. Caput fus-  
cescens antennis longis, pallidis. Thorax  
planus lateribus membranaceis, rotundatis,  
pallidis. Abdomen fuscum vittis quinque  
albidis, micantibus. Cauda pilis tribus vil-  
lofis et subtus setulis aliquot: intermedia elon-  
gata. Pedes pallidi.

PODURA. *Palpi* quatuor subclauati.

*Labium* bifidum.

*Antennae* filiformes.

16—17. P. albida cauda extensa bifida, thorace *cristata*.  
antice eleuato cristato.

Habitat in Kiliae syluis Dom. Weber.

Magna in hoc genere pallida antennis obscurioribus. Thorax antice eleuatus, cristatus, Cauda corpore dimidio breuior, alba.

SEMBLIS. *Maxilla* bifida.

*Labium* corneum.

*Antennae* filiformes.

*planata.*

6—7. S. nigra capite maculis duabus ferrugineis, abdomine subtus griseo: ano ferrugineo.

Habitat ad Galliae aquas Dom. Bose.

Maior S. bicaudata. Caput depressum, nigrum maculis duabus magnis baecos ferrugineis. Thorax quadratus, ater, immaculatus. Alae abdomine fere duplo longiores, obscurae, nigro maculatae. Abdomen griseificens ano ferrugineo fetis duabus longitudine abdominis, nigris. Pedes nigri.

*fuscata.*

10—11. S. ecaudata fusca alis fusco hyalinis nigro nervosis.

Habitat in Italia Dom. Allioni.

Statura S. viridis at paullo maior. Corpus fuscum, immaculatum. Pedes testacei. Alae obscure hyalinae nervis nigris striatae.

PHRYGANEAE. *Maxillae* totae connatae cum labio.

*Antennae* fetaceae.

*villosa.*

6—7. P. testacea alis hirsutis pallidioribus.

Habitat in Dalekarliae Alpibus Dom. Paykull.

- Nimis affinis *P. pilosae* at paullo minor et brevior. Antennae breves, ferrugineae. Caput et thorax hirta. Alae pallidiores pilis longius, erectis hirtae.
- 16—17. *P. nigra* alis griseis: venis atris striatis, *neruosa*.  
Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.  
Statura et magnitudo *P. striatae*. Antennae nigrae, corpore longiores. Caput et thorax villosa, nigra. Alae griseae nervis elevatis, distinctis, atris. Pedes pallefcentes.
- 16—17. *P. testacea* alis vitta nigricante, antennis longitudine corporis, *vittata*.  
Habitat ad Kiliae aquas.  
Parua. Antennae vix alis longiores, rufae. Caput nigrum. Thorax testaceus. Alae testaceae vitta media nigricante, quae basin haud attingit ad apicem vero dilatatus.
- 18—19. *P. alis fuscis*, macula postica lunata flavescente, *tigurinen-sis*.  
Habitat frequens in lacu Tigurinensi.  
Parua. Antennae flavescentes, apice obscuriores longitudine fere corporis. Caput et thorax nigra, immaculata. Alae fuscae macula magna lunata, flavescente, quae interdum annulum format. Pedes flavescentes.
- 28—9. *P. alis griseis ciliatis*, antennis brevibus. *Waeneri*.  
*Phryganea Waeneri* Linn. syst. nat. 2. 911. 16.  
Fn. Sv. 1493.  
Habitat ad lacum Waeneri Sueciae.
- 30—1. *P. cinerea* alis albis immaculatis, *alba*.  
Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.

Statura parva. P. minutae. Antennae pallidae.  
Corpus cinereum. Alae albae, immacu-  
latae.

*pygmaea.* 31—2. P. atra alis fuscis immaculatis, antennis  
mediocribus.

Habitat Parisiis Mus. Dom. Bose.

Statura parva P. pusillae. Corpus cum anten-  
nis corpore haud longioribus atrum. Alae  
omnes fuscae.

HEMEROBIUS. *Maxilla* recta, apice  
fissa.

*Labium* corneum, for-  
nicatum.

*Antennae* setaceae.

*nebulosus.* 1—2. H. fuscus alis albo nigroque nebulosis.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Sequentibus maior. Alae valde deflexae nebu-  
losae.

*candidus.* 5—6. H. pallidus alis hyalinis: anticis punctis  
tribus fuscis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorf.

Corpus vix H. albo minus, tenerum, pallidum  
antennis filosis, corpore longioribus. Alae  
magnae, patulae, hyalinae, nitidae punctis  
anticarum tribus nigris, altero ad basin mar-  
ginis tenuioris, secundo pone medium disci,  
tertio versus apicem marginis crassioris.



PSOCUS. *Maxilla* elongata, linearis  
squama duplici baseos sus-  
fulta.

*Labium* quadrifidum.

*Antennae* setaceae.

1. P. niger ore pedibusque pallidis, antennis lon- *longicornis.*  
gioribus fuscis.  
*Hemerobius longicornis* Ent. syst. 2. 84. 14.  
Habitat in Holfatia.
2. P. niger thorace abdomineque flavis. *flavicans.*  
*Hemerobius flavicans* Ent. syst. 2. 86. 22. Linn.  
syst. nat. 2. 913. 13. Fn. Su. 1512.  
Habitat in Europae hortis.
3. P. fuscus flavo maculatus, alis fusco striatis: *striatulus.*  
posticis immaculatis.  
*Hemerobius striatulus* Ent. syst. 2. 85. 15.  
Habitat in Europae hortis.
4. P. alis albis: fasciis tribus atomisque numero- *fasciatus.*  
fis nigris.  
*Hemerobius fasciatus* Ent. syst. 2. 85. 17.  
Habitat Kiliae.
5. P. alis albis: maculis fuscis postice punctis sex *6punctatus.*  
distinctis, antennis fuscis.  
*Hemerobius 6punctatus* Ent. syst. 2. 86. 20. Linn.  
syst. Nat. 2. 913. 12. Fn. Su. 1511.

---

Psoci corpus parvum, tenerum, glabrum immar-  
ginatum, agile, capite exserto ovato, ore obruso, ocu-  
lis globosis, prominulis, lateralibus, antennis elonga-  
tis, distantibus, in cantho oculorum insertis, thorace  
gibbo, abdomine brevi, ovato, alis quatuor aequali-  
bus, corpore longioribus, compressis, pedibus tenui-  
bus, longiusculis, tarsi quinquearticulatis, colore vario.

Geoff. Inf. 2. 250. 10.

Habitat in Europae hortis.

*picicornis*. 6. P. niger alis anticis albo fuscoque variis, antennis longis hirtis.

*Hemerobius picicornis* Ent. syst. 2. 86. 21.

Habitat in Dania Dom. de Scheffedt.

*2punctatus*. 7. P. flavo fuscoque variis alis punctis duobus nigris.

*Hemerobius 2punctatus* Ent. syst. 2. 86. 23. Linn.

Fn. Su. 1514.

Habitat in Europae hortis.

*4punctatus*. 8. P. alis albis: basi punctis quatuor atris apice fusco radiatis.

*Hemerobius 4punctatus* Ent. syst. 2. 86. 24.

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

*abdominalis*. 9. P. fuscus abdomine flavo: ano nigro.

*Hemerobius abdominalis* Ent. syst. 2. 86. 25.

Habitat in Anglia, Norwegia.

*pulfatorius*. 10. P. apterus ore rubro, oculis luteis.

*Hemerobius pulfatorius* Ent. syst. 2. 87. 26.

*Termes pulfatorium* Linn. syst. nat. 2. 1015. 2.

Fn. Su. 1937. Geoff. Inf. 2. 601. 12.

Degeer Inf. 7. 41. 1. tab. 4. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 29. fig. 3.

Roland. Act. Holm. 1754. 152.

Schaeff. Elem. tab. 22. fig. 144.

Bradl. nat. tab. 27. fig. 3.

Habitat in Europa, America frequens in domibus.

*fatidicus*. 11. P. apterus ore pallido, oculis fuscis.

*Hemerobius fatidicus* Ent. syst. 2. 87. 27.

*Termes fatidicum* Linn. syst. Nat. 2. 1016. 3.

Fn. Su. 1938.

Frit h. Inf. 11. 2. tab. 10.

Habitat in Europae quisquiliis.

Vix a praecedente satis distinctus.

**MYRMELEON.** *Palpi sex inaequales. postici* multo longiores: articulis ultimis duobus extrorsum crassioribus.

*Antennae extrorsum crassiores.*

3—4. *M. alis hyalinis: macula marginis tenuioris fusca, thorace flavo lineato.* *tetragrammicum.*

*Myrmeleon tetragrammicum* Pallas Iter.

Habitat in Rossia meridionali Dom. Boeber.

Paullo maior *M. formicario*. Antennae extrorsum crassiores, multiarticulatae, nigrae articulorum apicibus flavis. Caput nigrum ore flavo. Thorax niger lineis tribus flavis. Abdomen teste amicissimo Boeber in specimine vivo coeruleo fuscoque annulatum, in nostro emortuo nigrum. Alae hyalinae, anticis maculis aliquot fuscis, omnibus macula distincta ad marginem tenuiorem signateque ordinario albo. Pedes flavi.

5—6. *M. alis hyalinis immaculatis: neruo marginali nigro alboque punctato, thorace nigro flavo lineato.* *lineatum.*

Habitat in Rossia meridionali Dom. Poeber.  
 Statura et magnitudo *M. formicarii*. Antennae  
 nigrae. Caput fuscum ore flavo verticeque  
 flavo variegato. Thorax niger linea laterali  
 flava. Abdomen fuscum; immaculatum.  
 Alae hyalinae nervo ad marginem crassiorum  
 albo nigroque punctato, reliquis flavescentibus.  
 Stigma ordinarium album. Pedes  
 flavi femoribus apice nigris.

*picium.*

6—7. *M. alis* hyalinis immaculatis, capite thora-  
 ceque flavis nigro maculatis, abdomine ni-  
 gro: linea laterali flava.

Habitat in Rossia meridionali Dom. Boeber.

Statura et magnitudo praecedentium. Anten-  
 nae extrorsum crassiores, nigrae. Caput fla-  
 vum macula magna, frontali lineaque ver-  
 ticali nigris. Thorax flavus linea dorsali li-  
 turaque ante alas nigris. Abdomen nigrum  
 utrinque linea laterali flava. Alae hyalinae  
 stigmatate ordinario pallido, obsoleto. Pedes  
 flavi.

*ermineum.*

6—7. *M. alis* hyalinis immaculatis: nervo mar-  
 ginali flavescente griseum abdomine nigro.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Medium. Antennae extrorsum crassiores, for-  
 nicatae, griseae. Caput et thorax grisea, im-  
 maculata. Abdomen nigrum, immaculatum.  
 Alae hyalinae, nitidae nervis reticulatae ner-  
 voque maiori ante marginem exteriorum te-  
 staceo.

7—8. *M. alis hyalinis: nervis albo nigroque punctatis.*  
*Etatis apice fusco punctatis.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus paruum. Antennae exteriorum crassiores, incurvae. Caput et thorax obscure cinerea, fusco lineata. Abdomen fuscum. Alae hyalinae nervis albo nigroque punctatis et apice strigae duae e maculis minutis fuscis. Stigma ordinarium omnino deest.

8—9. *M. alis hyalinis immaculatis fuscum capite* *urfinum.*  
*flavo nigro maculato.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus paruum. Antennae mihi desunt. Caput flavum vertice maculis plurimis fuscis. Thorax et abdomen fusca, immaculata. Alae hyalinae, nervis reticulatae, immaculatae. Pedes cinerei.

ASCALAPHUS. *Palpi sex subaequales, filiformes.*  
*Antennae elongatae, clauatae.*

4—5. *A. alis albis: posticis macula anguli ani fusca, antennis clava fulva.* *surinamensis.*

Habitat Surinami Dom. Weber.

Statura praecedentium. Antennae longissimae, nigrae clava oblonga, fulva. Corpus hirtum, nigrum abdomine subtus fulvo maculato. Alae albae posticae macula ad angulum ani fusca.

PANORPA. Os porrectum, corneum.  
*Maxilla* truncata, bifida.  
*Antennae* filiformes.

*Coa,*

7. P. alis erectis flavis nigro variegatis: posticis linearibus nigris: fasciis tribus albis.

*Panorpa Coa* Ent. syst. 2. 98. 7. Linn. syst. Nat. 2. 915. 4. Act. Holm. 1747. 176. tab. 6. fig. 1.

Ruyfch. Thes. Anim. tab. 1. fig. 2. D.

Petiv. Gazoph. 1. tab. 73. fig. 1.

Forsk. Descript. Anim. 97. tab. 25. fig. 2.

Habitat in Archipelagi Insulis.

Corpus nigrum. Alae anticae erectae, rotundatae flavae, nigro variegatae, posticae longissimae, lineares, apice lanceolatae fasciis tribus pone medium albis: posteriore terminali.

*halterata*

8. P. alis erectis pallidis: costa fusca, posticis linearibus longissimis subbielauatis.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Bose.

Omnino a praecedente distincta. Corpus flavum, nigro varium. Alae anticae rotundatae, pallidae, reticulatae, costa late fusca. Posticae lineares, nigrae apice dilatatae, in medio coarctatae, fasciis tribus albis: intermedia minore.

---

CLASSIS IV.

P I E Z A T A.

MAXILLA CORNEA, COMPRESSA, SAEPE  
ELONGATA.

---

O R Y S S U S.

**O**s clypeo rotundato, porrecto, integro.

*Palpi* quatuor, inaequales.

*anteriores* porrecti, filiformes, quinquearticulati: articulo tertio longiori, cylindrico maxillae dorso inferti.

*posteriores* breviores, triarticulati: articulis duobus baseos cylindricis, ultimo sublongiori, ovato labii medio interiori inferti.

*Mandibula* brevis, crassa, cornea, edentula.

*Maxilla* coriacea, compressa, apice membranacea, rotundata.

*Labium* membranaceum, apice coriaceum, elongatum, rotundatum, integrum.

*Antennae* laterales maris 12articulatae, feminae 10articulatae, filiformes.

BANCHUS.

**O**s clypeo brevi, corneo, rotundato, integro.

*Palpi* quatuor porrecti, inaequales, filiformes.

*anteriores* longiores, sexarticulati: articulis cylindricis, aequalibus adhaerentes maxillae dorso.

*posteriores* paullo breviores, quadriarticulati: articulis cylindricis aequalibus adnati labii medio.

*Mandibula* magna, lata, fornicata, apice truncata, dentata.

*Maxilla* brevis, membranacea, rotundata, integra.

*Labium* basi corneum, cylindricum, apice membranaceum, rotundatum, integrum.

*Antennae* fetaceae.

## OPHION.

Os clypeo breui rotundato, integro.

*Palpi* quatuor elongati, inaequales, filiformes.

*anteriores* longiores, sexarticulati: articulis cylindricis, subaequalibus adhaerentes maxillae dorso.

*posteriores* quadriarticulati: articulis cylindricis adnati labii apice.

*Mandibula* porrecta, cornea, incurva apice bidentata.

*Maxilla* brevis, membranacea, rotundata, integra.

*Labium* breve, ovatum, membranaceum, integrum, apice palpigerum.

*Antennae* fetaceae.

## FOENUS.

Os clypeo breui, rotundato, emarginato.



*Palpi* quatuor breues, subaequales, filiformes.

*anteriores* vix maxilla longiores, sexarticulati: articulis cylindricis, subaequalibus adhaerentes maxillae dorso.

*posteriores* paullo breuiores, quadriarticulati adnati labii medio.

*Mandibula* cornea, arcuata, acuta, edentula.

*Maxilla* breuis, membranacea, compressa, apice rotundata, intus unidentata.

*Labium* breue, membranaceum, transuersum, integrum.

*Antennae* breues, filiformes.

## S P H E X.

Os lingua porrecta, trifida.

*Clypeus* breuis rotundatus, corneus, integer.

*Palpi* quatuor porrecti, subaequales, filiformes.

*anteriores* vix longiores, sexarticulati: articulis cylindricis adhaerentes maxillae dorso.

*posteriores* quinquearticulati: articulis cylindricis, aequalibus adnati labio pone medium.

*Mandibula* incurua, obtusa, cornea, in medio unidentata.

*Maxilla* elongata, compressa, cornea, integra laciniam anteriorem linguae vaginantem constituens.

*Labium* maxilla paullo longius, basi corneum, cylindricum, apice membranaceum, depressum, in medio sita parua, subulata suffultum apice emarginatum.

*Antennae* filiformes.

S. speciosa, ichneumonea, grossa aliae labium maius, magis emarginatum gerunt at vix distinctum genus.

## POMPILUS.

*Os* clypeo breui, corneo, rotundato, integro.

*Palpi* quatuor porrecti, inaequales, filiformes.

*anteriores* longiores, sexarticulati: articulis tribus anterioribus subrhomboidalibus, reliquis longioribus, cylindricis maxillae dorso adhaerentes.

*posteriores* breuiores, quadriarticulati: articulis tribus subrhomboidalibus: ultimo ouato adnati labii apice.

*Mandibula* recta, cornea, medio unidentata.

*Maxilla* breuis, compressa bifida: lacinia exterior cornea, rotundata, interiore membranacea, obtusa.

*Labium* breue longitudine maxillarum, corneum, rotundatum, integrum apice palpigerum.

*Antennae* breues, setaceae.

CYNIPS. *Palpi* inaequales, subcapitati.  
*Labium* corneum, integrum.  
*Antennae* moniliformes.

1—2. C. atra nitida abdomine compresso, tibiis *compressa*.  
 ferrugineis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Magna in hoc genere. Corpus totum atrum,  
 nitidum, immaculatum tibiis solis rufis. Ab-  
 domen valde compressum.

10—11. C. atra nitida thorace pedibusque palli- *Quercus*  
 de flavis. *Ilicis*.

Habitat in Galla parua, depressa, associata, mo-  
 nothalama Ilicis Gallo Provinciae Mus. Dom.  
 Bose.

Parua. Caput atrum, nitidum. Thorax stria-  
 tus, pallide flavus. Abdomen compressum,  
 atrum, nitidum. Alae elongatae, albae.  
 Pedes pallidi.

10—11. C. grisea abdomine ferrugineo nitido: *Quercus*  
 macula dorsali atra. *radicis*.

*Cynips quercus radicis* Bose. Journ. de Phys.  
 1794. fig.

Habitat in Galla lignea, polythalama dura in  
 radicibus Quercus Roboris.

Statura et summa certe affinitas C. Quercus To-  
 jae at galla omnino differt.

10—11. C. ferrugineo flava, alis hyalinis imma- *Quercus*  
 culatis, *terminalis*.

Reaum. Inf. 3. tab. 41. fig. 1—5.

Habitat in Galla magna, fungosa, rotundata, polythalamia ramulos Quercus terminante Mus. Dom. Bosc.

Media tota flava alis hyalinis.

*Serratulae.* 15—6. *C. atra nitida* antennis verticillato pilosis. Reaum. Inf. 3. tab. 1.

Habitat in Galla lignea, rotundata, utrinque attenuata, polythalamia caulis *Serratulae arvensis* Galliae Mus. Dom. Bosc.

Media, tota atra, nitida alis folis albis. Antennae filiformes, nigrae, verticillatae, pilosae. Abdomen compressum, adscendens. Pedes nigri tibiis obscure piceis. *Variat* forte sexu maior antennis minus verticillatis, vix tamen distincta.

TENTHREDO. *Palpi* filiformes.

*Labium* trifidum.

*Antennae* clauatae  
aut filiformes.

*laeta.* 10—11. *T.* antennis clauatis nigra abdominis segmentis margine laterali flavis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura et magnitudo *T. sericeae*. Caput, antennae, thorax nigra, immaculata. Abdomen nigrum segmentis baseos utrinque margine, reliquis margine toto flavo. Alae albae costa basi flavescente.

*furcata.* 28—29. *T.* antennis furcatis pectinatisque nigra abdomine rufo.

*Tenthredo furcata* Vill. 3. tab. 7. fig. 16. 17.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bose.

Statura et magnitudo omnino *T. Iuniperi*. Antennae nigrae usque ad articulum primum bifidae: laciniis pectinatis. Caput et thorax nigra. Abdomen ferrugineum articulo primo et secundo nigris. Alae hyalinae. Pedes ferrugini. Variat sexu antennis haud furcatis.

31—2. *T. antennis septemnodiiis nigra antennis pallicornis.* scutello abdominisque segmentis apice albidis.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bose.

Magnitudo *T. flavicornis*. Caput nigrum labio mox albo, mox nigro. Thorax ater margine antico utrinque puncto maiori, terminali, albo. Scutellum album. Abdomen segmentis basi nigris, apice late pallidis. Pedes flavi femoribus nigris.

33—4. *T. antennis septemnodiiis atra thorace segmenta-* immaculato, abdominis segmentis apice *tibia,* *ria,* *biisque* albis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Magna. Caput cum antennis atrum. Thorax ater, immaculatus. Abdomen atrum segmentorum margine albo. Pedes nigri, tibiis albis.

36—7. *T. antennis septemnodiiis nigra abdomi-* *stigma.* *nis,* *segmentis intermediis rufis,* *scutello* *stigmatique* alarum albis.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bose.

Affinis omnino *T. nassatae*. Antennae supra nigrae, subtus piceae. Caput atrum. Thorax ater puncto calloso ante alas margine albo iuncto. Scutellum album et puncta duo parva sub scutello. Abdomen nigrum segmento 3. 4. 5. 6. rufis. Alae hyalinae stigmatate ordinario, albo. Pedes rufi.

*abdominalis.*

38—9. *T. antennis septemnodis atra, abdomine rufo basi atro.*

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bose.

Caput atrum ore rufo. Antennae supra nigrae, subtus rufae. Thorax ater. Abdomen breue, ouatum, rufam segmentis anticis duobus atris. Alae basi nigrae, apice obscurae. Pedes rufi.

*melanocephalus.*

38—9. *T. antennis septemnodis flava capite atro.*

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bose.

Statura parua *T. Alui*. Caput cum antennis atrum. Thorax rufus scutello subnigricante. Abdomen parum pallidius. Alae incumbentes, hyalinae. Pedes flauis.

*velox.*

47—8. *T. antennis septemnodis atra ore antennarum apice punctoque femorali albis.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Distincta omnino a praecedentibus et minor. Antennae nigrae, apice albae. Caput atrum ore albo. Thorax ater, immaculatus. Abdomen breue, depressum, atrum, immaculatum. Pedes ferruginei femoribus posticis basi atris puncto albo. Alae hyalinae.

51—52. T. antennis septemnodis atra scutello *zcinosa*.  
abdominis cingulis duobus anoque albis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino praececedentis at distincta et alia.

Antennae breves, nigrae articulo primo crassiori albo. Caput nigrum ore albo. Thorax niger macula utriusque ante alas scutelloque albis. Abdomen atrum cingulis duobus anoque albis. Pedes albi, postici nigri femoribus tibiisque basi albis.

58—9. T. antennis septemnodis atra abdominis *frigosa*.  
segmento quarto rufo, penultimis duobus utrinque linea albida.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bose.

Statura omnino T. blandae. Caput atrum labio albo. Thorax niger puncto ante alas scutelloque albis. Abdomen cylindricum, nigrum segmento quarto ferrugineo, septimo et octavo utrinque lineola glauca. Pedes rufi tibiis basi annulo nigro.

60—1. T. antennis septemnodis atra thorace ab-*fera*,  
domine femoribusque posticis albo punctatis.

*Tenthredo fera* Scop. Fl. et Fn. Inf. tab. 22.

Geoff. Inf. 2. Tenth. 18.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bose.

Affinis videtur T. 12 punctatae. Antennae nigrae. Caput nigrum labio albo. Thorax niger punctis duobus anticis scutelloque albis. Abdomen nigrum utrinque lineolis duabus approximatis pone medium anoque albis. Pedes nigri femoribus posticis macula

magna baseos tibiisque omnibus albis. Alae obscurae.

*punctata.* 71—2. T. antennis multiarticulatis nigra capite punctis thorace margine abdomine strigis albis.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bose.

Statura omnino T. sylvatica. Caput magnum atrum punctis quinque albis in orbem posit. Thorax niger margine antico albo. Abdomen planum, atrum strigis 4—5 albis, obsolete. Pedes ferruginei femoribus macula nigra.

ORYSSUS. *Palpi* postici breviores filiformes.

*Labium* elongatum, rotundatum, integrum.

*Antennae* filiformes.

*coronatus.* 1. O. thorace maculato abdomine apice rufo: puncto anali albo.

*Sphex abietina* Scop. Ent. carn. 788.

Habitat in Galliae arboribus Dom. Latreille.

Corpus medium statura Sirex. Antennae nigrae articulo 2. 3. 4. superne albis. Caput nigrum orbita oculorum alba. Thorax scaber, niger puncto utrinque ante alas albo. Abdomen basi nigrum apice rufum puncto anali albo. Alae albae ante apicem nigrae. Pedes albi femoribus nigris.

Faemina aculeo conuoluto, elongato.



2. O. thorace immaculato, abdomine basi nigro *Vespertilio*  
apice rufo. *lio.*

*Sirex Vespertilio* Ent. syst. 2. 129. 19.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura et summa affinitas praecedentis at paulo maior.

ICHNEUMON. *Labium* cylindricum,  
apice membranaceum, emarginatum;  
medio palpigerum.

*Antennae* fetaceae.

- 17—18. I. scutello albo, thorace maculato ater *natatorius*.  
abdominis segmento secundo tertioque punctis duobus albis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus magnum, atrum. Antennae atrae anulo in medio albo. Caput atrum orbita oculorum albida. Thorax niger punctis duobus ante alas scutelloque flavicantibus. Abdomen atrum, nitidum segmento secundo punctis duobus maioribus basi coeuntibus, tertio punctis duobus distinctis flavicantibus. Pedes rufi.

- 30—1. I. scutello albo ater thorace maculato, abdomine rufo: primo segmento nigro. *exspeñiorius*.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Differt manifeste ab. I. pilorio minor. Caput atrum mandibulis rufis, apice nigris. Thorax ater, nitidus punctis duobus ante alas

albis. Scutellam niueum. Abdomen oblongum, planum, rufum primo segmento atro. Pedes rufi femoribus nigris.

*laminatorius.*

33—4. I. scutello albo thorace maculato ater labio albo: lineis tribus nigris.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Magnus. Antennae nigrae, immacolatae. Caput atrum labio albo lineis tribus abbreviatis, nigris. Orbita oculorum alba. Thorax niger puncto calloso ante alas, puncto sub alis lineaque utrinque ad marginem ducta scutelloque albis. Abdomen atrum. Pedes albo nigroque varii.

*rugatorius.*

39—40. I. scutello albo, thorace maculato ater abdominis segmento secundo tertioque basi flavis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino I. fasciatorii. Antennae subtus rufae. Caput atrum orbita oculorum fasciaeque labii flavis. Thorax ater puncto sub alis albo, sub scutello bispiuosus. Abdomen oblongum, atrum segmento secundo tertioque basi flavis. Petiolus canaliculatus. Alae flavescentes. Pedes ferruginei femoribus atris.

*fluviatorius.*

54—5. I. scutello albo fulvus antennis abdominisque ultimis segmentis atris.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Magnus. Antennae totae atrae. Caput fulvum oculis stemmatibusque verticalibus atris. Thorax fulvus interdum immaculatus, in-

terdum dorso nigro. Scutellum album. Abdomen oblongum, planum, fulvum ultimis duobus segmentis atris, nitidis. Alae flavescentes. Pedes fulvi femoribus posticis apice atris.

- 55—6. I. scutello albo, thorace maculato, abdomine rufo: petiolo nigro. *similatorius*.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bose.

Affinis I. fulvior at minor. Antennae porrectae, nigrae. Caput nigrum orbita oculorum parva, alba. Thorax niger lineola antica utrinque scutelloque albis. Abdomen ovatum, rufum petiolo nigro. Pedes rufi femoribus nigris.

- 57—8. I. scutello albo: puncto fulvo niger thorace ante scutellum fulvo flavoque vario. *oculatorius*.

Habitat Parisiis Mus. D. Bose.

Medius. Caput nigrum sub antennis oculorumque orbita albis. Thorax niger ante scutellum flavus: maculis tribus magnis, oblongis, obscure fulvis: intermedia minore, pone scutellum niger. Scutellum album macula magna media fulva. Abdomen longiusculum, atrum segmentorum marginibus vix fulvis. Alae hyalinae. Pedes rufi.

- 63—4. I. scutello albo, thorace immaculato, abdominis segmento secundo tertioque rufis. *erectorius*.

Habitat Kiliae.

Statura et magnitudo I. luctatorii at distinctus et alius. Caput et thorax atra, immaculata. Scutellum album. Abdominis primum

segmentum nigrum linea dorsali eleuata, 2.  
3. rufa, reliqua nigra. Pedes rufi tibiis po-  
fticis bafi albis.

*truncator.* 81—2. I. niger thorace pedibusque ferrugineis.  
Habitat Parifiis Muf. Dom. Bosc.

Paruus. Antennae subferrugineae fascia media  
alba. Caput nigrum mandibulis palpisque  
albidis. Thorax laeuis, ferrugineus, im-  
maculatus. Abdomen longiusculum, subcy-  
lindricum, atrum aculeo breuiffimo. Alae  
vix abdominis longitudine, hyalinae. Pe-  
des rufi.

*luteator.* 87—8. I. ferrugineus abdomine apice atro: ano  
albo.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Medius. Antennae primo articulo ferrugineo  
bafi fuscae, apice nigrae, in medio albo an-  
nulateae. Caput et thorax ferruginea, im-  
maculata. Abdomen ferrugineum, apice  
atrum ano supra albo. Pedes ferruginei, po-  
ftici geniculis atris.

*brunneator.* 28—9. I. ferrugineus capite atro.

Habitat: Cajennae Dom. Richard.

Paruus. Antennae porrectae annulo lato albo.  
Caput atrum, immaculatum. Corpus fer-  
rugineum. Alae hyalinae, nitidae.

*abbrevia-* 89—90. I. ater abdomine rufo apice atro: striga  
*tor.* alba, alis breuiffimis.

Habitat in Kiliae muris Dom. Weber.

Medius. Antennae bafi rufae, medio albae, api-

ce nigrae. Caput et thorax atra, immaculata. Abdomen rufum ano late nigro: stigma postica niuea. Alae breuissimae, ovaetae, albidae. Pedes rufi femoribus posticis apice nigris.

- 92—3. I. ferrugineus capitis vertice atro, alis fuscis: *laminator*.  
costa dimidiata ferruginea.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Affinis videtur I. castrator at duplo major. Caput ferrugineum antennis, vertice nucaque atris. Thorax ferrugineus puncto paruo, dorsali, atro. Abdomen planum, depressum, ferrugineum aculeo exserto, nigro. Alae fuscae, basi pallidiores costa ferruginea, in medio stigmate magno, ferrugineo utrinque atro notato. Pedes ferruginei.

- 92—3. I. ferrugineus antennis capitis vertice thoracisque dorso nigris, alis fuscis: stigmate nigro; puncto flavescente. *castrator*.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura et magnitudo I. desertor. Antennae nigrae. Caput ferrugineum vertice nigro. Thorax niger margine antico et laterali, ferrugineo. Abdomen ferrugineum aculeo breui, atro: setis lateralibus brevioribus. Alae fuscae stigmate flauo utrinque nigro terminato. Pedes ferruginei femoribus tibiisque posticis apice puncto nigro.

- 93—4. I. niger abdomine coccineo, alis albidis: *fasciator*.  
fascia lata nigra.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Medius. Caput et thorax atra, nitida, immaculata. Abdomen rufum. Anus forte niger mihi deest. Alae albiae fascia media lata, nigra. Pedes nigri.

*spinator.* 100—1. I. ferrugineus vertice atro abdominis segmentis punctis duobus alarumque macula apicis nigris.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Dom. Daldorff.

Medius. Antennae nigrae, basi flavae. Caput ferrugineum vertice atro. Thorax ferrugineus linea dorsali, antica atra. Abdomen ferrugineum segmento singulo punctis duobus parvis, nigris. Alae hyalinae macula magna versus apicem fusca. Pedes ferruginei.

*ferrator.* 106—7. I. ater alis fuscis: lunula pallida, abdominis segmento primo secundo tertioque rufis, femoribus posticis ferratis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Maior. Caput orbiculatum et thorax atra immaculata. Alae fuscae lunula obsoleta, pallida ad marginem crassiore. Abdomen clavatum segmento primo elongato, cylindrico, secundo tertioque rufis. Aculeus longitudine corporis. Pedes rufi femoribus atris puncto apicis albo, postica ferrata.

*urinator.* 111—12. I. niger thorace antice rufo, abdomine rufo: maculis dorsalibus nigris, alis fuscis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura parva I. denigratoris. Antennae nigrae. Caput nigrum, immaculatum. Thorax an-

tice rufus, postice niger. Abdomen rufum maculis dorsalibus bascos nigris. Alae fuscae. Pedes nigri.

- 111—12. I. ater abdomine rufo: linea dorsali *minutator*.  
atra, alis fuscis.

Habitat in Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus parvum, atrum, immaculatum. Abdomen rufum linea dorsali atra. Alae fuscescentes. Pedes rufi femoribus basi nigris.

- 111—12. I. niger abdomine ferrugineo alis fuscis: *elektor*.  
macula flava basi pallidioribus.

Habitat in Cajennae Dom. Richard.

Distincta omnino ab. I. denigrator corpore paullo maiore, minus atro, abdomine magis elongato ferrugineo, aculeo nigro. Alae basi pallidiores, apice fuscae fligmate marginali magno, flavo. Pedes nigri.

- 127—28. I. niger abdomine obscure ferrugineo: *carinator*.  
petiolo bicarinato nigro.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Medius. Caput nigrum; sub antennis album linea media nigra. Thorax niger puncto ante alas alioque sub alis albis. Abdomen obscure rufum petiolo brevi lineis duabus elevatis carinato, nigro. Pedes rufi, postici nigri.

- 131—2. I. ater thorace antice pedibusque ferrugineis: *calculator*.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Medius. Caput nigrum ore flavo. Thorax antice rufus, postice sub scutello subrusque ni-

ger. Abdomen subpetiolatum, atrum aculeo exserto fere longitudine corporis. Pedes rufi, postici atrii tibiis basi albis. Alae hyalinae stigmate atro.

Alium ecaudatum abdomine sessili ex Italia accipi, an distinctus?

*firmator.* 135—6. I. ecaudatus ater abdominis segmento secundo tertioque rufis, ultimis apice albis. Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura et magnitudo I. castigatoris. Caput atrum subantennis punctis pallidis. Thorax ater, immaculatus. Abdominis primum segmentum incurvum, atrum, 2. 3. ferruginea, ultima margine albo. Pedes ferruginei, postici nigri.

*tripunctator.* 135—6. I. ecaudatus ater thorace immaculato, abdomine punctis tribus albis.

Habitat in Gallia Dom. Coquebert.

Medius. Corpus atrum. Puncta duo alba in segmento secundo et unicuique in quinto. Femora postica rufa.

*exhaustator.* 138—9. I. niger abdomine rufo basi apiceque nigro: aculeo recurvo falcato.

Habitat Kiliae Dom. Weber.

Parvus. Caput et thorax nigra, immaculata mandibulis folis ferrugineis. Abdomen breve, petiolatum, apice compressum, truncatum, rufum basi apiceque nigrum. Aculeus longitudine abdominis recurvus, arcuatus, niger. Pedes ferruginei femoribus com-



pressis. Alae obscurae macula marginali  
ata.

- 177—8. I. ater abdominis segmento secundo ma-*campanula-*  
ximo ferrugineo, pedibus rufis. *tor.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Medius. Caput, antennae, thorax nigra, im-  
maculata. Abdomen nitidum, basi apiceque  
attenuatum, nigrum segmento secundo ma-  
ximo, campanulato, ferrugineo. Alae hya-  
linae puncto costali nigro. Pedes rufi.

- 182—3. I. ater abdomine depresso plano, pedi-*deprimator.*  
bus rufis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus paruum, atrum, immaculatum. Ab-  
domen singulare in hoc genere breue, de-  
pressum, planum. Alae obscurae. Pedes  
omnes rufi.

- 162—3. I. ater abdomine piceo: aculeo falcato, *emarciator.*  
pedibus rufis alis abbreviatis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Medius. Caput et thorax atra immaculata.  
Abdomen oblongum, piceum, nitidum acu-  
leo longitudine abdominis, rigido, falcato.  
Alae breues at bene explicatae, obscurae  
puncto magno costali nigro. Pedes rufi.

- 189—90. I. fusco ferrugineoque varius abdomi-*clauatus.*  
ne clauato ferrugineo: lunulis lateralibus fla-  
uis nigro innatis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Maximus in hoc genere. Antennae luteae. Ca-  
put et thorax ferrugineo fuscoque varia

Abdomen compressum, clauatum ano dilatato ferrugineum lunula magna flaua macula nigra innata utrinque in singulo segmento; primo toto flauo. Aculeus corpore longior. Pedes flauis.

*ferrugineus.* 189—90. I. fuluus abdominis segmentis utrinque puncto flauo.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Magnus. Caput fuluum mandibulis stemmatibusque nigris. Thorax fuluus lineis duabus dorsalibus, fere obsoletis, nigris punctoque sub alis flauo. Abdomen petiolatum, fuluum utrinque punctis 4—6 flauis. Aculeus niger longitudine abdominis. Alae alidae macula ordinaria flaua.

*testaceus.* 189—90. I. luteus abdomine ouato depresso, alis stigmatate luteo.

Habitat in Germania Dom. Daldorff.

Medius. Corpus totum luteum, immaculatum. Antennae paullo obscuriores articulo primo luteo. Alae hyalinae stigmatate luteo. Abdomen ouatum, depressum segmentis distinctis. Aculeus breuissimus.

*bidens.* 203—4. I. ater abdominis segmentis ultimis margine albis, petiolo bidentato.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Medius. Antennae ferrugineae. Caput nigrum sub antennis flauum macula magna, frontali, triangulari nigra. Thorax niger, immaculatus. Abdomen petiolatum, ouatum, atrum segmentorum marginibus imprimis ul-

timis albis. Petiolus in medio denticulis duobus parvis, elevatis. Pedes rufi plantis posticis fuscis. Alae hyalinae stigmatate flavo.

- 205—6. *I. flavus* capitis vertice thorace sub scutello aculeoque nigris, alis puncto marginali flavo.

Habitat Kiliae Weber.

Parvus. Antennae flavae, nigro annulatae. Caput flavum vertice nigro. Thorax flavus puncto elevato marginis antici atro, sub scutello niger. Abdomen ovatum, flavum aculeo brevi, nigro. Alae hyalinae macula marginali, ordinaria, flava. Pedes flavi.

- 207—8. *I. ater* abdominis petiolo ferrugineo, *umbratus*, alis fuscis: striga media apiceque albis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus paruum *I. cincti*. Antennae ferrugineae. Caput nigrum. Thorax niger, sub scutello ferrugineus. Abdomen atrum, nitidum petiolo toto ferrugineo. Aculeus exsertus longitudine abdominis. Alae fulcae striga media apiceque albis. Pedes nigri.

- 211—12. *I. cyaneus* abdomine basi fulvo apice *splendens*, nigro.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura praecedentium. Caput cyaneum, nitidum antennis nigris. Thorax cyaneus, immaculatus. Abdomen basi fulvum, apice nigrum. Pedes nigri.

*Ichneumones* hi minores forte proprii generis at characterem eruere nondum valui.

*stigmatisans.*

212—13. I. thorace aeneo nitido, abdomine flavo: dorso nigro.

Habitat in Galliae larvis Dom. Bosc.

Statura praecedentium. Caput viride, nitens, sub antennis flavum. Thorax viridis, nitens, immaculatus. Abdomen ovatum, flavum dorso nigro. Aculeus exsertus, niger longitudine corporis. Pedes flavi. Alae albae puncto magno subcostali, nigro.

*festivus.*

213—14. I. ater abdomine falcato: segmento tertio rufo.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Magnus in hac familia. Antennae omnino filiformes, nigrae. Caput et thorax atra, immaculata. Abdomen breve, falcatum, apice valde compressum, dilatatum, atrum segmento tertio rufo. Pedes ferruginei.

*fulgens.*

213—14. I. thorace cupreo postice viridi, abdomine compresso atro: fascia flava.

Habitat in Galliae larvis. Mus. Dom. Bosc.

Statura praecedentium. Caput cupreum antennis brevibus, nigris: articulo primo subtus flavescente. Thorax cupreus, nitidus, postice viridis. Abdomen magnum, compressum, nigrum fascia lata, flava. Aculeus exsertus longitudine corporis. Pedes rufi.

*obsoletus.*

218—19. I. niger capite viridi, abdomine nigro aeneo, alis albis: puncto fusco.

Habitat in Italia Mus. Dom. Bosc.

Parvus. Caput viride sub antennis, nigrum.  
Antennae nigrae. Thorax niger, obscurus.  
Abdomen nigro aeneum, nitidum aculeo  
longitudine abdominis. Alae albae puncto  
costali fusco. Pedes flavi femoribus aeneis.

218—19. I. pallidus capitis thoracisque dorso viridi aeneo alis macula transversa fusca. *viridifalis*.

Habitat in Gallia Dom. Bose.

Caput pallidum antennis nigris maculaque quadrata verticis viridi aenea. Thorax pallidus dorso viridi aeneo, nitido. Abdomen compressum, pallidum dorso obscuro. Aculeus exsertus, niger. Alae albae macula magna, transversa, fusca. Pedes pallidi.

218—19. I. nigro cyaneus thorace obscure aeneo. *cyaneus*.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bose.

Parvus. Caput et abdomen nigro cyanea, nitida. Thorax obscure aeneus. Antennae breves, crassae. Pedes atrii.

220—1. I. obscure aureus abdomine depresso cyaneo, alis apice fuscis: macula fasciaque postica albis. *depressus*.

Habitat Parisiis Dom. Bose.

Parvus. Antennae capite concolores puncto apicis atro. Caput et thorax obscure aurea, vix nitida. Abdomen depressum, cyaneum, nitidum. Alae albae, apice fuscae puncto marginali magno fasciaque terminali albis. Pedes flavi.

220—1. I. viridi aeneus nitidus abdomine purpurascente: primo segmento aeneo. *purpurascens*.

Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.

Paruus. Caput viride antennis nigris. Thorax viridi aeneus, nitidus, immaculatus. Abdomen purpurascens segmento primo magno, viridi aeneo. Pedes flavi.

*aleuarius.* 232—3. I. flavus thorace postice abdominisque dorso nigris.

Reaun. Inf. 2. tab. 35. fig. 7.

Geoff. Inf. 2. Jehn. 3.

Habitat in Gilliae Phalaenae crataegatae larvis.

Exiens nec folliculos numerosos, aggregatos, albos, operculo clausos.

Corpus paruum. Antennae setaceae, nigrae. Caput et thorax flava thorace postice fusco. Abdomen flavum dorso nigro. Alae hyalinae.

*verticillatus.* 235—6. I. ater antennis verticillatis, alis albis. Habitat in Germania.

Duplo maior I. pectinicorni. Antennae filiformes, nigrae articulo singulo pilis verticillato. Caput et thorax atra, immaculata. Abdomen subpetiolatum, breue, compressum, adscendens, atrum. Alae albae. Pedes nigri, apice ferruginei.

*festinans.* 247. I. apterus niger pedibus cinerascens.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Minutus, totus niger pedibus solis cinerascens.

BANCHUS. *Palpi* quatuor elongati:  
articulis cylindricis.

*Labium* basi cylindri-  
cum, corneum, apice  
membranaceum, ro-  
tundatum integrum.

*Antennae* fetaceae.

1. B. niger abdomine subfalciato: basi subtus in- *venator*,  
carnata, pedibus rufis.

*Ichneumon venator* Ent. syst. 2. 168. 143. Linn.  
syst. nat. 2. 935. 36. Fn. Su. 1612.

Habitat in Europae nemoribus.

2. B. ater abdominis segmentis margine rufis, scu- *hastator*,  
tello elevato unispinoso.

*Ichneumon hastator* Ent. syst. 2. 167. 141.\*

Habitat in Europae hortis.

3. B. ater abdomine clauato fornicato immacula- *fornicator*,  
to, pedibus rufis.

*Ichneumon fornicator* Ent. syst. 2. 168. 144.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Banchi corpus medium, oblongum, glabrum, im-  
marginatum, agile, capite exserto, rotundato, trans-  
uerso, oculis magnis, oblongis, lateralibus, subpromi-  
nulis, antennis longiusculis, approximatis, inter ocu-  
los insertis: articulo primo clauato, vertice stemmati-  
bus tribus, thorace elevato, gibbo, scutello paruo, gib-  
bo, abdomine vix petiolato, compresso, apice acuto  
absque aculeo, alis abdomine breuioribus, pedibus  
cursoriis, tarsis quinque articulatis, colore vario,

*variegator.* 4. *B. niger* thorace variegato, abdomine compresso clauato, segmentorum marginibus flavis, scutello acuminato.

*Ichneumon variegator* Ent. syst. 2. 173. 164.

Habitat in Suecia.

*compressus.* 5. *B.* abdomine compresso: segmentorum marginibus flavis, antennis pedibusque luteis.

*Ichneumon compressus* Ent. syst. 2. 180. 195.

*varius.* 6. *B. luteus* pectore atro vario.

*Ichneumon varius* Ent. syst. 2. 181. 196.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

*piclus.* 7. *B. niger* flavo varius scutello subspinoso.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Simillimus omnino praecedenti, cuius varietatem olim credidi. Antennae luteae. Caput nigrum sub antennis flavum: linea frontali nigra. Orbita oculorum postice flava. Thorax niger punctis duobus anticis, duobus sub alis, scutello valde acuminato, punctis tribus sub scutello parvis tribusque inferioribus maioribus: intermedio transverso flavis. Abdomen compressum nigrum: fasciis plurimis flavis. Pedes flavi.

*falcatorius.* 8. *B.* scutello flavicante thorace variegato, abdomine ferrugineo basi apiceque nigro.

*Ichneumon falcatorius* Ent. syst. 2. 148. 59.

Habitat Hafniae.

*histrion.* 9. *B.* scutello flavicante, thorace variegato, abdomine rufo.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.



Statura praecedentis at minor. Antennae porrectae, nigrae. Caput nigrum, sub antennis flavum. Thorax niger margine lineisque duabus dorsalibus basi abbreviatis, apice hamatis, flavis. Scutellum flavicans puncto nigro. Alae hyalinae. Abdomen compressum, rufum ano subfusco. Pedes rufi.

OPHION. Palpi quatuor porrecti: articulis cylindricis.

*Labium* ovatum, membranaceum, integrum.

*Antennae* setaceae,

\* *Antennis luteis.*

1. *O. luteus* thorace striato. *luteus.*

*Ichneumon luteus* Ent. syst. 2. 178. 186, Linn.

synt. Nat. 2. 937. 55. Fn. Su. 1628.

Geoff. Inf. 2. 330. 72.

Goed. Inf. 2. tab. 37.

— — tab. 20. fig. 6.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 12.

Ophionis corpus medianum, elongatum, glabrum, immarginatum, agile, capite exserto, rotundato, transverso, oculis magnis, ovatis, lateralibus, subprominulis, antennis longitudine corporis, approximatis, inter oculos insertis: articulo primo crassiusculo, vertice stigmatibus tribus, thorace elenato, gibbo, scutello parvo, subacuminato, abdomine elongato, petiolato, falcato, postice clauato, aculeo brevissimo, vix exserto, alis quatuor planis, posterioribus brevioribus, pedibus longiusculis, cursoriis, tarsis quinque articulatis, colore vario.

Schaeff. Icon. tab. 29. fig. 16. 17.

Sulz. Inl. tab. 18. fig. 118.

Habitat in Europae larvis.

- ramidulus.* 2. O. luteus abdomine apice nigro.  
*Ichneumon ramidulus* Ent. syst. 2. 178. 187.  
 Linn. Fn. Su. 1629.  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.
- flavus.* 3. O. luteus vertice atro, abdomine apice fusco.  
*Ichneumon flavus* Ent. syst. 2. 179. 188.  
 Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom.  
 v. Rohr.
- glaucopterus.* 4. O. luteus pectore anoque nigris.  
*Ichneumon glaucopterus* Ent. syst. 2. 181. 198.  
 Linn. syst. nat. 2. 938. 57. Fn. Su. 1630.  
 Schaeff. Icon. tab. 82. fig. 3.  
 Habitat in Europae hortis.
- validus.* 5. O. obscure ferrugineus abdomine nigro basi  
 ferrugineo.  
 Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.  
 Statura omnino O. circumflexi at alius videtur.  
 Caput, thorax, antennae obscure ferruginea.  
 Abdomen falcatum, aruum, nitidum, basi  
 ferrugineum. Alae breues, obscurae. Pe-  
 des ferruginei tibiis posticis apice nigris.
- circumflexus.* 6. O. niger abdomine antice flavo, pedibus po-  
 sticis nigro geniculatis, scutello flavo.  
*Ichneumon circumflexus* Ent. syst. 2. 181. 199.  
 Linn. syst. Nat. 2. 938. 59. Fn. Su. 1631.  
 Habitat in Europae nemoribus,

7. *O. obscurus* thoracis dorso luteo: lineis tribus *obscuratus*.  
 abbreviatis punctoque fuscis, abdominis lateribus flavo maculatis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura et magnitudo *O. lutei*. Antennae obscure luteae. Caput flavescens, immaculatum. Thoracis dorsum flavescens lineis tribus latis, fuscis, lateralibus antice abbreviatis, intermedia postice punctoque terminata. Abdomen obscurum maculis lateralibus flavis. Pedes obscuri.

8. *O. ater* alis cyaneis. *morio*.

*Ichneumon morio* Ent. syst. 2. 180. 194.

Habitat in America boreali Mus. Dom. Banks.

9. *O. niger* abdominis segmento tertio quartoque *flavifrons*.  
 rufis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Medius. Antennae ferruginae. Caput nigrum sub antennis flavum. Thorax niger puncto parvo calloso ad basin alarum. Abdomen nigrum segmento tertio, quartoque rufis. Pedes rufi.

10. *O. niger* antennis pedibusque ferrugineis. *amicus*.

*Ichneumon amicus* Ent. syst. 2. 181. 197.

Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.

\* \* *Antennis nigris*.

11. *O. niger* thorace submaculato abdominis segmento secundo tertio quartoque rufis.

*Ichneumon falcator* Ent. syst. 2. 174. 170.

Habitat in Suecia,

- pugillator.* 12. O. thorace immaculato, abdomine rufo basi apiceque nigro, pedibus tenuibus ferrugineis.  
*Ichneumon pugillator* Ent. syst. 2. 174. 171.  
 Linn. syst. Nat. 2. 936. 50. Fn. Su. 1624.  
 Geoff. Inf. 2. 332. 24.  
 Degeer Inf. 1. tab. 6. fig. 12.  
 Habitat in Bombyx Ziczac larva.
- saltator.* 13. O. ater abdomine brevissimo, pedibus posticis elongatis.  
*Ichneumon saltator* Ent. syst. 2. 175. 173.  
 Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.
- erigator.* 14. O. ater thorace immaculato, abdomine breui: segmento tertio pedibusque rufis.  
*Ichneumon erigator* Ent. syst. 2. 175. 174.  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
- jocator.* 15. O. niger thorace immaculato, abdomine ferrugineo: petiolo segmento secundo margine, tertio basi nigris.  
*Ichneumon jocator* Ent. syst. 2. 175. 175.  
 Habitat Kiliae.
- compensator.* 16. O. ater thorace immaculato, abdomine brevissimo: segmento secundo tertio quartoque rufis.  
*Ichneumon compensator* Ent. syst. 2. 176. 176.  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.
- mercator.* 17. O. ater thorace immaculato, abdomine breui: segmento secundo apice tertio toto quartoque basi flavis.  
*Ichneumon mercator* Ent. syst. 176. 177.  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.

18. *O. ater* thorace immaculato, abdomine bre-*flagellator*.  
ui, segmento secundo tertioque nigris, pe-  
dibus rufis: femoribus posticis nigris.

*Ichneumon flagellator* Ent. syst. 2. 176. 178.

Habitat Kiliae.

19. *O. niger* thorace maculato abdomine falcato *cunctator*.  
rufo: petiolo nigro, fronte plantisque po-  
sticis fuscis.

*Ichneumon cunctator* Ent. syst. 2. 176. 179.

Habitat Kiliae.

20. *O. ater* abdomine compresso acutissimo ferru-*cultellator*.  
gineo, scutello acuminato.

*Ichneumon cultellator* Ent. syst. 2. 167. 142.

*Ichneumon leucospoides* Act. Berol. 6. 345. tab.  
8. fig. 5. 6.

Habitat in Germaniae Pino. Dom. de Loewen-  
skiold.

21. *O. nigro ferrugineoque varius* abdomine atro, *foliator*.  
alis abbreviatis.

Habitat Halaë Saxonum Dom. Hybner.

Paruus. Caput et thorax nigro obscureque fer-  
rugineo varia. Abdomen falcatum, atrum,  
nitidum aculeo breuissimo, exserto. Alae  
abbreviatae, hyalinae. Pedes ferruginei fe-  
moribus basi nigris.

FOENUS. *Palpi* breues: articulis cylindricis.

*Labium* breue, membranaceum, transuersum.

*Antennae* filiformes.

*jaculator*. 1. *F. niger* abdomine falcato medio rufo, tibiis posticis clauatis basi apiceque albis.

*Ichneumon jaculator* Ent. syst. 2. 177. 183. Linn. syst. Nat. 2. 937. 52. Fn. Su. 1626.

Geoff. Inf. 2. 328. 16.

Degeer Inf. 1. tab. 36. fig. 10.

Reaum. Inf. 4. tab. 10. fig. 14.

Habitat in Apum Sphegunque laruis.

*affector*. 2. *F. niger* abdomine falcato: maculis tribus lateralibus rufis, tibiis posticis clauatis rufis.

*Ichneumon affector* Ent. syst. 2. 178. 184. Linn. syst. Nat. 2. 937. 35. Fn. Su. 1627.

Geoff. Inf. 2. 329. 17.

Habitat in Europae hortis.

Foeni corpus elongatum, glabrum, immarginatum, agile, capite ouato, infidente collo elongato, attenuato, oculis magnis, oblongis subprominulis, lateralibus, stemmatibus tribus verticalibus, antennis breuib; cylindricis: articulo primo distincto, thorace eleuato, gibbo, pectore antice in collum porrecto, scutello lato, transuerso, abdomine petiolato, compresso, incuruo, clauato, sub scutello inserto, aculeo feminae longitudine abdominis, alis quatuor breuib; planis, pedibus cursoriis, tibiis posticis compressis, clauatis, tarsis quinque articulatis.

EVANIA. *Palpi* postici incurui: articulo tercio quadrato.

*Labium* corneum, apice membranaceum, integrum.

*Antennae* setaceae.

2—3. E. nigra albo maculata abdomine rufo api-*variegata*,  
ce nigro: maculis tribus albis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura omnino E. maculatae. *Antennae* nigrae. Caput nigrum, sub *antennis* album macula media nigra. Thorax niger margine antico in medio interrupto scutelloque albis. Abdomen breue, sessile, basi rufum, apice nigrum lunulis duabus pone medium maculaque anali albis. *Pedes* rufi geniculis nigris.

2—3. E. nigra albo varia abdominis segmentis *histris*,  
margine flavis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura omnino praecedentium. *Antennae* nigrae subtus ferrugineae. Caput nigrum, sub *antennis* album. Thorax niger margine antico, maculis duabus utrinque sub margine, scutello, puncto sub scutello albis. Abdomen nigrum segmentorum marginibus albis. *Pedes* rufi.

3—4. E. atra thorace rufo, abdominis segmentis *ruficollis*,  
margine albis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Parua. Caput nigrum orbita oculorum alba. Thorax rufus pectore nigro. Abdomen atrum, nitidum segmentorum marginibus albis: primo interrupto. Pedes rufi, postici nigri.

*cinclæ.*

5—4. E. nigra abdominis fascia media cinerea.

Habitat in Mogador Dom. Schousboe.

Statura parua præcedentium. Caput et thorax nigra, immaculata. Abdomen sessile, cylindricum fascia media cinerascente. Pedes nigri.

*petiolata.*

5—6. E. flauescens abdomine petiolato breuissimo-dorso imposito atro.

Habitat in Americæ Insulis Mus. Dom. Lund.

Statura et magnitudo E. minutæ. Antennæ nigrae. Caput flauescens, cinereo pubescens. Thorax flauescens scutello atro. Abdomen petiolatum, compressum, breuissimum, atrum petiole elongato, flauo. Pedes flaui geniculis nigris.

CHALCIS. *Palpi* æquales.

*Antennæ* breues, cylindricæ, fere fusiformes: articulo primo subcrassiori.

*conica.*

1—2. C. atra abdomine conico acutissimo, femoribus posticis incrassatis: linea dorsali alba.

Habitat Cajennæ in nido Vespaë nidulantis, ubi uti videtur eius laruis vicat. Figura Reaum. Inf. 6. tab. 20 — 24. sub nomine Abeille



cartonniere cum hac convenit, nec Vespam representat.

Magna in hoc genere. Caput atrum orbita oculorum albicante. Thorax ater, immaculatus. Abdomen elongatum, conicum, parum, compressum, acutum, nigrum. Femora postica incrassata, compressa, atra linea dorsali alba. Tibiae incurvae, albae.

12. *C. thorace nigro*: lineolis scutelloque flavis, *nigricornis*. femoribus posticis flavis nigro maculatis.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura omnino *C. maculatae*. Caput flavum vertice antennisque nigris. Thorax niger margine antico lineolis quatuor obliquis: lateralibus interruptis, flavis. Scutellum flavum linea abbreviata nigra. Abdomen breve petiolatum, flavum fascia media anoque ferrugineis. Pedes flavi femoribus posticis incrassatis, dentatis utrinque maculis duabus nigris.

SPHEX. Os lingua porrecta, trifida.

*Labium* emarginatum, seta instructum.

*Antennae* filiformes.

1. *S. glabra* atra thorace sub alis maculis duobus *binodis*, argenteis, abdominis petiolo biarticulato.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Bose.

Statura *S. sabulosa* at paullo minor. Caput atrum, immaculatum. Thorax laevis, ater

inactulis utrinque duabus sub alis. Abdominis petiolus elongatus, biarticulatus, niger. Abdomen paruum, ouatum, paullo cyaneo nitidum. Alae breues, obscurae.

*hemiptera.* 11—12. *S. villosa* nigra abdominis petiolo elongato, uniarticulato, alis breuibibus obscuris.

Habitat in Isle de France Mus. Dom. Bosc.

Magnitudo fere *S. fabulosa*. Caput et thorax villosa, nigra, obscura. Abdominis petiolus abdomine fere longior, cylindricus, uniarticulatus. Abdomen ouatum, immaculatum. Alae vix petiolo longiores, obscurae ferrugineo parum nitentes. Pedes nigrae.

*atra.* 18—9. *S. atra* labio argenteo villoso, alis abdominis longitudine.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Differt manifesta *S. figulo*. Caput nigrum labio pube argentea nitido. Thorax niger. Abdomen atrum, nitidum, immaculatum petiolo longiori, incuruo. Alae obscurae abdominis longitudine. Pedes nigri.

*cruenta.* 54—5. *S. atra* thorace rufo, abdomine strigis duabus albis.

Habitat in Gallia Dom. Bosc.

Statura parua *S. sanguinolentae*. Caput nigrum orbita oculorum alba. Thorax rufus linea scutellari, antice bifida nigra. Abdomen atrum, nitidum segmento secundo et quarto apice striga albida. Pedes nigri. Alae albae.

88—9. *S. coerulea* alis totis obscure rufis. *heros.*

Habitat in America meridionali Mus. Dom.  
Bosc.

Maxima in hoc genere. Antennae fuscae: articulo primo cyaneo. Corpus totum coeruleum, immaculatum. Alae magnae, obscure ferrugineae. Pedes nigri tibiis posticis ferratis.

89—90. *S. coerulea* alis cyaneis apice albis. *grossa.*

Habitat in India.

Affinis *S. coeruleae* eiusdemque magnitudinis et staturae. Antennae porrectae, nigrae. Corpus coeruleum, nitidum. Alae cyaneae, omnes apice albae. Pedes nigri.

89—90. *S. atra* capite thoracis antico abdominisque segmentis basi flavis, alis ferrugineis apice atris. *annulata.*

Habitat in Italia Mus. Dom. Bosc.

Magna. Caput cum antennis ferrugineum, immaculatum. Thorax niger lobo antico dorsoque obscure ferrugineis. Abdomen atrum nitidum segmentis 2. 3. 4. 5. basi late flavis. Pedes flavi femoribus basi nigris. Alae ferrugineae apice nigrae.

---



---

**POMPILUS.** *Maxilla bifida.*

*Labium breue, corneum,  
integrum.*

*Antennae fetaceae.*

- analis.* 1. *P. glaber ater abdomine apice ferrugineo, alis  
albis.*  
*Sphex analis* Ent. syst. 2. 209. 42.  
Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.
- similis.* 2. *P. glaber ater abdomine apice ferrugineo alis  
nigris.*  
*Sphex similis* Ent. syst. 2. 209. 43.  
Habitat in Africa aequinoctiali Mus. D. Banks.
- fuscus.* 3. *P. glaber ater abdomine basi ferrugineo.*  
*Sphex fusca* Ent. syst. 2. 210. 46. Linn. syst.  
Nat. 2. 944. 16. Fn. Su. 1652.  
Geoff. Inf. 2. 254. 74.  
Degeer Inf. 2. 2. 147. tab. 28. fig. 6.  
Goed. Inf. 1. tab. 58.  
Habitat in Europae fabuletis laruas attrahens,  
sepeliens.
- viaticus.* 4. *P. pubescens niger alis fuscis, abdomine anti-  
ce ferrugineo: cingulis nigris.*
- 

*Pompili* corpus oblongum, immarginatum, agile, capite exserto, rotundato, transuerso, thorace latiore, oculis magnis, oblongis, lateralibus, antennis approximatis, supra os insertis; articulo primo compresso, thorace ouato, planiusculo, scuteilo vix ullo, abdomine ouato, sessili, alis inaequalibus, pedibus tenuibus, elongatis, tarsis quinquearticulatis, colore vario.

Genus Sphegibus nimis affine.

*Sphex viatica* Ent. syst. 2. 210. 47. Linn. syst.  
Nat. 2. 943. 15. Fn. Su. 1651.

Degeer Inf. 2. 2. 153. 6. tab. 28. fig. 16.

Frish. Inf. 2. tab. 1. fig. 13.

Habitat in Europae sabuletis laruas ouo imposi-  
to sepeliens.

5. *P. hirtus* ater abdominis segmento secundo fer- *urfus*.  
rugineo, alis atris.

*Sphex urfus* Ent. syst. 2. 210. 48.

Habitat — — Dom. Lund.

6. *P. cyaneus* antennis pedibusque nigris. *amethysti-*  
*nus*.

*Sphex amethystina* Ent. syst. 2. 210. 49.

Habitat in Insula St. Crucis Dr. Pflug.

7. *P. niger* fronte thoracis striga antica abdomi- *cingulatus*.  
nisque segmentorum marginibus cinereis.

*Sphex cingulata* Ent. syst. 2. 210. 50.

Habitat in noua Hollandia Mus. Dom. Banks.

8. *P. niger* abdomine segmentorum marginibus *niger*.  
lucidis.

*Sphex nigra* Ent. syst. 2. 211. 51.

Habitat in Europae sabuletis.

9. *P. niger* abdomine segmentorum marginibus *labiatus*.  
cinereis, alis testaceis apice fuscis.

*Sphex labiata* Ent. syst. 2. 211. 52.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dr.  
Pflug.

10. *P. ater* albo maculatus thorace sub scutello *variegatus*.  
rufo, alis apice fuscis.

*Sphex variegata* Ent. syst. 2. 211. 53.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

11. *P. niger* femoribus posticis rufis. *maurus*.

*Sphex maura* Ent. syst. 2. 212. 55.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

*mixtus.*

12. *P. niger* flavo varius abdomine flavo: fasciis tribus nigris.

Habitat in Americae Insulis Dom. v. Rohr.

Medius. Antennae rufae, apice nigrae. Caput nigrum orbita oculorum, ore lineaque frontali flavis. Thorax niger margine antico sub alas extenso lineolis duabus dorsalibus, scutello maculisque sub scutello flavis. Abdomen sessile flavum fasciis quatuor latis, nigris. Pedes flavi. Alae anticae subtestaceae.

*hyalinatus.*

13. *P. ater* femoribus quatuor posticis rufis, alis hyalinis.

*Sphex hyalinata* Ent. syst. 2. 212. 56.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

*fuscatus.*

14. *P. ater* abdomine utrinque puncto transverso albo, femoribus posticis rufis, alis apice fuscis.

*Sphex fuscata* Ent. syst. 2. 212. 57.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

*6punctiatus.*

15. *P. ater* punctis duobus sub scutello quatuor abdominis albis alis apice fuscis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino *P. fuscata*. Caput rotundatum, immaculatum. Thorax compressus, ater sub scutello punctis duobus albis. Abdomen atrum, nitidum punctorum duobus paribus albis. Alae albae apice fuscae. Pedes atrii.

*bifasciatus.*

16. *P. ater* immaculatus alis albis: fasciis duabus nigris.

*Sphex bifasciata* Ent. syst. 2. 212. 58.

Geoff. Inf. 2. 337. 37.

Habitat in agro Parisino Dom. Bosc.

17. *P. niger* abdomine ferrugineo apice fusco, *gibbus*.  
 alis anticis apice fuscis.

*Sphex gibba* Ent. syst. 2. 212. 59. Linn. syst.

Nat. 2. 946. 33. Fn. Sù. 1658. Scop. carn.  
 570.

Habitat in Europae sylvis.

18. *P. ater* thorace striga abdominis segmento 2 *guttatus*.  
 tertio punctis duobus baseos albis.

Habitat in America septentrionali Mus. Dom.  
 Bosc.

Paruus. Caput cum antennis atrum. Thorax  
 ater striga antica impressa, cinerea. Abdo-  
 men atrum segmento tertio utrinque puncto  
 baseos albo. Pedes nigri.

19. *P. cinereo* pubescens abdominis segmentis basi *pulcher*.  
 atris; alis albis apice nigris.

Habitat in Italia Mus. Dom. Bosc.

Paruus cinereo pubescens antennis nigris. Tho-  
 rax immaculatus. Abdominis segmenta basi  
 atra apice cinerea pubescentia. Alae albae,  
 apice nigrae.

20. *P. niger* antennis rufis, alis albis: fasciis dua- *fasciatus*.  
 bus fuscis.

*Sphex fasciata* Ent. syst. 2. 213. 60.

Habitat in noua Hollandia Mus. Dom. Banks.

21. *P. niger* abdominis segmento secundo tertio- *lunicornis*.  
 que rufis, antennarum ultimo articulo lu-  
 nato.

Habitat in Gallia Dom. Cuvier.

Minutus. Antennae singulares, nigrae, setaceae articulo ultimo arcuato. Caput et thorax nigra, immaculata. Abdomen atrum, nitidum segmentis duobus rufis. Pedes nigri. Alae hyalinae.

*cinereus.* 22. *P. cinereus* abdominis segmentis basi atris apice fuscis.

*Sphex cinerea* Ent. syst. 2. 213. 61.

Habitat in noua Hollandia Mus. Dom. Banks.

*tropicus.* 23. *P. niger* abdominis segmento secundo ferrugineo.

*Sphex tropica* Ent. syst. 2. 213. 62. Linn. syst. nat. 2. 945. 27. Mus. Lud. Ulr. 408.

Habitat in America.

*fugax.* 24. *P. thorace* tomentoso aureo, abdomine ferrugineo, alis flavescentibus: fascia fusca.

*Sphex fugax* Ent. syst. 2. 213. 63.

Habitat in noua Zelandia Mus. Dom. Banks.

*auratus.* 25. *P. capite* thoraceque tomentoso aureis, abdomine nigro: segmentorum marginibus cinereis.

*Sphex aurata* Ent. syst. 2. 213. 64.

Habitat in India orientali Dom. de Schlanbusch.

*nitidus.* 26. *P. ferrugineus* thorace postice aureo, alis flavescentibus.

*Sphex nitida* Ent. syst. 2. 214. 65.

Habitat in noua Hollandia Mus. Dom. Banks.

*rufipes.* 27. *P. ater* abdominis segmentis utrinque puncto albo, alis apice fuscis.



*Sphex rufipes* Ent. syst. 2. 214. 66. Linn. syst.

Nat. 2. 945. 29. Fn. Su. 1659.

Habitat in Europae fabuletis.

28. P. glaber ater abdomine punctis duobus fasci- *2punctatus*.  
ciaque postica albis, alis apice fuscis.

*Sphex 2punctata* Ent. syst. 2. 214. 67.

Habitat in Europa.

29. P. ater capite thoraceque rufis.

*nigricornis*.

*Sphex nigricornis* Ent. syst. 2. 214. 68.

Habitat in noua Hollandia Mus. Dom. Banks.

30. P. niger alis apice fuscis: puncto albo.

*hircana*.

Habitat in Gallia Dom. Cuvier.

Nimis affinis P. exaltati et forte mera varietas.

Differt tantum corpore toto atro, immaculato. Alae albae fascia media apiceque fuscis et in hac apice punctum magnum album.

31. P. niger abdomine rufo apice atro, alis apice *exaltatus*.  
fuscis: puncto albo.

*Sphex exaltata* Ent. syst. 2. 214. 69.

Habitat in Europae fabulosis.

32. P. ater thorace albo maculato, abdominis *maculatus*.  
segmento primo rufo, reliquis utrinque li-  
nea transuersa alba.

*Sphex maculata* Ent. syst. 2. 215. 70.

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

33. P. niger abdomine utrinque lunulis argenteo *tricolor*.  
sericeis: basi rufo, apice nigro.

*Sphex tricolor* Ent. syst. 2. 215. 71.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.

- guttatus.* 34. P. glaber ater thorace albo maculato, abdomine rufo: punctis transuersis albis, ante apicem nigro.  
*Sphex guttata* Ent. syst. 2. 215. 72.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.
- nigripes.* 35. P. niger abdomine ferrugineo, alis obscuris, pedibus nigris.  
*Sphex nigripes* Ent. syst. 2. 216. 77.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.
- hirtus.* 36. P. ater abdomine villoso testaceo, alis cyaneis.  
 Habitat in India orientali Dom. Daldorff.  
 Affinis certe P. villosi at duplo fere maior. Corpus atrum, immaculatum abdomine villoso, testaceo. Alae cyaneae.
- villosus.* 37. P. niger abdomine villoso testaceo, alis fuscis.  
*Sphex villosa* Ent. syst. 2. 216. 78.  
 Habitat ad littora malabarica Dr. Koenig.

**LARRA.** *Maxilla* breuis, cornea, fornicata.

*Labium* exsertum, apice membranaceum, emarginatum.

*Antennae* filiformes.

- fasciata.* 5—6. L. atra abdomine fasciis duabus fuluis, alis nigris apice albis.  
 Habitat in Tangier Dom. Schousboe Mus. Dom. Lund.

Statura omnino L. ichneumoniformis. Caput et thorax atra, immaculata. Abdomen atrum, nitidum segmento secundo tertioque

fascia dorsali late fulvis: 'Alae nigrae, apice albae. Pedes nigri.

6—7. L. flava thorace nigro lineato, abdomine *cingulata*, fasciato.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Media. Labium flavum argenteo pubescens. Antennae ferrugineae. Thorax obscurior lineis tribus abbreviatis, nigris. Scutellum flavum striga nigra. Abdomen flavum fasciis sex nigris. Alae albae macula magna costali ante apicem fusca. Pedes flavi.

7—8. L. nigra capite thoracis antico anoque *ful-fasciata*.  
uis, alis ante apicem late atris.

Habitat Tranquebariae D. Daldorff Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo praecedentis. Caput cum antennis ferrugineum. Thorax antice fulvus, postice niger. Abdomen atrum ultimis segmentis fulvis. Alae albae, nitidae ante apicem late atris apice tamen albo. Pedes fulvi.

Variat obscurior capite thoracis antico anoque fuscis nullo modo distincta.

TIPHIA. *Maxilla* membranacea, rotundata.

*Labium* breue, corneum, tridentatum, medio palpigerum.

*Antennae* filiformes.

*glabrata.* 1—2. *T. glabra* atra antennis basi pedibusque ferrugineis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura omnino *T. femoratae* at duplo minor.

*Antennae* nigrae, basi rufescentes. Corpus atrum, glabrum, immaculatum. *Pedes* rufi femoribus angulatis.

*hemiptera.* 1—2. *T. glabra* atra alis breuissimis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura parua praecedentis tota atra. *Alae* breuissimae et fere tantum rudimentum alarum.

*mixta.* 10—11. *T. hirta* ferrugineo flauoque varia, alarum costa ferruginea apice nigra.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Media. *Antennae* ferrugineae. *Mandibulae* ferrugineae, apice nigrae. *Caput* flauum oculis magnis reniformibus nigris. *Thorax* hirtus, ferrugineus lobo antico scutelloque flauis. *Abdomen* ferrugineum segmento 2. 3. 4. supra flauis margine lineaque dorsali ferrugineis. *Alae* obscurae anticarum costa ferruginea apice nigra. *Pedes* ferruginei.

*thoracica.* 15—16. *T. atra* thorace cinereo villoso, alis cyaneis.

Habitat ad littora malabarica.

Affinis certe *T. collari* cuius varietatem olim credidi. Differt tamen capite toto atro, thorace toto cinereo villoso alisque anticis totis cyaneis.

SCOLIA. Os lingua inflexa, trifida.

*Labium* porrectum, apice membranaceum, integrum medio palpigerum.

*Antennae* filiformes.

16—17. *S. hirta* nigra abdomine fasciis quatuor *4fasciata*. flavis, ano tridentato.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Nimis affinis *S. radula*. Differt tantum ano tridentato alias simillima.

16—17. *S. hirta* atra abdomine fasciis duabus flavis *erythroceuis*, alis ferrugineis apice cyaneis, capite *phala*. ferrugineo.

Habitat in Europa australi Dom. Lund.

Distincta omnino a *S. hortorum*. Caput cum antennis ferrugineum. Thorax hirtus, obscure ferrugineus fere niger. Abdomen atrum fasciis duabus dorsalibus flavis: anteriore maiore, integra, posteriore subinterrupta. Corpus atrum.

24—5. *S. atra* abdomine fasciis duabus flavis: anteriore utrinque puncto atro. *annotata*.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino *S. cinetae* at distincta videtur.

Caput atrum maculis tribus frontalibus fla-

uis: lateralibus lunatis. Thorax immaculatus. Abdomen atrum supra fasciis duabus latis, aequalibus, flavis: anteriore utrinque puncto atro notata. Pone fascias praeterea par punctorum parvorum, flavorum. Alae cyaneae. Pedes atrii.

*hispanica.* 35—6. S. flavo ferrugineoque varia alis macula costali apicis fusca.

Habitat Tranquebariae Mus. D. de Schestedt.

Media. Antennae breves, incurvae, ferrugineae. Caput flavum linea transversa, verticali ferruginea et in hac stemmata tria ordinaria. Thorax ferrugineus lobo antico utrinque flavo. Abdominis segmentum primum ferrugineum, immaculatum, 2 flavum utrinque puncto parvo apicèque ferrugineis 3. 4. flavis basi apicèque lineaque dorsali ferrugineis, reliqua ferruginea pilis aureis. Alae subferrugineae, nitidae macula magna costali versus apicem fusca. Pedes ferruginei femoribus compressis, posticis apice parum dilatatis.

*volutus.* 38. S. nigra cinereo hirta thorace flavo maculato, abdomine fasciis sex flavis.

Habitat Tangier Dom. Schousboe Mus. Dom. de Schestedt.

Statura et magnitudo omnino S. cylindricae. Antennae cylindricae, porrectae, nigrae. Caput nigrum, cinereo tomentosum. Thorax cinereo tomentosus antice fasciis duabus flavis. Abdomen cylindricum, atrum fas-

ciis fex flavis aculeo paruo, recuruo. Alae abdomine breuiores, albidae.

39. *S. hirta nigra* abdominis segmentis apice coe-*cochleata*, ruleis, antennis apice cochleatis.

Habitat in Guinea Dom. Bert Mus. Dom. Lund.

Animalculum singulare huius generis videtur.

Caput fuscum, cinereo pubescens antennis filiformibus: articulo primo longiore, ante apicem tenuissimis, petiolatis, apice dilatatis, rotundatis, depressis. Thorax fuscus, immaculatus. Abdominis segmenta basi atra, apice coerulea. Alae obscurae. Pedes fuscii, postici femoribus breuibus, incrassatis, tibiis incuruis, vix longioribus, apice parum dilatatis.

CHRYSIS. *Labium* porrectum, maxilla lineari multo longius, apice membranaceum, emarginatum.

*Antennae* filiformes.

- 4—5. *C. coerulea nitida* scutello abdomineque *scutellaris*. aureis, ano coeruleo.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Affinis videtur *C. calens*. Caput coeruleum antennis nigris. Thorax coeruleus, viridi nitens scutello aureo et sub scutello viridi nitens. Abdomen aureum, nitidum ano coeruleo, vix dentato. Pedes coerulei.

- 9—10. *C. glabra nitida auro purpurea* antennis *coeruleis* thoracisque postico nigris. *coeruleis*.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.

Statura et magnitudo *C. ignitae*. Caput, thorax, abdomen auro purpurea, nitida. Antennae totae nigrae. Thorax sub scutello niger. Pectus pedesque coerulea, nitida.

*maculata*. 12—13. *C. glabra viridis*, nitida occipite fascia abdomine maculis dorsalibus atris, ano integro.

Habitat in Americae Insulis Mus. Dom. Bosc.

Statura et magnitudo *C. auratae*. Caput viride aeneum, nitidum occipite fascia atra. Antennae nigrae. Thorax viridis macula antea coerulefcente. Abdomen aeneum, macula magna ad basin singuli segmenti atra.

*dimidiata*. 15—16. *C. glabra viridis nitens* thorace abdominisque segmentis duobus anticis aureis, ano quadridentato.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.

Caput viride, nitens antennis maculaque verticis nigris. Thorax aureus pectore viridi. Abdomen aureum ano quadridentato, viridi.

*sexdentata*. 20—1. *C. glabra viridis nitida* abdominis segmentis basi cyaneis, ano sexdentato.

Parva. Caput viride antennis nigris. Thorax viridis, immaculatus. Abdomen viride segmentis basi cyaneis. Anus sex dentatus.



LEUCOSPIS. *Palpi* breues, aequales.

*Labium* maxilla longius,  
emarginatum.

*Antennae* extrorsum cras-  
siores.

3. L. abdomine subpetiolato corpore atro cinereo *atra*,  
pubescente.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Caput nigrum, cinereo pubescens. Thorax  
elevatus, punctatus, niger, cinereo subpu-  
bescens strigis duabus anticis tenuissimis, te-  
staceis. Abdomen nigrum segmento primo  
cylindrico, quali petiolo, reliquis compressis  
aculeo in canali dorsali recondendo. Pedes  
nigri femoribus posticis incrassatis, subtus  
dentatis.

BEMBEX. *Os* lingua inflexa, quinque-  
fida.

*Labium* superius porrec-  
tum, os obtegens.

*Antennae* filiformes.

5—6. B. labio conico flavo nigra abdominis seg. *labiata*.  
mentis apice glaucis.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.

Paullo minor B. glaucae. *Antennae* nigrae ar-  
ticulo primo subtus flavo. *Labium* magnum,  
porrectum, flavum. Caput et thorax ni-  
gra, cinereo villosa. Abdomen nigrum seg-

mentorum marginibus glaucis. Alae hyalinae.

*spinosa.*

9—10. B. labio conico nigra thorace maculato postice utrinque unidentato, abdomine strigis sex interruptis flavis.

Habitat in Americae Insulis Dom. v. Rohr.

Media. Antennae nigrae articulo primo subtus flavo. Caput nigrum labio conico flavo. Thorax niger margine antico, linea laterali, lineolis duabus dorsalibus punctis duobus sub alis, punctis duobus lineolisque duabus transuersis loco scutelli flavis postice utrinque excurrit in dentem validum, flavum. Abdomen glabrum, atrum, nitidum strigis sex, in medio late interruptis, flavis. Pedes flavi femoribus nigris.

VESPA. *Labium* porrectum, maxilla longius, emarginatum, utrinque seta instructum.

*Antennae* extrorsum crassiores.

*labiata.*

18—19. V. nigra thoracis margine antico albo, abdomine atro: segmentorum marginibus albis.

Habitat Tangier Dom. Schousboe.

Paullo minor V. maculatae. Antennae nigrae articulo primo subtus albo. Caput nigrum labio, mandibulis maculaque inter antennas albis. Thorax niger margine antico in me-

dio interrupto albo. Abdomen atrum, nitidum segmentorum marginibus albis. Alae plicatae, obscurae. Pedes flavescentes femoribus basi nigris.

22—3. V. brunnea abdominis segmento secundo *carnatica*, tertioque basi atris, alis apice nigris.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Corpus magnum, brunneum, immaculatum abdominis segmento secundo tertioque basi atris. Alae plicatae, brunneae, apice nigrae.

40—1. V. testacea abdominis ultimis segmentis *analis*. nigris.

Habitat Cajennae Dom, Richard.

Statura et magnitudo V. marginalis. Antennae ferrugineae. Caput et thorax testacea, flavo parum mixta. Abdominis segmentum secundum magis obscurum margine nigro. Reliqua nigra. Alae pedesque testacea.

40—1. V. obscure ferruginea thorace subscutello flavo lineato, abdominis segmento secundo punctis duobus flavis. *myops*.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Media. Antennae ferrugineae, in medio nigrae. Caput et thorax obscure ferruginea, immaculata et sub scutello niger striga lineisque duobus flavis. Abdomen ovatum, ferrugineum primo secundoque segmentis obscurioribus et in hoc puncta duo flavescentia. Alae obscure ferruginae. Pedes ferruginei femoribus nigris.

*Neslor.*

42—3. *V. fusca* fronte flavo, abdomine ferrugineo: segmentis basi macula nigra margineque flavo.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Paullo maior *V. marginali*. Antennae nigrae, subtus ferrugineae. Caput fuscum fronte oreque late flavis. Thorax fuscus margine antico tenuissime lineolis duabus anticis obliquis lineolisque duabus abbreviatis sub scutello flavis. Scutellum ferrugineum. Abdomen ferrugineum segmento singulo macula bascos nigra margineque flavo. Alae ferrugineae. Pedes ferruginei.

*nitidula.*

44—5. *V. atra* argento nitida thoracis angulo postico utrinque dilatato argenteo.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus *V. atrata* paullo maius, totum atrum argento certo situ nitidulam. Thorax punctatus postice sub alis angulo utrinque dilatato, argenteo, nitido. Scutellum emarginatum. Alae cyaneae.

*atrata.*

44—5. *V. atra* labio albo, alis hyalinis.

Habitat in Americae meridionalis insulis Dom. Lund.

Media, tota atra, immaculata. Labium villis albo argenteis tectum. Alae hyalinae.

*minuta.*

65—6. *V. atra* labio thoracis punctis duobus anticis abdominisque fasciis duabus flavis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus minutum. Antennae nigrae. Caput nigrum labio elevato, flavo. Thorax niger

punctis duobus marginis antici punctoque paruo calloso ante alas flavis. Abdomen glabrum, atrum strigis duabus flavis. Pedes variegati.

66—7. *V. nigra* antennis ano pedibusque rufis, *affimilis*.  
alis cyaneis basi apiceque albis.

*Sphex affimilis* Ent. syst. 2. 209. 44.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

78—9. *V. ferruginea* abdomine striga baseos fasciataque media flavis, alis apice macula nigra. *Tamula*.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et summa affinitas *V. flavescentis*. Differt tantum abdominis segmento primo apice tertio apice quartoque basi flavis.

86—7. *V. nigra* abdominis petiolo clauato, alis *coeruleopenis*.  
cyaneis. *nis*.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Praecedentibus minor. Corpus totum atrum alis folis cyaneis. Abdominis petiolus brevis, clauatus.

88—9. *V. ferruginea* abdomine atro: ano ferrugineo. *diadema*.

Habitat Cajennae.

Specimen mihi mutilatum. Corpus magnum. Caput ferrugineum vertice nigro: striga ferruginea. Thorax ferrugineus linea punctisque duobus dorsalibus nigris. Petiolus elongatus, incuruus, niger, apice parum ferrugineus. Abdomen ouatum, atrum ano late ferrugineo. Alae desunt. Pedes ferruginei.

- morio.* 98—9. V. atra immaculata abdominis petiolo clauato, alarum costa nigra.  
Habitat Cajennae in nido obeonico, papyraceo, rudiore, griseo, truncato: orificio paruo, laterali Dom. Cuvier. Corpus paruum, totum atrum, immaculatum tibiis folis parum cinerascens. Alarum costa late nigra.
- binodis.* 100—1. V. atra abdominis petiolo biarticulato, segmentis striga tenuissima testacea.  
Habitat Cajennae Mus. Dom. Bose.  
Parua. Caput, antennae, thorax, pedes atra, immaculata. Abdomen petiolo biarticulato, primo clauato, secundo basin secundi segmenti efficiens, tenuissimo, atrum singulo segmento ante marginem striga tenuissima, testacea. Alae obscurae.
- reicta.* 100—1. V. nigra abdominis ferruginei petiolo clauato nigro.  
Habitat Cajennae Dom. Richard.  
Parua. Caput nigrum. Thorax niger margine lobi antici flauo. Abdomen ferrugineum petiolo breui, clauato, nigro. Alae ferruginae, apice fuscae. Pedes nigri.
- atrophica.* 101—2. V. atra abdominis petiolo segmentoque primo apice flauis.  
Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.  
Parua. Caput nigrum puncto paruo inter antennis flauo. Thorax niger margine antico scutellique linea transuersa flauis. Abdominis petiolus elongatus, incuruus, apice fla-

uus. Segmentum primum minus, atrum, apice flavum, reliqua brevissima, nigra. Pedes nigri.

103. V. flavescens thoracis dorso nigro: lineis *cajennensis*, duabus flavis.

Habitat Cajennae Dom. Bose.

Parva. Caput flavum antennis ferrugineis. Mandibulae apice nigrae. Thorax flavus dorso nigro: lineis duabus, quae tamen margines haud attingunt flavis. Abdomen flavescens. Alae obscurae.

MELLINUS. Palpi elongati: articulis cylindricis.

*Labium* ovatum longitudine maxillae, sub apice palpigerum.

*Antennae* cylindricae: articulo primo longiori.

- 1—2. M. niger thorace maculato, abdomine atro: *2 punctatus*, utrinque macula transversa cinerascete.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus parvum. Caput nigrum utrinque sub antennis macula angulata, flava. Thorax niger margine antico punctoque sub alis flavis. Abdomen atrum, nitidum utrinque macula secundi segmenti transversa cinerascete. Pedes nigri tibiis posticis basi albis.

- 1—2. M. niger thorace maculato, abdomine basi *variegatus*, rufo.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura et magnitudo praecedentis et forte mera eius varietas. Differt tantum abdominis segmento primo toto, secundo basi ferrugineis, reliquis margine cinerascens.

*interruptus*. 4—5. M. ater nitidus abdomine fasciis tribus interruptis albis, pedibus rufis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura parva praecedentium. Caput nigrum labio pube parum cinerascens. Thorax niger margine antico punctoque laterali flavis, sub scutello utrinque spinosus. Abdomen atrum, nitidum fasciis tribus flavis omnibus interruptis, ultimis duabus approximatis. Pedes rufi.

*trifrigatus*. 4—5. M. niger thorace maculato sub scutello bipunctato, abdomine fasciis tribus flavis.

Habitat in Americae Insulis Dom. v. Rohr.

Paruus. Antennae nigrae articulo primo subtus flavo. Caput nigrum ore flavo. Thorax niger puncto ante alas et sub alis flavis. Scutellum flavum et puncta duo magna sub scutello. Abdomen atrum fasciis tribus integris, flavis. Alae apice fuscae. Pedes flavii femoribus nigris.

*scaber*. 7—8. M. scaber niger abdominis segmento primo macula media, reliquis laterali flavis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Paruus. Antennae supra nigrae, subtus ferrugineae. Caput nigrum, sub antennis flavum. Thorax niger punctis duobus minu-



tis lobi antici, callosoque ante alas flavis. Abdomen scabrum, atrum primo segmento macula media transuersa, flauo, reliquis utrinque laterali, quarum prima maior, intus emarginata. Anus siue ultimum segmentum immaculatum. Pedes flavi femoribus nigris.

7—8. *M. niger* thorace maculato, capite sub *an-labiatus*.  
tenuis tibiisque albis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Paruus. Antennae breues, nigrae: articulo primo latiori, subtus albo. Caput nigrum, sub antennis album. Thorax niger margine antico, puncto sub alis duobusque dorsalibus albis. Abdomen nigrum segmentorum marginibus parum piccis. Pedes nigri tibiis albis, posticis annulo albo.

9. *M. ater* fronte punctis duobus, thorace qua-*nigrita*.  
tuor anticis albis,

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Paruus. Antennae nigrae. Caput nigrum utrinque puncto oblongo in cantho oculorum albo. Thorax niger margine antico punctis duobus transuersis punctoque ante alas albis. Abdomen nigrum, immaculatum. Pedes nigri tibiis posticis annulo albo.

PHILANTHUS. *Labium* compressum, rotundatum, maxillis longius.

*Antennae* filiformes, in medio frontis insertae.

*auritus.* 1—2. P. niger capite thoraceque maculatis, abdominis primo segmento maculis duabus, reliquis fascia flavis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura et magnitudo P. coronati. *Antennae* nigrae articulo primo flauo. Caput nigrum labio, orbita oculorum antice lata punctoque magno pone oculos flavis. Thorax niger margine antico interrupto, puncto ante alas, scutello maculisque duabus sub scutello fuluis. Abdomen nigrum primo segmento paruo maculis duabus magnis flavis. 2. fascia flaua, in medio antico late emarginata, 3. 4. fascia integra, lineari, sinmaculato. Pedes flauis.

*ventilabris.* 3—4. P. niger thoracis margine antico posticoque abdominis fasciis tribus flavis: anteriore latiore.

Habitat in Carolina Dom. Bosc.

Magnitudo praecedentium. *Antennae* nigrae, subtus basi flavae. Caput nigrum sub antennis maculaque magna frontali flavis. Thorax scaber, niger margine antico posticoque integris, flavis. Abdomen scabrum, ni-

grum segmento primo utrinque puncto flavo, secundo fascia lata, in medio subinterrupta, reliquis margine parum flavicantibus. Pedes flavi femoribus rufis. Alae basi flavescentes, apice fuscae.

11—12. *P. niger* flavo varius abdominis segmento primo rufo, alis apice nigris. *interstitius.*

Habitat in India Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo *P. ruficornis*. Antennae ferrugineae articulo primo flavo. Caput flavum vertice nigro. Thorax niger margine antico, puncto calloso ante alas, lineis duabus scutelli, macula utrinque sub alis et subscutello flavis. Abdomen nigrum segmento primo rufo, reliquis apice flavis, ano tamen toto nigro. Alae albae, anticae apice nigrae. Pedes flavi geniculis nigris.

11—12. *P. niger* flavo varius abdominis basi rufo: macula flava. *dissectus.*

Habitat in India Dom. Daldorff.

Præcedente paullo minor. Antennae rufae, basi flavae. Caput nigrum labio albo. Thorax niger margine antico utrinque lineola, puncto ante alas scutelloque flavis. Abdomen nigrum petiolo toto ferrugineo, segmento primo basi ferrugineo: macula flava, secundo quartoque apice inprimis ad latera flavis. Pedes flavi femoribus supra nigris.

CRABRO. *Palpi* articulis compressis, rhomboidalibus.

*Labium* breue, corneum, apice palpigerum.

*Antennae* filiformes.

*mediatus.* 16—17. *C. niger* thorace maculato, abdomine atro: fasciis quinque flavis; anticis quatuor interruptis.

Habitat in Europa.

*Medius.* Caput nigrum labio argenteo. Antennae nigrae primo articulo subtus flavo. Thorax niger punctis duobus transuersis marginis antici, puncto sub aliis, lineolaque transuersa scutelli flavis. Abdomen atrum fasciis quinque flavis, quatuor anticis interruptis. Pedes flavi femoribus nigris.

*tridens.* 24—5. *C. scutello bidentato mucronatoque niger* immaculatus abdominis segmentis utrinque macula transuersa flaua.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

*Statura omnino C. mucronati at distinctus et alius.* Corpus paullo maius. Caput nigrum labii pube argentea. Thorax niger, immaculatus. Scutellum denticulis duobus minutis, flavescentibus subtusque mucrone maiori, canaliculato, nigro. Abdomen atrum, glabrum segmentis omnibus utrinque macula flaua. Pedes rufi femoribus nigris.

*crassipes.* 26—7. *C. ater* abdomine petiolato: segmento secundo margine flauo.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Magnitudo et statura omnino *C. leucostomæ*.

Caput nigrum; labio argenteo. Antennae nigrae articulo primo toto flavo. Thorax niger puncto calloso flavo ad basin alarum. Abdomen petiolatum, atrum tegmento secundo margine flavo. Pedes variegati tibiis posticis apice incrassatis, rufis.

27—8. *C. ater* abdomine petiolato: primo seg. *tibialis*.  
mento nodoso, tibiis flavescentibus.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura et magnitudo *C. leucostoma*. Caput nigrum mandibulis apice flavis. Antennae nigrae articulo primo subtus flavo. Thorax niger, immaculatus. Abdomen nigrum, nitidum primo segmento basi attenuato, apice nodoso. Anus flavescens aculeo brevissimo, flavescente. Alae aquaeae. Pedes flavi femoribus in medio atris. Tibiae posticae ferrugineae.

27—8. *C. ater* antennarum medio pedibusque *varicornis*.  
rufis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura parva praecedentis. Antennae nigrae in medio rufae. Caput et thorax nigra, immaculata. Abdomen atrum, nitidum. Pedes rufi.

HYLAEUS. *Os* lingua inflexa, trifida.  
*Maxilla* brevis, cornea.  
*Labium* in medio inflexum, trifidum: lacinia intermedia emarginata.  
*Antennae* cylindricae.

*minutus.* 16—17. H. ater nitens antennis subtus ferrugineis, fronte cinereo villosa.  
 Habitat in Americae Infulis.  
 Minutus totus ater, nitidus. Antennae tantum subtus ferrugineae et frons cinereo pubescens. Alae albo hyalinae.

ANDRENA. *Os* lingua trifida.  
*Labium* cylindricum, maxilla longius, utrinque fetis duabus membranaceis.  
*Antennae* filiformes.

*grisea.* 4—5. A. cinereo villosa abdomine atro: fasciis quatuor albis; anticis duabus interruptis.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.  
 A. cornutae affinis videtur attamen distincta.  
 Antennae nigrae. Caput et thorax cinereo villosa, immaculata. Abdomen atrum, nitidum fasciis quatuor albis prima obsoleta secundaque interruptis. Pedes cinereo hirti tibiis posticis pilis rufis.

APIS. *Os* lingua inflexa, quinquefida.  
*Palpi* breuissimi.  
*Antennae* filiformes.

- 3—4. *A. atra* alis violaceis basi hyalinis. *fenestrata.*  
 Habitat in India orientali Dom. Daldorff.  
 Nimis affinis *A. violaceae* at alae omnes basi hyalinae nec unquam eundem nidum cum illa cohabitare obseruante Daldorffio.
- 13—14. *A. hirsuta* thorace flauescente: fascia *Cajennensis.*  
 atra, abdomine atro: fascia flauescente. *sis.*  
 Habitat Cajennae Dom. Richard.  
 Statura et magnitudo praecedentium. Caput atrum antennis fuscis. Thorax niger, supra flauescens fascia lata inter alas nigra. Abdomen nigrum fascia media flauescente. Corpus nigrum. Alae obscurae.
- 20—1. *A. hirsuta atra* thorace ferrugineo, abdominis segmento secundo flauo. *marylandica.*  
 Habitat in America Dom. Weber.  
 Magna. Caput atrum labio ferrugineo. Antennae nigrae primo articulo ferrugineo. Thorax hirtus, ferrugineus. Abdomen hirtum, atrum segmento secundo flauo. Pedes postici hirsutissimi. Alae violaceo nigrae.
- 29—30. *A. hirsuta atra* thorace fuluo, ano albo. *aprica.*  
 Habitat in Lapponiae Alpibus Dom. de Paykull.  
 Minor *A. agrorum* et distincta. Caput atrum vertice parum ferrugineo. Thorax supra fuluus, immaculatus. Abdomen atrum ano albo.

- nidulans.* 33—4. *A. hirsuta flava thorace fascia nigra ano fuluo.*  
 Habitat in America boreali.  
 Statura et summa affinitas *A. pratorum* at paulo maior. Caput atrum antennis longioribus. Thorax flavus fascia inter alas nigra. Abdomen flavum ano parum fuluo. Pedes nigri.
- feruida.* 43—4. *A. hirta flavescens capite thoracis fascia anoque atris.*  
 Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.  
 Parua in hac familia. Caput atrum, immaculatum. Thorax hirtus, flavescens fascia inter alas nigra. Abdomen hirtum, flavescens ano atro. Corpus atrum.
- alata.* 43—4. *A. hirta flavescens capite anoque nigris.*  
 Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.  
 Statura praecedentis at thorax immaculatus.
- muraria.* 50—1. *A. hirta nigra aut fulva pedibus nigris: tarsis testaceis.*  
 Geoff. Inf. 2. 409. 4.  
 Reaum. Inf. 6. tab. 7. 8.  
 Schaeff. Monogr. Mouverbiene.  
 Habitat in Germaniae, Galliae muris nidum e fabulo plures cellulas continentem struens at solitaria.  
 Affinis *A. amethystinae* at distincta. Mas totus hirtus, ater tarsis solis testaceis. Alae cyanae. Faemina nigra fronte thoracis abdominisque dorso fuluo. Alae albae.
- indica.* 59—60. *A. cinereo villosa abdomine testaceo: ano nigro.*



Habitat in Indiae arboribus cauis, aedificiis strenue mellificans Dom. Daldorff.

A. mellifica duplo minor. Antennae nigrae. Caput et thorax cinereo villosa, immaculata. Scutellum testaceum. Abdomen nudum, testaceum ano nigro. Pedes nigri tibiis pollicis compressis.

59—60. A. atra alis coerulefcenti fufcis. *carbonaria.*

*Apis carbonaria* Linn. fyst. Nat. 2. 954. 7.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Diffineta omnino ab *Andrena carbonaria*. Frons cinereo hirta. Corpus atrum. Alae fufco coeruleae.

82—3. A. thorace ferrugineo tomentoso, abdomine subglobofo nigro: segmentis margine flauis.

Habitat Cajennae strenue mellificans Dom. Bosc.

Statura parua praecedentium. Labium flauum lineolis duabus fufcis. Antennae ferrugineae articulo primo longiori, nigro. Thorax ferrugineo hirtus. Abdomen subglobofum, nigrum segmentorum marginibus flauis. Pedes nigricantes.

83—4. A. hirta nigra thorace ferrugineo, pedibus flauis.

Habitat in America boreali strenue mellificans cera atra Dom. Bosc.

Statura et fumma affinitas A. fauofae. Thorax pilis denfis, ferrugineis hirtus. Abdomen subglobofum, nigrum. Pedes flauis.

- grisea.* 101—2. *A. ferrugineo villosa* abdomine nigro: segmentorum marginibus griseis.  
Habitat in Italia Dr. Allioni.  
Parua. Antennae nigrae. Caput et thorax fusca, ferrugineo villosa. Abdomen nigrum segmentorum marginibus cinereo ferrugineis. Pedes ferruginei.
- pallens.* 110—1. *A. pallide testacea labio cinereo villosa.*  
Habitat Cajennae Dom. Richard.  
Parua tota pallide testacea labio solo cinereo pubescente. Tibiae posticae valde compressae. Alae albae.
- flavicornis.* 111—12. *A. nigra abdominis segmentis tribus apice albis, antennis flavis, tibiis posticis hirsutissimis.*  
Habitat Surinami Dom. Richard.  
Parua. Caput et thorax nigra hirsutie parua cinerea. Antennae flavae. Abdomen nigrum segmento 2. 3. 4. apice albidis. Pedes nigri tibiis posticis hirsutissimis.
- acincta.* 119—20. *A. cinereo pubescens abdomine atro: segmentorum marginibus albo ciliatis.*  
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.  
Corpus paruum, nigrum. Caput et thorax cinereo pubescentia. Abdomen atrum, nitidum segmentorum marginibus albo ciliatis. Alae albae costa nigra. Pedes rufescentes.
- selidonia.* 120—1. *A. hirta virescens abdominis segmentis margine albo.*  
Habitat in Italia Dr. Allioni,

Parua. Caput et thorax virescentia, cinereo pubescentia. Abdomen virescens segmentorum marginibus late albis. Pedes cinerei femoribus albis.

121—2. A. viridis nitida antennis pedibusque *aenea*. nigris.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Nimis affinis A. smaragdula et forte mera eius varietas. Corpus totum nudum, viridi aeneum, nitidum. Labium cinereum. Antennae pedesque nigri.

122—3. A. atra coeruleo nitida labio puncto, *callosa*. thorace calloso utrinque ante alas albis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino A. minutae at paulo maiore. Corpus atrum, coeruleo nitidum. Labium puncto oblongo albo. Thorax ater puncto utrinque calloso ante alas albo. Pedes nigri apice pilis pallidis ciliati.

123—4. A. nigra viridi nitida abdomine albo: *paruula*. segmentis basi atris.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Minutissima. Antennae supra nigrae, subtus albae. Caput nigrum, viridi nitens labio albo. Thorax viridi nitens scutello albo: striga media nigra. Abdomen album, nitidum segmentis basi nigris. Pedes pilosi, albi.

## EUCERA. Os lingua septemfida.

*Labium* quinquefidum: laciniis intermediis maioribus, apice palpigeris.

*Antennae* cylindricae.

*breuicornis*. 8. E. ferrugineo hirta abdomine aeneo, antennis breuibus nigris,

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Antennae cylindricae omnino huius generis at thorace breuiores. Caput et thorax ferrugineo hirta. Abdomen obscure aeneum, pilis rarioribus hirtum. Pedes ferrugineo hirti.

*erassipes*. 9. E. cinereo hirta abdomine atro: segmentorum marginibus virescentibus, femoribus posticis incrassatis.

Habitat Tranquebariae D, Daldorff Mus. Dom. Lund.

Statura omnino huius generis. Antennae cylindricae, thorace breuiores, piceae. Caput et thorax cinereo hirta. Abdomen atrum segmentorum marginibus virescentibus. Alae obscurae, apice fuscae. Pedes flavescentes femoribus posticis incrassatis, dentatis, nigris tibiis incuruis, dentatis, flauis.

FORMICA. *Palpi* inaequales: articulis cylindricis.

*Labium* submembranaceum, cylindricum, apice palpigerum.

*Antennae* filiformes.

9—10. F. atra abdomine cinereo sericeo, thorace *sericea*.  
 ce postice bidentato.

Habitat in Senegalia Mus. Dom. Bosc.

Statura F. nigrae. Caput magnum, atrum antennarum primo articulo basi rufo. Thorax niger, postice compressus, canaliculatus terminatus denticulis duobus obtusis. Abdomen subglobosum, cinereo nitidum, ferriceum. Pedes nigri.

11—12. F. nigra thorace abdominis primo segmento *ferruginea*.  
 mento femoribusque ferrugineis.

Habitat in America.

Statura F. rufae at duplo maior. Caput magnum, glabrum, nigrum. Thorax compressus, ferrugineus squama integerrima, ovata. Abdomen hirtum, fuscum primo segmento ferrugineo, Pedes nigri femoribus ferrugineis.

27—8. F. nigra pedibus ferrugineis, abdomine *conica*.  
 conico.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

F. pallipes paullo maior. Corpus atrum, nitidum pedibus solis rufis. Abdomen conicum, acutum squama integerrima ovata, obtusa.

- cylindrica.* 31—2. F. atra capite cylindrico rufo: ore atro.  
Habitat in India Mus. Dom. Bosc.  
Media. Caput magnum, cylindricum, rufum  
ore atro.  
Mandibulae exsertae, intus dentatae. Thorax  
parum compressus, ater. Abdomen cylin-  
dricum, atrum, immaculatum. Pedes ni-  
gri. Alae obscurae.
- flavicornis.* 38—9. F. thorace hirtio ferrugineo nigra anten-  
nis apice flavis.  
Habitat Cajennae.  
Magna, elongata. Caput nigrum, obscurum  
mandibulis porrectis, apice incrassatis, ob-  
lique truncatis, ferratis. Antennae nigrae,  
apice flavae. Thorax pilis densis ferrugi-  
neis tectus. Petiolus brevis, basi pari tuber-  
culorum obtusorum. Squama integerrima  
crassa, latissima. Abdomen ovatum, obscu-  
rum. Pedes nigri. Alae subferrugineae.
- neglecta.* 38—9. F. thorace inermi nigra tarsis anticis sub-  
tus rufo hirtis.  
Habitat in Insula Goré Africae Dom. Bosc.  
Statura et magnitudo praecedentis tota nigra,  
immaculata, distincta tarsis anticis rufo  
hirtis.
- tuberculata.* 38—9. F. thorace inermi ferruginea mandibulis  
exsertis dentatis, petiolo binodi.  
Habitat Cajennae Mus. Dom. Bosc.  
Praecedentibus minor. Corpus totum pilosum,  
ferrugineum. Petiolus elongatus tuberculis  
duobus elevatis.

42—3. *F. thorace antice bispinoso nigra mandi-fungosa*,  
bulis exsertis apice truncatis ferratis.

Habitat Cajennae in nidis magnis, fungosis e  
tomento plantarum confectis.

Parua. Caput medium, ouatum, nigrum an-  
tennarum primo articulo ferrugineo. Man-  
dibulae exsertae, truncatae, ferratae. Tho-  
rax antice utrinque spina valida armatus, ni-  
ger, immaculatus. Abdomen rotundatum,  
atrum.

MUTILLA. *Palpi* articulis obconicis;  
*Labium* porrectum, cor-  
neum, obconicum, api-  
ce palpigerum.

*Antennae* filiformes.

13—14. *M. nigra* abdomine puncto dorsali *fasciata*,  
cuiusque albis.

Habitat in Americae Insulis Mus. Dom. Bosc.

Caput et thorax atra, immaculata. Abdomen  
hirtum, atrum macula magna dorsali secun-  
di segmenti apicibusque approximatis reli-  
quorum segmentorum albis. Pedes nigri.

19—20. *M. hirta* nigra thoracis margine antico *pedemon-*  
cinereo, abdominis secundo segmento rufo *tana*,  
posticeque fasciis duabus cinereis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

*M. italica* duplo minor. Caput atrum. Tho-  
rax niger margine antico scutelloque cine-  
reis. Abdomen conicum segmento secundo

---

rufo quarto quintoque fascia e pilis cinereo argenteis. Alae fulcae. Pedes nigri.

*calua.*

24—5. *M. nigra* vertice thoraceque rufis, abdomine segmentis margine cinereis.

Habitat in Gallia Dom. Latreille.

Corpus paruum, hirtum, nigrum. Caput nigrum vertice antennisque rufis. Thorax rufus. Abdomen nigrum segmentorum marginibus cinereo ciliatis. Pedes rufi.

*vagans.*

27—8. *M. rufa* abdomine obscuriore segmentorum marginibus punctisque duobus secundi segmenti albis.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo *M. nigripes*. Caput rufum antennis nigris. Thorax hirtus, rufus. Abdomen magis obscurum segmentis omnibus margine albis secundoque maiori punctis duobus dorsalibus albis. Pedes rufi tibiis obscurioribus.

---



---

CLASSIS V.

O D O N A T A.

MAXILLA CORNEA, DENTATA. PAL-  
PI DUO.

---

LIBELLULA, *Labium* trifidum: laci-  
nia dorsali minutif-  
sima.

*Antennae* tenuissimae,  
filiformes.

1—2. L. alis omnibus stria marginali flava apice *conspurca-*  
que macula fusca. *ta.*

Habitat Kiliae Dom. Weber,

Statura omnino L. 4maculatae at distincta. Os  
vesiculofum, flavesens. Thorax villosus.  
Abdomen triangulare, flavesens linea dor-  
sali atra. Alae planae, anticae stria ante  
marginem crassiolem flava, quae tamen api-  
cem haud attingit. Macula ordinaria mar-  
ginalis et macula magna fusca alam termi-  
nat. Posticae anticis concolores at macula  
basios nigra.

14—15. L. thoracis lateribus flavis: lineis ra-*asiatica,*  
mosis nigris.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura L. vulgarissimae. Caput flammum macula frontali, biloba, coerulea. Thorax supra fuscus lineis duabus dorsalibus, approximatis, flavis, lateribus flavis lineis ramosis nigris. Abdomen rubicundum. Alae hyalinae stigmate ordinario fusco.

*gibba.*

14—15. L. flavo nigroque varia abdomine basi gibbo, alis obscuris: stigmate albo.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura praecedentis. Caput flavescens. Thorax flavescens, undique nigro lineatus. Abdomen tenue, cylindricum basi supra infraque gibbum, apice compressum, flavum, basi nigro lineatum, medio fasciatum, apice totum nigrum. Alae albae at obscurae stigmate ordinario albo.

*carnatica.*

18—9. L. alis hyalinis: stigmate marginali fusco, corpore nigro immaculato.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus nigrum, immaculatum ore femorumque basi parum piccis. Alae hyalinae, immaculae stigmate ordinario, fusco.

*braminea.*

18—19. L. alis hyalinis stigmate marginali albo, corpore flavo nigro lineato.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo praecedentis. Caput flavum antennis nigris. Thorax elevatus, flavus lineis quinque impressis, fuscis. Abdomen flavum linea dorsali integra, lateribus interruptis nigris. Alae hyalinae, immaculae stigmate marginali ordinario, albo.

18—19. L. alis hyalinis: stigmatate niueo, corpo *flauescens*,  
re *flauescente*.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Statura praecedentium. Caput *flauescens* oculis magnis, fuscis. Thorax *flauescens*, immaculatus. Abdomen compressum, *flauescens* linea dorsali nigra. Alae albae stigmatate marginali niueo.

18—19. L. alis hyalinis: stigmatate marginali *fuscoerulescente*, corpore *coerulescente*.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Media. Os *flauescens* fronte nigricante. Corpus *coerulescens*, immaculatum. Alae basi immaculatae.

25—6. L. alis hyalinis: posticis macula media *flauescente* adiacente albae, corpore *flauescente*. *Tillarga*.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus medium totum *flauescens*. Alae anticae hyalinae, immaculatae, posticae hyalinae macula magna, media, *flauescente*, cui adjacet macula niuea.

AESHNA. *Labium* trifidum: laciniis aequalibus, lateralibus truncatis, dentatis, intermedia emarginata.

*Antennae* tenuissimae, filiformes.

1—2. A. fusca thorace maculis duabus anticis *liheros*,  
neisque duabus sub alis viridibus, cauda unguiculata.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

A. grandis adhuc maior. Caput vesiculofum, eleuatum, flauescens. Thorax̄ obscurus maculis duabus anticis lineisque duabus utrinque sub alis obliquis, viridibus. Abdomen cylindricum, in nostris fuscum cauda valde appendiculata. Alae reticulatae, obscurae. Abdomen animalculo viuento forte variegatum.

*annulata.* 4—5. A. thorace fusco, abdomine pallidioré: segmentorum marginibus atris.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Media. Caput punctatum, obscure flauescens. Thorax villosus, fuscus. Alae albo hyalinae stigmate albido. Abdomen cylindricum, obscure flauescens segmentorum marginibus atris. Pedes flauescens.

AGRION. *Labium* trifidum: laciniis exterioribus bifidis.

*Antennae* tenuissimae, filiformes.

*barbara.* 2—3. A. supra viridis subtus flaua alis stigmate nigro albo.

Habitat in Barbaria Dom. de Rehbindér.

Statura et magnitudo A. puellae. Caput viride ore flauo. Thorax supra viridis lineis tribus dorsalibus, flauis, subtus flauus. Abdomen cylindricum, supra viride, subtus flauum. Alae hyalinae stigmate ordinario nigro, dimidiato albo.

- 
- 3—4. *A. flavescens* pedibus nigro ciliatis. *coromandeli-  
liana.*  
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura praecedentium. Corpus totum flaves-  
cens. Alae hyalinae, abdomine breviores,  
stigmatе ordinario albo. Pedes flavi, intus  
spinis nigris ciliati.

- 3—4. *A. viridi aenea* thoracis lateribus flavo linea-*americana.*  
tis, alis basi sanguineis.

Habitat in America Dom. Hybner.

Statura omnino praecedentium. Caput villo-  
sum, aeneum. Thorax villosus, aeneus,  
interdum aureus lateribus semper flavo line-  
atis. Alae hyalinae macula magna baseos  
sanguinea. Abdomen cylindricum, aeneum.  
Pedes valde ciliati.

---

---

CLASSIS VI.  
MITOSATA.

*MAXILLA* CORNEA, FORNICATA, HAUD  
PALPIGERA.

---

SCOLOPENDRA.

**O**s maxillis palpisque.

*Palpi* quatuor inaequales:

*anteriores* subbreuiores, arcuati, filiformes, quadriarticulati: articulo secundo longiori, incuruo, ultimo subtenuiori, unguiculato, basi connati, liberi inter maxillas et labium inferi

*posteriores* maxillas aemulantes, validi, cornei, arcuati, quadriarticulati: articulo primo maiori, crassiori; apice interiori tridentato, secundo tertioque breuissimis, quarto longissimo, arcuato, acuto labii medio exteriori adnati.

*Mandibula* breuis, cornea, fornicata basi interiori dente valido acuto, fere palpiiformi, apice rotundata, edentula.

*Maxilla* mandibulis longior, cornea, valida, fornicata, basi interiori dente valido arcuato, apice truncata, quinque dentata.

*Labium* crassum, fissum, apice sexdentatum.

*Antennae* setaceae.

SCOLOPENDRA. *Palpi* quatuor.

*anteriores* basi con-  
nati, liberi.

*posteriores* arcuati,  
mandibuliformes.

*Antennae* setaceae.

6—7. S. pedibus utrinque 20 violacea capite cau-*violacea*.  
daque rufis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.

S. electrica paullo maior. Caput rufum anten-  
nis violaceis. Primum corporis segmentum  
et ultima tria cum pedibus caudalibus rufa.

Pedes reliqui violacei.

JULUS. *Labium* crenatum, emargina-  
tum.

*Antennae* moniliformes, ex-  
trorsum crassiores.

5—6. I. pedibus utrinque 72. plumbeus: seg-*guttulatus*.  
mento singulo punctis duobus coccineis.

*Julus guttulatus* Aët. Hist. nat. Angl.

Habitat Parisiis in arboribus pomiferis Dom.  
Bosc.

Minuta. Puncta coccinea pereunt cum vita.

---

CLASSIS VII.  
V N O G A T A.

*MAXILLA CORNEA, VNGUICULATA.*

---

S O L P U G A.

*O*s mandibulis palpisque.

*Palpi* quatuor inaequales.

*anteriores* longiores, crassi: articulo ultimo  
globofo.

*posteriores* paullo breuiores, filiformes: articu-  
lis aequalibus.

*Mandibula* magna, chelifera, fessilis.

*Maxilla* depressa, falcata, acuta.

*Labium* haustelliforme.

*Antennae* nullae.

*Genus* omnino distinctum videtur at character na-  
turalis nondum rite elaboratus.

---



ARANEA. *Palpi* duo incurui, maris clauati.

*Labium* breue, apice rotundatum.

*Antennae* nullae.

1—2. A. pallide testacea mandibulis ferrugineis: *pallens*, unguibus nigris.

Habitat in Americae Insulis Dom. v. Rohr.

Corpus magnum, totum pallide testaceum mandibulis folis obscurioribus unguibus nigris. Abdomen paruum, rotundatum. Pedes extensi, primi paris paullo longiores, tertii breviores.

4—5. A. villosa cinerea pectore atro. *nobilis*.

Habitat in India.

Magna tota villosa cinerea. Margo capitis sub oculis albus, qui ramum usque ad dimidium mandibulae exserit. Pectus atrum. Pedes cinerei tibiis subtus nigro fasciatis.

10—11. A. ferruginea abdomine globoso flauescente: *bicolor*.

Habitat in America.

Media. Caput et thorax obscure ferruginea, immaculata. Abdomen globosum, flauescens. Pedes ferruginei.

23—9. A. atra maculis villosis argenteis, abdomine ouato cinereo: *esuriens*.

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Magna. Thorax ater maculis inprimis postice villosis, argenteis. Abdomen ouatum, vil-

losum, cinereum. Pedes elongati femoribus tibiisque ferrugineis; geniculis incrassatis nigris, apice nigri.

*rapax.*

- 33—4. A. testacea abdomine cylindrico fusco, mandibulis longissimis biarticulatis dentatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus medium, testaceum abdomine elongato, cylindrico, fusco. Palpi maris porrecti, clauati, apice attenuati, cylindrici. Mandibulae exsertae, longissimae, biarticulatae: articulis aequalibus; primo crassiori, intus dentato, secundo subulato, acuto. Pedes longissimi, villosi, testacei.

*geminata.*

- 38—9. A. abdomine transuerso: ambitu sex spinoso: spinis lateralibus connatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura parua A. tetracanthae. Corpus nigrum, immaculatum abdomine transuerso lateribus valde dilatatis: spinis utrinque duabus validis, connatis. Anus valde retusus spuriiis duabus validis, distinctis. Color abdominis magis fuscus margine antico striga macularum ocellatarum, eleuatarum.

*parallela.*

- 75—4. A. oculis :: fusca thoracis abdominisque lateribus albis, mandibulis porrectis parallelis.

Habitat in Americae Insulis Dom. v. Rohr.

Parua. Mandibulae valde porrectae, parallelae, fuscae unguibus nigris. Thorax rotundatus, planus, fuscus: lateribus albis. Abdomen fere conicum, planum, fuscum lateribus al-

bis. Pedes pallidi, antici longiores, subtus nigri.

**PHALANGIUM.** *Palpi* duo incurui.  
*Mandibula* chelifera.  
*Antennae* nullae.

6—7. P. corpore depresso subrotundo antice uni *4dentatum*.  
 spinoso, postice quadridentato, femoribus spinosis.

*Phalangium 4dentatum* Cuvier Magaz. Enc. tab. fig.

Habitat in Gallia Dom. Cuvier.

Minor P. opilio. Corpus planum, subrotundum spina antica porrecta, acuta posticeque denticulis quatuor minoribus, obtusiusculis. In dorso tuberculum paruum, elevatum, subspinosum uti in P. diadema at multo minus. Pedes octo femoribus spinosis secundi paris longissimis.

**SOLPUGA.** *Palpi* quatuor.  
*Mandibula* chelifera, sessilis.  
*Labium* haustelliforme.  
*Antennae* nullae.

1. S. chelis horizontalibus, abdomine depresso *fatalis*. villoso.

*Solpuga fatalis* Lichtenst. Catal. Hamb. 1797. 151. 195.

Habitat in Bengalia.

Genus mihi haud rite notum.

*araneoides*. 2. S. chelis verticalibus, abdomine tereti nudiusculo.

*Solpuga araneoides* Lichtenst. Catal. Hamb.

1797. 151. 196.

*Phalangium araneoides* Ent. syst. 2. 431. 9.

Pallas spicil. Zool. fasc. IX. tab. 3. fig. 7. 8. 9.

Habitat in Rudia australi.

*chelicornis*. 3. S. chelis verticalibus cirrhiferis, abdomine lanceolato villosissimo.

*Solpuga chelicornis* Lichtenst. Catal. Hamb.

1797. 152. 197.

Petiv. Gazoph. tab. 12. fig. 1. tab. 85. fig. 9.

Habitat in Amboina.

SCORPIO. *Palpi* duo porrecti, cheliferi.

*Labium* bifidum.

*Antennae* nullae.

*mucronatus*. 5—6. S. pectinibus viginti variegatus cauda sub aculeo mucronata.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus totum fusco flavescentique variegatum.

Chelae flavae digitis fuscis. Cauda laevis, apice mucronata aculeo incuruo, acutissimo.

Pedes compressi.

*Tamulus*. 6—7. S. pectinibus - - - chelis laevis: digitis carpo longioribus filiformibus, cauda lineis elevatis laevis.

---

Habitat in India orientali. Ictu dolores vehementissimos, totum corpus peruagantes per viginti quatuor horas, sexta singula hora exacerbantes excitat. Postero die remanet motus membrorum impeditus et tertio die plerumque post calorem siccum sudore vehementi venenum evacuatur. Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo omnino S. hottentotta.  
Corpus fuscum pedibus testaceis.

---

---

CLASSIS VIII.  
POLYGONATA.

*MAXILLAE* PLURES INTRA LABIUM.

---

ONISCUS.

*Os* prominulum mandibulis maxillaque duplici.  
*Clypeus* brevis, transuersus, integer.

*Mandibula* brevis, ossea, apice truncata, tridentata, in medio palpo breui, obtuso, uti videtur, inarticulato.

*Maxilla* duplicata.

*exterior* ossea, paullo longior, multidentata.

*interior* breuior, apice obtusa, integra.

*Labium* membranaceum, bifidum: laciniis rotundatis, aequalibus.

*Palpi* quatuor inaequales, filiformes.

*exteriores* basi exteriori labii inferti.

*posteriores* breuissimi adhaerentes labii apice.

*Antennae* duae porrectae, filiformes.

LIGIA.

*Os* prominulum maxilla duplici.

*Clypeus* brevis, transuersus, integer.

*Mandibula* — — —

*Maxilla* duplicata.

*exterior* longior, membranacea, recta, apice bidentata.

*interior* brevis, membranacea, integra.

*Labium* porrectum, membranaceum, depressum, ovatum, apice acutum, integrum.

*Palpi* nulli?

*Antennae* duae setaceae: articulis tribus prioribus longioribus, aequalibus, reliquis numerosis, brevissimis.

## I D O T E A.

Os palpis maxillaque duplici.

*Clypeus* brevis, truncatus, transversus, integer.

*Mandibula* magna, crassa, fornicata, apice truncata, externe dente valido exserto, dorso palpifero.

*Palpus* planus, filiformis, quadriarticulatus: articulo primo brevissimo, secundo tertioque aequalibus longioribus, quarto brevi, subulato, villoso.

*Maxilla* duplicata.

*exterior* ossea, plana, labio paullo longior, extus rotundata, intus ciliato spinosa.

*interior* ossea, medio dilatata, apice ciliata.

*Labium* breve, osseum, apice rotundatum, ciliato spinosum bifidum: laciniis extus palpi-geris.

*Palpus* elongatus, labio triplo longior, septem articulatus: articulis subaequalibus, fornicatis; quarto inflexo.

*Antennae* quatuor inaequales setaceae:

*superiores* breues, multiarticulatae: articulis tribus baseos maioribus, reliquis breuibus dorso ferratis, subtus pilosis.

*inferiores* longiores, multiarticulatae: articulis tribus baseos maioribus.

## CYMOTHOA.

Os maxilla duplici.

*Clypeus* inflexus, rotundatus, integer.

*Mandibula* — — —

*Maxilla* duplicata.

*exterior* membranacea, integra, obtusa.

*interior* membranacea, dorso palpigera.

*Palpus* setaceus, quinquearticulatus: articulis aequalibus.

*Labium* laxissimum, membranaceum, rotundatum, bifidum.

*Antennae* quatuor breues, aequales, setaceae: articulis subaequalibus.

## MONOCULUS.

Os mandibulis maxillaque duplici.

*Clypeus* magnus, deflexus, membranaceus, rotundatus, integer.

*Mandibula* magna, gibba, arcuata, fornicata, apice depressa, truncata, multidentata.

*Maxilla* duplicata.

*interior* maior, rotundata, membranacea, basi unidentata, apice truncata, ciliata, dentata.



---

*exterior membranacea: dorso eleuato, rotundato, apice acuta, edentula.*

*Labium membranaceum bifidum: laciniis rotundatis palpigeris.*

*Palpi utrinque quatuor setacei, multiarticulati, sensim longiores laciniis labii inserti.*

*Antennae breuissimae, filiformes sub clypeo insertae.*

---

+ ONISCUS. *Palpi* utrinque duo labio inferti.

*Antennae* duae filiformes.

*Afellus.*

3. *O. scaber* cauda obtusa: stylis duobus simplicibus antennarum articulo terminali biarticulato.

*Oniscus Afellus* Ent. syst. 2. 397. 3. Linn. syst. Nat. 2. 1061. 14. Fn. Su. 2058.

Geoff. Inf. 2. 760. 2.

Degeer Inf. 7. 547. 1. tab. 35. fig. 3.

Sulz. Inf. tab. 24. fig. 154.

Habitat in muribus, ligno putrido.

*murarius.*

3—4. *O. cauda obtusa*: stylis duobus simplicibus, antennarum articulo terminali triarticulato.

*Oniscus murarius* Cuvier Journ. d' Hist. nat. 2. 22. 4. tab. 26. fig. 11. 12. 13.

Habitat in Gallia Dom. Cuvier.

Nimis affinis certe *O. Afello* et forte mera eius varietas. Differt tantum corpore latiore, minus scabro, antennarum articulo ultimo triarticulato aut potius antennis articulis tribus parvis terminatis. Mucro caudae paulo longior quam in praecedente.

*hypnorum.*

4—5. *O. cauda setis bifidis*: antennarum primo articulo subspinoso.

*Oniscus hypnorum* Cuvier Journ. d' Hist. natur. 2. 21. 1. tab. 26. fig. 3. 4. 5.

Habitat in Galliae Museis Dom. Cuvier.

Paruus. *Antennae* multiarticulatae articulo primo apice dimidiato appendiculo cylindri-

co, truncato, acuminato sequentibus tribus maioribus cylindricis, ultimis numerosis, rotundatis. Cauda fetis duabus bifidis. An potius Ligia?

4—5. O. ater segmentorum marginibus cocci-*annulatus*.  
neis, cauda obtusa integra.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino O. Armadillo totus ater, glaber  
segmentorum marginibus sanguineis.

LIGIA. *Palpi* nulli.

*Antennae* duae fetaceae.

1. L. cauda abbreviata bifida: stylis bifidis. *oceanica*.

*Cymothoa oceanica* Ent. syst. 509. 22.

*Oniscus oceanicus* Mant. Inf. 1. 242. 18. Linn.  
syst. Nat. 2. 1061. 12.

Stroem. Sundm. 202. tab. 1. fig. 14. 15.

Aët. Helvet. 5. 371. tab. 5. fig. 663.

Bast. subf. 26. 145. tab. 13. fig. 4.

Gronov. Zooph. 994. tab. 17. fig. 2.

Penn. Zool. Britann. 4. tab. 18. fig. 4.

Habitat in Oceano Europaeo frequens.

Ligiae corpus ovatum, submarginatum, agile, scabrum segmentis quindecim: margine deflexo, acuto, capite magno, transverso, exserto, antennis approximatis, medio frontis infertis, oculis ovatis prominentibus, lateralibus margine primi segmenti firmatis, cauda breui rotundata stylis duobus depressis, marginatis, apice bifidis: laciniis rotundatis fetaceis pedibus utrinque septem, brevibus, incurvis, biunguiculatis, colore obscuro.

*italica.*

- 2.
- L. cauda elongata bifida: stylis bifidis.*

Habitat in Italiae aquis Dr. Allioni.

Statura et magnitudo omnino praecedentis at distincta et alia. Antennae longitudine corporis. Corpus ovatum cauda bifida stylis elongatis bifidis longitudine corporis.

## IDOTEA. Os palpis quatuor.

*Antennae quatuor setaceae: inferioribus longioribus.**americana.*

- 1.
- I. abdomine foliolis duodecim obtecto, pedibus posticis elongatis rufis, cauda rotundata.*

*Cymothoa americana* Ent. syst. 2. 507. 14.

Habitat in Oceano americano Dr. Pflug.

*psora.*

- 2.
- I. abdomine subtus nudo, cauda femiionali acuta.*

*Cymothoa psora.* Ent. syst. 2. 507. 15.*Oniscus psora* Mant. Inf. 1. 241. 13. Linn. syst.

Nat. 2. 1060. 3. Fn. Su. 2054.

Stroem. Act. Hafn. 9. 594. tab. 10.

Habitat in Oceano Norwegico.

*physodes.*

- 3.
- I. abdomine subtus nudo, cauda ovata.*

---

Idoteae corpus oblongum, tardum, vix marginatum, segmentis corporis 9—15 ultimis minoribus, capite exserto, transverso, oculis rotundatis, subprominulis, medio marginis exterioris insertis, antennis approximatis, incumbentibus, capitis, apice insertis, cauda maiore, a corporis segmento distincta, saepius absque setis. Pedes utrinque septem breves, multi articulati, ungue duplici incurvo, acuto, colore obscuro,

*Cymothoa physodes* Ent. syst. 2. 507. 16.

*Oniscus physodes* Mant. Inf. 1. 241. 14. Linn. syst. Nat. 2. 1060. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 30. fig. 11.

Habitat in Oceano Europaeo.

4. I. oblonga grisea antennis pedibusque pallidio-acuminata, ribus, cauda acuminata.

*Cymothoa acuminata* Ent. syst. 2. 508. 18.

Habitat in Oceano.

5. I. oblonga griseo fusca, cauda emarginata. *emarginata.*

*Cymothoa emarginata* Ent. syst. 2. 508. 19.

Habitat in Oceano Dom. Lund.

6. I. oblonga fusca cauda pallida nigro punctata. *albicornis.*

*Cymothoa albicornis* Ent. syst. 2. 509. 20.

Habitat in mari hispanico frequens pisces consumens Dom. Prof. Vahl.

7. I. cauda rotunda: stylis bifurcis. *aquatica.*

*Cymothoa aquatica* Ent. syst. 2. 505. 8.

*Oniscus aquaticus* Mant. Inf. 1. 241. 7. Linn. syst. Nat. 2. 1061. 11. Fn. Su. 2061.

Geoff. Inf. 2. 672. 1.

Degeer Inf. 7. 495. 1. tab. 31. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 30. fig. 12.

Frish. Inf. 10. tab. 5.

Schaeff. Elem. tab. 22.

Habitat in Europae aquis stagnantibus.

8. I. semicylindrica cauda ouato oblonga acumi-marina, nata.

*Cymothoa marina* Ent. syst. 2. 506. 9.

*Oniscus marinus* Mant. Inf. 1. 241. 8. Linn. syst. Nat. 2. 1060. 7. Fn. Su. 2057.

Pall. spicil. Zool. 9. 66. tab. 4. fig. 6.  
 Degeer Inf. 7. 523. 3. tab. 32. fig. 11.  
 Penn. Zool. Brit. 4. tab. 18. fig. 3.  
 Habitat in Oceano Norwegico.

*linearis.*

9. I. linearis cauda quadridentata.

*Cymothoa linearis* Ent. syst. 2. 506. 10.

*Oniscus linearis* Mant. Inf. 1. 241. 9. Linn. syst.

Nat. 2. 1060. 9. Amoen. acad. 6. 415. 100.

Pall. spicil. Zool. 9. 62. tab. 4. fig. 11.

Penn. Zool. Britann. 4. tab. 18. fig. 2.

Habitat in Oceano Indico.

*scopulorum.* 10. I. lutea: strigis fuscis.

*Cymothoa scopulorum* Ent. syst. 2. 507. 13.

*Oniscus scopulorum* Mant. Inf. 1. 241. 12. Linn.

syst. Nat. 2. 1061. 10. Fn. Su. 2060.

Habitat in Oceano Norwegico.

CYMOTHOA. Palpi duo fetacei.

Antennae quatuor aequales, fetaceae.

*paradoxa.* 1. C. segmentorum lateribus falcato spinosis Ent. syst. 2. 503. 1.

*Oniscus paradoxus* Mant. Inf. 1. 240. 1.

Habitat in Terra del Fuego Mus. Dom. Banks.

*imbricata.* 2. C. antennis compressis, pedibus unguiculatis, femoribus posticis carinatis Ent. syst. 2. 503. 2.

*Oniscus imbricatus* Mant. Inf. 1. 241. 3.

Habitat in noua Zelandia Mus. Dom. Banks.

3. C. segmentorum lateribus foliato bispinosis *Mcata*.  
Ent. syst. 2. 504. 3.

*Oniscus falcatus* Mant. Inf. 1. 240. 2.

Habitat in Oceano chinensi.

4. C. abdomine foliolis duobus obtecto, cauda *Afilus*.  
semiovali Ent. syst. 2. 504. 4.

*Oniscus Afilus* Mant. Inf. 1. 241. 4. Linn. syst.

Nat. 2. 1059. 1. Fn. Su. 2052.

Pall. spic. Zool. 9. 71. tab. 4. fig. 12.

Petiv. Gazoph. tab. 155. fig. 1.

Planc. Conch. min. not. tab. 5. fig. A. B.

Habitat in Oceano Europaeo.

Cymothoas reliquas mihi minus notas ad ulte-  
riorem ditquisitionem sepono.

+ MONOCULUS. *Palpi* utrinque qua-  
tuor sensim decres-  
centes.

*Antennae* breuissimae.

1. M. testa oblonga postice truncata ferrata, cau- *Apus*. +  
da bifeta. Ent. syst. 2. 488. 1. Linn. syst. Nat.  
2. 1058. 3. Fn. Su. 2045.

*Limulus palustris* Myll. Entomast. 127. 61.

*Binoculus* Geoff. Inf. 2. 660. 1.

*Apus cancriformis* Schaeff. Monogr. 1756. tab.

1—6. Frish. Inf. 10. tab. 1.

Naturf. 19. 60. tab. 3. fig. 1—12.

Sulz. Inf. tab. 24. fig. 153.

Habitat in Europae aquis stagnantibus.

*piscinus.*

2. *M. corpore cordato plano.* Ent. syst. 2. 489. 2.  
Linn. syst. Nat. 2. 1057. 2. Fn. Su. 2045.

*Binoculus haemisphaericus* Geoff. Inf. 2. 660. 2.  
tab. 21. fig. 3.

*Caligus curtus* Myller. Ent. 130. 63. tab. 21. fig.  
1. 2.

Aët. Hafn. 10. 23. tab. 7. fig. 1—7.

Stroem. Sundm. 1. 167. tab. 1. fig. 4. 5. 6.

Bast. subf. 2. 137. tab. 8. fig. 9. 10.

Aët. Societ. Berol. 3. 44. tab. 1. fig. 4. 5. 6.

Frish. Inf. 6. tab. 12.

Habitat in Oceano piscibus molestus.

*Crango-  
rum.*

3. *M. ecaudatus corpore plano depresso.*

Habitat in Branchiis Palaemon squilla Dom.  
Brogniard.

Statura omnino *M. piscini*, supra planus, lae-  
uis, ferrugineus margine pallidior subtus  
ovis numerosis. Pedes breves, incutui, un-  
guiculati utrinque septem.

*Monoculi* reliqui minores siue Entomastraca  
*Mylleri* nondum rite noti. *Amymone* et  
*Nauplii Mylleri* metamorphosi in Cyclopes  
transeunt observante oculatissimo Iurino Ge-  
nevensi.

*Lerneae* Linnaei prima specie excepta etiam huc  
pertinere videntur.



---

CLASSIS IX.

KLEISTAGNATHA.

*MAXILLAE* PLURES EXTRA LABIUM OS  
CLAUDENTES.

---

C A N C E R.

**O**s mandibulis, palpis maxillaque triplici.

*Maxilla exterior* cornea totum os obtegens, bifida: lacinia interiore maiore, plana, in medio geniculata, coarctata, margine interiori ciliato, apice truncata, subsinuata: angulo externo palpifero.

*Palpus* compressus, fetaceus, triarticulatus: articulo primo maiore, obconico, incuruo, secundo breuiore, conico, tertio longiore, arcuato, ciliato.

*Lacinia* exteriori multo minore, subcornea, flagelliformi: stylo lanceolato lineari, apice palpifero.

*Palpus* longitudine dimidii styli, incuruus, fetaceus multiarticulatus: articulo primo crassiore longiore inflexo, reliquis decreescentibus, numerosis, vix conspicuis.

*Palpi* duo intermaxillares porrecti, bifidi: lacinia interiore breuiore, compressa, ciliata, quin-

que articulata: articulo primo breui, transuerso, secundo longissimo, tertio incuruo, quarto latiore transuerso, quinto rotundato, exteriori flagelliformi submembranacea: articulo primo compresso lacinia interiore longiore, secundo ouato, incuruo, reliquis numerosis, minutis, decrefcentibus, ciliatis.

*Maxilla secunda* subcornea, trifida: lacinia interiore breuissima, ouata, ciliata, intermedia maiore, dilatata, subfornicata, ciliata, exteriori longissima, membranacea: basi cylindrica, medio dilatata, ciliata, apice retusa.

*Palpus* membranaceus flagelliformis maxillae secundae basin anteriorem adhaerens, elongatus, multiarticulatus: articulo primo lineari, longissimo, secundo ouato, incuruo, reliquis numerosis, decrefcentibus, ciliatis, vix conspicuis.

*Maxilla tertia* mandibularum basin tegens, membranacea, quadrifida: lacinia interiore subfornicata, dilatata, fissa, parum ciliata, secunda unguiformi, cornea, arcuata, acuta, tertia longiore, versus apicem ciliata, oblique truncata, dilatata, exteriori basi ouata, apice lineari.

*Labium* breue membranaceum mandibulis arcte adhaerens.

*Mandibula* ossea utrinque sinuata, apice dilatata, fornicata, intus palpigera,

*Palpus* angulo medio mandibulae insertus, compressus, ciliatus, quadriarticulatus: articulo primo maiore, quarto longiore, incuruo.

*Antennae* quatuor subaequales.

*exteriores* paullo breuiores, fetaceae, multiarticulatae sub margine frontis prominente ad oculos insertae: articulo primo globoso, secundo maiori, ouato, tertio cylindrico, reliquis numerosis, breuissimis.

*interiores* complicatae in foveola sub capitis margine absconditae, approximatae, quadriarticulatae: articulo primo breuissimo, globoso, secundo longiori, obconico, tertio longiori compresso, interne canaliculato, quarto falcato, corneo in canali articuli tertii recondendo.

## C A L A P P A.

Os mandibulis, palpis maxillaque quadruplici.

*Maxilla* exterior ossea, os inferne obtegens, insidens articulo osseo transuerso, plano, semi-orbiculato, sub chelis inserto, semiobtecto, utrinque ciliato: ciliis inferioribus reflexis, bifida: lacinia interiore multo maiore lanceolato oblonga, subfornicata, versus basin extrorsum arcuata, ultra medium geniculata, margine interiori crenato, ciliato, versus apicem palpigero.

*Palpus* breuis, corneus, in canali laciniae recondendus, biarticulatus; primo latiore, secundo longiore, interne canaliculato.

*Lacinia* exteriori minore, triquetra lineari, versus apicem parum angustata, ad basin obsolete geniculata, apice emarginata, palpigera

*Palpus* flagelliformis, membranaceus, setaceus, longitudine dimidiae laciniae: articulo primo maiori, ovato, incurvo, reliquis numerosis, brevissimis, decreascentibus.

*Palpi* intermaxillares porrecti, bifidi: lacinia interiori cornea, breviori, crassiore, subsecuriformi, quinquearticulata: articulo primo brevi, transverso, secundo longissimo, tertio ovato, incurvo, quarto quadrato, quinto orbiculato, ciliato: lacinia exteriori multo longiore, tenuiore, membranacea, flagelliformi, multiarticulata: articulo primo longissimo, usque ad oculos porrecto, secundo ovato, incurvo, reliquis brevissimis, numerosis, decreascentibus, supra mandibulas incumbentibus.

*Maxilla* secunda trifida: lacinia interiori brevissima, cornea, rotundata, ciliata, intermedia multo maiore, dilatata, fornicata, margine interno rectiore, ciliato serieque obliqua setarum in latere externo, exteriori elongata, ultra mandibulas porrecta, plana, ossa, in medio membranacea, apice ossa, lanceolata, obtusa, in fossula propria ad oculos recondenda, basi exteriori palpigera.

*Palpus* membranaceus, flagelliformis, multiarticulatus: articulo primo longissimo, usque

ad oculos porrecto, secundo ovato, inflexo, reliquis numerosis, decrefcentibus, vix confpicuis.

*Maxilla* tertia fubmembranacea, trifida: lacinia interiore tenuiffima, cylindrica, obrufa, intermedia maiore, rotundata, fornicata, apice bifida, exteriore breuiore, tenuiore, cornea, unguiformi.

*Maxilla* quarta fubmembranacea, bifida: lacinia interiore apice dilatata, fornicata, truncata, ciliata, exteriore longiore, ad bafin latiore, fornicata, medio fubgeniculata, apice anguftiore, elongata, reflexa, fubulata.

*Labium* mandibulis arcte appreffum, rotundatum, integerrimum in finu mandibulae inferiore infertum.

*Mandibula* offea, utrinque finuata: finu fuperiori palpigero, finu inferiori labiigero, apice dilatata, fornicata angulo acuto.

*Palpus* brevis, triarticulatus in mandibulae apice fornicato recondendus.

*Antennae* quatuor fubaequales: interiores palpiformes, quadriarticulatae: articulo primo maiori, gibbo, fecundo tertioque tenuioribus, longioribus, cylindricis, ultimo breui, bifido, exteriore fetaceae: articulo primo maiori, ovato, in cantho fub oculis infertae.

---



---

## OCYPODE.

Os mandibulis, palpis maxillaque quadruplici.

*Maxilla* exterior cornea, os obtegens bifida: lacinia inferiore maiore, plana, oblongo ovata, pone medium geniculata, apice palpigera.

*Palpus* corneus, compressus, triarticulatus: articulo primo secundoque brevioribus obconicis, tertio unguiformi, arcuato, acutissimo, intus dentato.

*Lacinia* exteriore triplo brevior, fetacea, tenuissima, rigida, acutissima.

*Palpi* intermaxillares porrecti, subcornei, bifidi: lacinia inferiore latiore, quadriarticulata; articulo primo brevissimo, secundo longissimo depresso, intus subdilato ciliato, tertio ovato, incuruo, ultimo rotundato, ciliato, lacinia exteriore multo longiore, membranacea: articulo primo longissimo attenuato, subarcuato, bifido; pinna exteriore subulata, acuta, brevis, interiore paullo longiore, fetacea, multiarticulata.

*Maxilla* secunda bifida: lacinia inferiore brevissima, rotundata, cornea, ciliata, exteriore membranacea longiore, incurva, fornicata, apice truncata, ciliata, basi exteriori palpigera.

*Palpus* maxillae basin adhaerens, paullo longior: articulo primo longissimo, membranaceo, secundo bifido: laciniis brevibus, aequali-

bus; exteriore crassiore, obtusiore, interiore multiarticulata, subulata.

*Maxilla* tertia trifida: lacinia interiore membranacea, dilatata, fornicata, bifida; plina interiore rotundata, exteriore longiore, apice dilatata, truncata, lacinia intermedia brevior, unguiformi; cornea, arcuata, acuta, lacinia exteriore brevis, membranacea, rotundata.

*Maxilla* quarta mandibularum basin tegens bifida: lacinia interiore fornicata, apice dilatata, oblique truncata, ciliata, exteriore extus rotundata, in medio coarctata, apice late emarginata.

*Labium* breve membranaceum mandibulis arcte adhaerens.

*Mandibula* ossea, utrinque sinuata, apice fornicata, rotundata, palpigera.

*Palpus* in sinu interiore insertus, compressus, triarticulatus: articulis subaequalibus, ultimo rotundato.

*Antennae* duae brevissimae, setaceae, in cantho oculorum interiore insertae, articulo primo secundoque crassioribus, longioribus, ovatis, reliquis numerosis, setaceis, brevissimis.

## LEUCOSIA.

Os mandibulis, palpis maxillaque triplici.

*Maxilla* exterior ossea, bifida: lacinia interiore lanceolata, ultra medium geniculata, apice oblongo triangulari, ante apicem palpigera;

margine interiore canaliculato ad receptionem palpi.

*Palpus* tenuis, corneus, fetaceus, quinque articulatus in canali marginis recondendus: articulo primo globoso, crassiore, reliquis brevibus, subaequalibus.

*Lacinia* exteriore minore lineari lanceolata ad basin geniculata, apice obtusa, ciliata.

*Palpi* intermaxillares porrecti, bifidi: lacinia interiore cornea, latiore, depressa, incurva fere securiformi, quinquearticulata: articulo primo brevissimo, transverso, secundo longissimo, tertio obouato, incuruo, quarto quadrato, quinto rotundato, ciliato, exteriore membranacea subflagelliformi: articulo primo longissimo, depresso, lineari lanceolata, secundo ouato, incuruo, reliquis numerosis, decrefcentibus, vix conspicuis.

*Maxilla* secunda trifida: lacinia interiore minuta, ouata, transversa, parum ciliata, intermedia multo maiore, cornea, dilatata, subfornicata, ouatotriquetra, ciliata, exteriore duplo longiore, depressa, cuneata, apice rotundata.

*Palpus* maxillae secundae basi exteriori adhaerens subflagelliformis: articulo primo minuto, secundo longissimo, lineari, reliquis numerosis, vix conspicuis.

*Maxilla* tertia mandibulis adhaerens, trifida: laciniiis lateralibus aequalibus, longioribus, basi cylindricis, apice dilatatis, rotundatis, in-



termedia breuiore unguiformi cornea, arcuata, acuta.

*Labium* breue membranaceum, mandibularum basin tegens.

*Mandibula* ossea, utrinque sinuata, apice dilatata, fornicata, intus palpigera denteque medio acuto.

*Palpus* compressus, brevis, obtusus, intra mandibulam fornicatam recondendus articulis tribus subaequalibus.

*Antennae* duae palpiformes in foueolis sub fronte prominente recondendae, quadriarticulatae: articulis cylindricis, subaequalibus, ultimo arcuato, acuto, corneo, fetis opposito.

*Not.* Leucosiae chelis ouatis e. g. globosa os gerunt latius, maxillae exterioris laciniam anteriorem interiori multo maiorem, omnes oris partes internas magis ciliatas, maxillae secundae lacinias exteriores longiores, haud cuneatas, sed lineari lanceolatas, flexuosas, membranaceas, striatas, quarum margini exteriori sub medio insidet palpus lacinia triplo breuior. Forte proprii generis.

## PARTHENOPE.

Os mandibulis, palpis maxillaque quadruplici.

*Maxilla* exterior os obtegens, ossea, bifida: lacinia inferiore maiore, intus fornicata, ante apicem geniculata, margine externo canaliculata, basi rhomboideooblonga, extus ca-

naliculata: margine interiore tenuiore, crenato, apice latiore subquadrata, angulo apicis exteriori dilatato, rotundato, crenato, angulo apicis interiore emarginato, palpigero, margine infimo canaliculato ad receptionem palpi; canalis margine interno ciliato,

*Palpus* osseus, triarticulatus: articulo primo breui, secundo maiore, obconico, tertio longiore subarcuato, acuto ciliato.

*Lacinia* exteriori minore, lineari triquetra, ossea ad basin obsolete geniculata denteque prominente triangulari ante apicem marginis interioris, apice palpigera.

*Palpus* flagelliformis, membranaceus, setaceus, inflexus, tenuissimus, multiarticulatus: articulo primo maiore, reliquis decrescens, vix conspicuis.

*Palpi* intermaxillares porrecti, bifidi: lacinia interiori cornea, subcompressa, quinquearticulata: articulo primo breui, compresso, secundo longissimo, tertio obouato, incuruo, quarto transuerso, apice ciliato, quinto rotundato, ciliato, exteriori flagelliformi submembranacea: articulo primo longissimo, secundo ouato, reliquis numerosis, decrescens, vix conspicuis.

*Maxilla* secunda trifida: lacinia interiori cornea, breui, ouata, ciliata ad basin incisa, media multo maiore, dilatata, cornea, fornicata, ciliata serieque setarum extus ante marginem

interiorem, exteriore membranacea, longissima, depressa, versus apicem dilatata, triangulari: margine supero et interiori ciliatis, basi exteriori palpigera.

*Palpus* membranaceus, flagelliformis: articulo primo longissimo, lineari, secundo ouato, incuruo, reliquis numerosis, decrefcentibus, vix conspicuis maxillaè dorso adhaerens.

*Maxilla* tertia quadrifida: lacinia interiore ouata, minuta, ciliata, secunda longiori, cornea, unguiformi, arcuata, acuta, tertia multo longiore, plana, extrorsum latiore, apice truncata, ciliata, exteriore minuta, obsoleta, obovata.

*Maxilla* quarta subcornea, trifida: lacinia interiore angusta, plana, incurua: margine exteriore ciliato, intermedia maiore, subfornicata, extrorsum latiore, apice oblique truncata, ciliata, exteriore breuissima, ouata, ciliata.

*Labium* breue, membranaceum, mandibulis arte adhaerens.

*Mandibula* ossea utrinque sinuata, apice dilatata, fornicata intus palpigera.

*Palpus* compressus, ciliatus, quadriarticulatus: articulo ultimo longiore, arcuato.

*Antennae* quatuor subaequales.

*exteriores* setaceae in cantho sub oculis insertae: articulo primo breuissimo; rotundata, se-

cundo tertioque maioribus obconicis, reliquis brevissimis, numerosis, setaceis.

*interiores* palpiformes, complicatae, in fouca rostri lateris inferioris latentes, quadriarticulatae: articulo primo ovato, breui, secundo tertioque longioribus, cylindricis, quarto breviori bifido; lacinia interiore breui, multiarticulata, exterior bifida: pinnis acutis.

## INACHUS.

Os mandibulis, palpibus maxillaque triplici.

*Maxilla* exterior ossæ, os obtegens, bifida: lacinia interiore maiore intus subfornicata, versus apicem geniculata sutura obliqua subflexuosa, basæos margine intimo tenuiore, unifulcato intus crenato, extus ciliato, apicis angulo exteriori acuminato, interiore palpifero: margine late canaliculato ad receptionem palpi.

*Palpus* in canali marginali recondendus, setaceus, brevis, quadriarticulatus: articulo primo maiore, transverso, secundo ovato, tertio conico, quarto subulato, minimo, acuto.

*Lacinia* exteriori minore, lanceolata, acuta, triquetra, apice palpifera.

*Palpus* flagelliformis, setaceus, submembranaceus, styli parum brevior: articulo primo longiore, compresso, reliquis decretescentibus, vix conspicuis.

*Palpi* intermaxillares porrecti, bifidi: lacinia interiore cornea, subcompressa, quinquearticu-

lata: articulo primo breui, transuerso, secundo longissimo, tertio obouato, incuruo, quarto transuerso, apice ciliato, quinto rotundato, ciliato; exteriore submembranacea, flagelliformi: articulo primo longissimo, compresso, intus ciliato, versus apicem attenuato, secundo ouato, incuruo, reliquis numerosis, decrefcentibus, vix conspicuis.

*Maxilla* secunda trifida: lacinia interiore minima, ouata, ciliata, intermedia multo maiore, cornea, apice dilatata, subfornicata, ciliata serieque setarum in latere exteriore ad marginem internum, exteriore multo longiore, membranacea, basi cylindrica, medio coarctata, apice dilatata, triangulari, ciliata.

*Palpus* basin exteriorem maxillae secundae adhaerens membranaceus, flagelliformis: articulo primo longissimo, depresso, utrinque membrana, ciliata, versus apicem decrefcente aucto, secundo ouato, incuruo, reliquis numerosis, decrefcentibus, vix conspicuis.

*Maxilla* tertia trifida: lacinia interiore elongata, basi cylindrica, apice rotundata, fissa, intermedia breuiore, cornea, unguiformi, arcuata, acuta, exteriore extrorsum dilatata, oblique truncata, ciliata.

*Labium* breue, membranaceum mandibulis arcte adhaerens.

*Mandibula* ossea utrinque sinuata, apice dilatata, fornicata, intus palpigera denteque medio porrecto acuto.

*Palpus* compressus infra mandibulae dentem insertus, quadriarticulatus: articulis tribus subaequalibus, ultimo longiore obtuso.

*Antennae* quatuor aequales.

*exteriores* setaceae intra rostri denticulum insertae: articulo primo longiore, ovato, secundo minore, obconico reliquis numerosis, brevissimis, vix conspicuis.

*interiores* palpiformes in fovea lateris inferioris rostri recondendae, compressae, triarticulatae: articulo primo crassiore, ovato, incurvo, secundo brevior, ultimo chelato; pollice arcuato, unguiculato, digito setaceo, quinquearticulato.

## DROMIA.

Os palpis maxillaque quadruplici absque labio.

*Maxilla exterior* bifida:

*Lacinia interior* maiore, fornicata, medio geniculata: parte inferiori longiori, angustiori interne acute denticulata, superiori apice interno emarginato ad insertionem palpi.

*Palpus* corneus elongatus, hirtus, triarticulatus: articulo primo et secundo ovatis, tertio arcuato, unguiformi, ciliato, subulato, acutissimo.

*Lacinia exterior* flagelliformi stylo sublineari ad basin obsolete geniculato, apice palpigero.

*Palpus* elongatus, setaceus, membranaceus: articulo primo longiore, crassiore, inflexo, reliquis brevissimis, numerosis, decreescentibus.

*Palpi* intermaxillares duo porrecti, submembranacei, bifidi.

*Lacinia* interiore quinque articulata: articulo primo brevi, transverso, secundo longissimo, depresso, intus ciliata, tertio incuruo, quarto et quinto rotundatis: ciliatis.

*Lacinia* exteriori flagelliformi: articulo primo longissimo, secundo incuruo, reliquis numerosis, decreescentibus.

*Maxilla secunda* submembranacea, trifida: lacinia interiore brevi ovata, hirta, intermedia multo longiore, dilatata, fornicata, ciliata, exteriori adhuc longiore, compressa apice cylindrica, concaua, palpum vaginante.

*Palpus* basia exteriori adhaerens, flagelliformis: articulo primo longissimo, secundo incuruo, reliquis numerosis decreescentibus, ciliatis.

*Maxilla* tertia membranacea, trifida: lacinia interiore fornicata, bifida; pinna interiore rotundata, ciliata, exteriori sabulata, acutissima, intermedia dilatato clavata, ciliata, fissata, exteriori fornicata apice unguiculata, acutissima.

*Maxilla* quarta membranacea, trifida: lacinia interiore annulata, fornicata, apice inaequa-

li, rotundata, ciliata, intermedia paullo maiore, apice dilatata, oblique truncata, ciliata, exteriori basi fornicata, in medio geniculata, apice tenuiore, compressa, flexuosa, ciliata.

*Labium* membranaceum, breue, mandibularum basin tegens, ovatum, ciliatum.

*Mandibula* ossea, utrinque sinuata, apice dilatata, fornicata, intus palpigera.

*Palpus* in sinu mandibulae insertus, triarticulatus: articulo primo breuissimo, secundo incuruo, tertio compresso, ciliato.

*Antennae* quatuor inaequales.

*exteriores* longiores, setaceae, sub oculis insertae: articulo primo breuissimo, secundo tertioque longioribus, compressis, hirtis reliquis breuissimis, numerosis.

*interiores* palpiformes quadriarticulatae: articulo primo crassiore, ovato, hirta, angulato, interne canaliculato ad receptionem reliquorum, secundo et tertio cylindricis, ultimo bifido: lacinia interiore recta, subulata, multiarticulata, exteriori bifida; pinna exteriori crassiore, incurua, interiore breui, subulata.

## DORIPPE.

Os palpis, mandibula maxillaque triplici.

*Maxilla* exterior ossea, bifida: lacinia exteriori minore, angusta, acuta, mutica, interiore maiore, subfornicata, in medio geniculata,



intus ultra medium subdentata, apice palpi-  
gera, canaliculata ad receptionem palpi.

*Palpus* triarticulatus: articulo primo incuruo, se-  
cundo cylindrico, tertio unguiformi, incur-  
uo, acuto, piloso.

*Palpi* intermaxillares porrecti, membranacei, bis-  
fidi: lacinia interiore articulis quinque: pri-  
mo breui, transuerso, secundo longissimo,  
depresso, intus ciliato, tertio incuruo, quar-  
to et quinto rotundatis, ciliatis, exteriore  
flagelliformi: articulo primo longissimo, se-  
cundo incuruo, reliquis breuibus, numero-  
sis, decrefcentibus.

*Maxilla* secunda cornea, trifida: lacinia interio-  
ri breui, rotundata, ciliata, intermedia paul-  
lo longiore rotundata, fornicata, ciliata, ex-  
teriore elongata, basi cornea, depressa, fle-  
xa, extus palpigera, apice ossea, plana, co-  
nica, acuta inter antennis adscendente.

*Palpus* basin dorsi adhaerens, flagelliformis, mem-  
branaceus: articulo primo longissimo, secun-  
do incuruo, reliquis breuibus, numerosis,  
decrefcentibus.

*Maxilla* tertia trifida: lacinia exteriori fornicata,  
apice dilatata, ciliata, intermedia breuiore,  
unguiformi, cornea, arcuata, acuta.

*Labium* mandibulis arte adhaerens, membra-  
nceum.

*Mandibula* ossea breuis utrinque sinuata, apice di-  
latata, fornicata, palpigera.

*Palpus* in sinu mandibulae insertus, brevis; compressus, triarticulatus: articulis aequalibus ciliatis.

*Antennae* quatuor aequales.

*exterior*es adnaeae margini superiori foveae, cui antennae interiores insertae sunt, setaceae, pilosae, acutae: articulo primo brevissimo, orbiculato, secundo tertioque longioribus, crassioribus, cylindricis, reliquis brevissimis, numerosis.

*interiores* palpiformes in fovea sub exterioribus insertae: articulis quatuor; primo globoso, secundo tertioque cylindricis longioribus, quarto breviori bifido: lacinia superiore incurva, subulata.

## ORITHYIA.

Os mandibulis, palpis maxillaque triplici.

*Maxilla* exterior ossea, bifida: lacinia interiore oblonga, plana, ciliata, extus obsolete canaliculata, intus subexcavata, in medio geniculata, apice palpigera.

*Palpus* compressus, osseus, setaceus, parum ciliatus, triarticulatus: articulo primo brevi, secundo longiore, tertio adhuc longiore, arcuato, acuto.

*Lacinia* exterior lanceolata, acuta, mutica.

*Instrumenta* cibaria reliqua haud rite examinata.

*Antennae* quatuor inaequales.

*exterior*es brevissimae, setaceae in cantho interiori oculi insertae: articulo primo longissi-

mo, cylindrico, reliquis innumeris, brevissimis.

*interiores* duplo fere longiores, palpiformes; quadriarticulatae: articulo brevi, ovato, secundo tertioque longioribus, cylindricis, quarto brevissimo subulato, bifido: lacinia interiore brevior.

## PORTUNUS.

Os mandibulis, palpis maxillaque triplici.

*Maxilla* exterior ossea, os obtegens, bifida: lacinia interiore maiore, plana, pone medium geniculata, margine interno ciliato basi extus unifulcata, apice rotundata, sinuata, palpigera.

*Palpus* osseus laciniae apici interno adnatus, quadriarticulatus: articulo primo latiore, secundo brevissimo, obsoleto, tertio cylindrico, quarto tenuiore, arcuato, denticulato, acuto.

*Lacinia* exterior flagelliformi: stylo oblongo lineari ad basin obsolete geniculato, margine interno canaliculato, apice obtuso, palpigero.

*Palpus* membranaceus, incurvus, setaceus, multiarticulatus, articulo primo crassiore longiore, inflexo, reliquis numerosis, brevibus, vix conspicuis, decrefcentibus.

*Palpi* intermaxillares duo porrecti, bifidi: lacinia interiore cornea, compressa, quinquearticulata: articulo primo brevissimo, secundo

longissimo, tertio incuruo, quarto latere superiore dilatato, ciliato, quinto rotundato, ciliato, exteriori flagelliformi, submembranacea: articulo primo longissimo, secundo ovato incuruo, reliquis numerosis, decrescentibus, ciliatis.

*Maxilla* secunda trifida: lacinia interiori breui, cornea, ovata, ciliata, ad basin incisa, media multa maiore, dilatata, cornea, subfornicata, ciliata serieque setarum ad marginem interioriorem, exteriori longissima, membranacea, basi cylindrica, apice intus dilatata, ciliata.

*Palpus* basin exterioriorem adhaerens longior, membranaceus, flagelliformis: articulo primo longissimo, lineari, secundo incuruo, ovato, reliquis numerosis decrescentibus, vix conspicuis, ciliatis.

*Maxilla* tertia mandibularum basin tegens membranacea quadrifida; lacinia interiori fornicata, apice dilatata, rotundata, fissa, parum ciliata, lacinia secunda breuiori unguiformi, cornea, arcuata, acuta, lacinia tertia multo longiore fornicata, versus apicem oblique truncata, ciliata, dilatata, lacinia exteriori basi ovata, apice cylindrica.

*Labium* mandibulis arcte adhaerens, membranaceum.

*Mandibula* ossea, utrinque sinuata, apice dilatato fornicata, intus palpigera.

*Palpus* compressus, ciliatus, quadriarticulatus: articulis breuibus, ouatis; ultimo longiore, incuruo.

*Antennae* quatuor inaequales: exteriores longiores setaceae sub frontis margine prominente in foveola propria inter oculos et antennas interiores insertae: articulo primo secundoque crassioribus, ouatis, reliquis numerosis, breuissimis. Interiores breuiores palpiformes, quadriarticulatae: articulo primo rotundato secundo tertioque longioribus cylindricis, ultimo breui, bifido: lacinia exterior longiore, acuta, basi geniculata.

## M A T U T A.

Os mandibulis, palpis maxillaque triplici.

*Maxilla* exterior ossea arctissime os claudens, plana, bifida: lacinia interiore maiore, ouato lanceolata, ultra medium geniculata; sutura transversa, recta, apice margine interno crassiore canaliculato ad receptionem palpi, ante apicem palpigera.

*Palpus* interne sub apice maxillae insertus et in canali marginis recondendus, compressus, supra hirtus, triarticulatus: articulo primo longiori, cylindrico, incuruo, reliquis aequalibus, obtusis, compressis.

*Lacinia* exterior multo breuiore subulata: margine interiore subrecto, canaliculato, exterior arcuato, subciliato tenuiore, apice setigera.

*Palpi* intermaxillares porrecti bifidi: lacinia interiore securiformi, latiore, compressa, cornea, quinquearticulata: articulo primo transverso, brevis, interne ciliato, secundo longissimo, interne ciliato, tertio brevior, obouato, incuruo, quarto quadrato, utrinque ciliato, quinto minore rotundato, ciliato, exterior longior: articulo primo longissimo, depresso, lineari lanceolato, a basi ad medium marginis exterioris oblique corneo, deinde membranaceo, secundo inflexo, tertio tenuiore, flexili, setaceo, setae breviori opposito.

*Maxilla* secunda trifida: lacinia interiore minuta, ouata, ciliata, intermedia multo maiore, cornea, fornicato dilatata, ciliata, serieque setarum ad marginem internum lateris exterioris, exterior elongata, plana, ouata, cornea, canaliculata, apice membranacea, foliacea, oblonga, obtusa, ciliata, in medio geniculata, striata.

*Maxilla* tertia mandibularum basin tegens, bifida: lacinia interiore trifida; pinna interiore rotundato-ouata, brevis, intermedia maiore, cylindrica, apice dilatata, rotundata, ciliata, exterior cornea, arcuata, acuta, unguiformi, exterior quadrifida: pinna interiori brevis, subulata, secunda longior, dilatata, fornicata, apice fissâ, reliquis duabus subaequalibus subulatis.

*Labium* mandibulis arcte adhaerens, membranaceum.

*Mandibula* ossea utrinque sinuata, apice dilatata, fornicata, intus palpigera denteque medio, acuto.

*Palpus* in fossula media marginis interioris mandibulae insertus, triarticulatus: articulo primo breuiore, secundo cylindrico, tertio ouato, obtuso.

*Antennae* duae breues, palpiformes, in cantho oculorum recondendae, quadriarticulatae: articulo primo globoso, secundo cylindrico, incuruo, tertio cylindrico, incuruo, tenuiore, quarto breuiore, incuruo subulato, bifido: lacinia exterior breuiore.

## H I P P A.

Os mandibulis, palpis maxillaque triplici.

*Maxilla* exterior ossea os et antennas conuolutas obtegens, ouatalata, fornicata, apice emarginata, palpigera, costa eleuata in latere concauo interno a basi ad apicem marginis interioris ducta.

*Palpus* longitudine labii, triarticulatus: articulo primo breuiore, subquadrato, ciliato, secundo tertioque aequalibus, ciliatis, obtusis, linearibus, parum arcuatis, in emarginatura labii insertus.

*Palpi* intermaxillares porrecti, bifidi: lacinia interiore flagelliformi, multiarticulata: articulo primo breuissimo, obsoleto, secundo lon-

giffimo, lineari, arcuato, utrinque pilis longioribus ciliato, tertio obouato, inflexo, reliquis numerosis, breuiffimis, decrefcen- tibus, lacinia exteriore plana, membrana- cea, multo breuiore, triarticulata: articu- lis fere aequalibus, primo verfus bafin latio- re, fecundo lineari, anguftiore, tertio oua- to ciliato.

*Maxilla* fecunda fubcornea, bifida: lacinia inte- riore breuiore fornicata: margine interne ferrato apice acuto, exteriore longiore, infle- xa, plana, dorfo ciliata, medio geniculata, bafi angufta, lineari, apice latiore, oua- ta, elongata, fubulata.

*Maxilla* tertia fubcornea trifida: lacinia interiore fornicata, lata, breuiore, apice introrfum oblique truncata, ciliata, lacinia interme- dia longiore, anguftiore, apice rotundata, integra, exteriore breuiffima, apice fubulata.

*Labium* mandibulis arête adhaerens, membrana- ceum.

*Mandibula* breuis, cornea, fornicata, obtufa, dor- fo palpigera.

*Palpus* fetaceus, tenuis, uti videtur multiarticu- latus.

*Antennae* quatuor pedunculatae, inaequales.

*interiores* fuperne inter oculorum pedunculos infertae, triplo breuiores, bifidae: laciniis aequalibus, compressis, fetaceis, multiar- ticulatis, utrinque ciliatis.



*Pedunculus triarticulatus*: articulo primo minuto, secundo multo maiore cordato; apice externo elongato, setigero: seta longiore subulata, apice altero breuiore, antennifero, tertio minuto in apice interno breuiore articuli secundi posito.

*exteriores* sub oculis ad latera frontis insertae, longiores, crassae, filiformes, conuolutae sub maxilla exteriori recondendae, extrorsum bifarie longius ciliatae.

*Petiolus quadriarticulatus*: articulis inaequalibus; primo reliquis breuiore, crassiore, secundo longiore, apice exteriori dilatato, tridentato: dente intermedio longiore, tertio ouato, articulo secundo sub apice marginis interioris adhaerente, margineque exteriori iuciso, quarto reliquis multo tenuiore, obconico: margine exteriori carinato, ciliato.

## SYMETHIS.

**Os** mandibulis, palpis maxillaque triplici.

*Maxilla* exterior ossea, os arctissime claudens, bifida: lacinia interiori maiore, subfornicata, versus apicem latiore, supra medium geniculata, sutura transuersa subundulata, apice emarginata ad insertionem palpi.

*Palpus* minutus in emarginatura laciniae insertus videtur, mihi haud rite obseruatus.

*Lacinia* exteriori breuiore, oblonga margine interiori crassiore, ciliato.

*Palpi* intermaxillares, porrecti, bifidi: lacinia interiore sublecuriformi, crassiore, cornea, quinquearticulata: articulo primo breui, transverso, secundo longissimo intus ciliatis, tertio breui, obouato, incuruo, quarto quadrato, superne ciliato, quinto orbiculato, ciliato, lacinia exteriori longiore, membranacea, depressa, parum arcuata, inarticulata, pennacea siue utrinque longius ciliata, obtusa.

*Maxilla* secunda trifida: lacinia interiore latiore, lanceolata, acuta: margine interno, ciliato, ad basin ciliato, intermedia cornea longiore, unguiformi, acutissima, exteriori longissima, membranacea, compressa, inflexa, apice acuta.

*Maxilla* tertia minore, mandibularum basin tegens, subcornea, trifida: lacinia interiori breui ad basin longius ciliata, tenui, acuta, intermedia longiore, versus apicem dilatata, fornicata, apice oblique truncata, ciliata, exteriori breui, plana, acuta.

*Labium* mandibulis arcte adhaerens, membranaceum, rotundatum.

*Mandibula* ossea, flexa, utrinque ciliata, inferne dente maiori, acuto, apice dilatata, fornicata, palpigera denteque medio acuto.

*Palpus* in sinu superiori ante apicem mandibulae insertus, brevis, compressus: articulis quatuor, ultimo rotundato.

*Antennae* duae brevissimae sub rostro intra valvulas duas rostri longitudine bifidas, arctissime claudendas reconditae, quadriarticulatae: articulo primo brevissimo, secundo crassiori, ovato tertio cylindrico piloso, quarto plano, quadridentato, reflexo.

## LIMULUS.

Os mandibulis, palpis maxillaque quintuplici.

*Maxilla* exterior brevissima, oblonga, integra, intus ciliata, haud palpigera.

*Maxillae* quatuor reliquae maiores, ovatae, spinosae, integrae dorso palpigerae.

*Palpi* utrinque quatuor.

*exteriores* tres aequales, quadriarticulati: articulo primo brevi, secundo ovato, tertio apice indurto, quarto chela elongata, filiformi, edentula, adhaerentes maxillarum dorso.

*interior* longitudine ferè aequalis, quadriarticulatus: articulo primo brevi, secundo maiori ovato, tertio maris incrassato, quarto subulato adnatus maxillae interioris dorso.

*Labium* breve, membranaceum, rotundatum, integrum mandibulis arcte adhaerens.

*Mandibula* magna porrecta, in medio geniculata, chela elongata, filiformi, edentula.

*Antennae* nullae.

Character hic naturalis adhuc claudicat,

+ **CANCER.** *Antennae* quatuor subaequales.

*interiores* complicatae, appropinquatae in foueola sub capitis margine absconditae.

*exteriores* setaceae sub margine frontis prominente insertae.

\* *Corpore gibbo: lateribus inaequalibus.*

*Pagurus.* 1. C. thorace laeviusculo utrinque nouemplicato, manibus apice atris. Ent. syst. 2. 452. 49. Linn. syst. Nat. 2. 1044. 27. Fn. Su. 2028. Mus. Ad. Fr. 1. 85.

Penn. Zool. Brit. 4. tab. 3. fig. 7.

Bradl. natur. tab. 3. fig. 4.

Rumph. Mus. tab. 11. fig. 4.

Gronov. Zooph. 967.

Habitat in Oceano Europaeo et Indico.

*identatus.* 2. C. thorace sublaevi utrinque undecim dentato: dentibus crenulatis, rostro tridentato, digitis apice atris. Ent. syst. 2. 453. 51. \*

*Cancer undecimdentatus* Herblt. Cancr. 181. 73. tab. 10. fig. 60.

Habitat in America boreali.

*Maenas.* 3. C. thorace laeviusculo utrinque quinquedentato, fronte triloba, carpis unidentatis. Ent.

fyft. 2. 450. 41. Linn. fyft. Nat. 2. 1043. 22.

Muf. Lud. Ulr. 436. Fn. Su. 2026.

Petiv. Amb. tab. 1. fig. 5.

Bast. fubf. 2. 19. tab. 2.

Rumph. Muf. tab. 6. fig. O.

Penn. Zool. Brit. 4. tab. 2. fig. 5.

Habitat in Oceano Europae, Asiae.

4. *C. thorace laeuiufculo utrinque quinquedentato*, *tinctor.*  
fronte fiffa.

Habitat — — —

Statura *C. Maenas* at paullo minor. Frons transuerfa, in medio fiffa. Orbita oculorum tridentata. Thorax laeuiufculus lateribus utrinque quinquedentato. Chelae breues, carpi unidentati, manus breues, apice inferiori nigrae digitis longioribus atris.

5. *C. thorace laeuiufculo utrinque quadridentato*, *piclor.*  
fronte fiffa.

Habitat — — —

Affinis praecedenti at paullo minor et diftinctus. Frons magis rotundata, apice fiffa. Orbita oculorum eleuata, inermis. Thorax breuiufculus, utrinque quadridentatus. Chelae breues. Carpi fubbidentati. Manus breues margine eleuato. Digiti breues, fufci. Pedes breues, compressi margine dorsali carinato.

6. *C. thorace rugofiffimo obtuso utrinque quadri-* *aeneus.*  
lobo. Ent. Syft. 2. 455. 56. Linn. fyft. Nat.  
2. 1048. 54. Muf. Lud. Ulr. 451.

Seb. Muf. 3. tab. 19. fig. 17.

Rumph. Amboin. tab. 11. fig. 4.

Habitat in India.

- Rumphii.* 7. C. thorace laeviusculo utrinque quinquedentato, fronte tuberculata quadridentata, chelis laevibus.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

C. Maenas paullo minor. Frons supra tuberculis aliquot eleuatis, obtusis adspersa margine quadridentato: dentibus lateralibus minoribus. Orbita oculorum quadridentata. Thorax utrinque quinquedentatus. Chelae breues, crassae, inermes. Carpi vix unidentati. Manus breues laeues digitis breuibus, atris. Pedes apice pilosi.

- scaber.* 8. C. thorace laeviusculo utrinque quinquedentato, fronte crenata fissa, manibus granulatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Paruus. Frons transuersa, crenata, in medio fissa. Thorax laeviusculus, antice granulatus lateribus utrinque quinquedentatis. Oculorum orbita crenata, subtus bidentata. Chelae inaequales altera semper maiore, mox dextra, mox sinistra absque discrimine sexus, breues carpi manibusque granulatis. Digiti breues, nigri.

- paruulus.* 9. C. thorace riuuloso utrinque quadridentato, fronte subfissa. Ent. syst. 2. 451. 43.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dr. Pflug.

Minutus. Frons transuersa fissura parua incisiva. Thorax antice lateribusque riuulosus

utrinque quadridentatus. Chelae breues laeues digitis breuibus, atris.

10. C. thorace inaequali utrinque acute sexdenta *Gonagra*.  
to, manibus nodulosis. Ent. syst. 2. 466.

94. \*.

Habitat in Iamaica Mus. Dom. Banks.

11. C. thorace undique noduloso crenato, pedum *nodulosus*.  
digito spinoso Ent. syst. 2. 466. 95. \*

Habitat — — Mus. Dom. Banks.

Huius generis videtur.

12. C. thorace laeui utrinque quadrituberculato, *ochtodes*.  
fronte deflexa canaliculata, manibus tuberculatis. Ent. syst. 2. 455. 58.

Herbst. Cancr. 138. 66. tab. 8. fig. 54.

Habitat in India orientali.

Frons deflexa, in medio valde canaliculata, vix fissa, utrinque rotundata. Orbita oculorum vix eleuata, integra. Thoracis latera tuberculis quatuor eleuatis, obtusis. Chelae tuberculatae. Digiti concolores.

In iunioribus thoracis tubercula acutiora et manuum planiora.

13. C. thorace laeui utrinque bispinoso, fronte *2spinosus*.  
quadridentata, carpis spinosis. Ent. syst. 2.  
446. 27.

Herbst. Cancr. 144. 52. tab. 6. fig. 45.

Habitat in India orientali.

Femora dorso ferrata. Manus breues, crassae digitis breuibus, concoloribus.

14. C. thorace laeui unidentato, fronte triloba. *corallinus*.  
Ent. syst. 2. 445. 23.

Herbst. Cancr. 33. 41. tab. 5. fig. 40.

Seb. Mus. 3. tab. 19. fig. 2. 3.

Rumph. Mus. tab. 8. fig. 5.

Habitat in Indiae aquis.

*floridus.* 15. C. thorace laevi inaequali maculato: margine obtuse ferrato, manibus cristatis. Ent. syst. 2. 445. 24. Linn. syst. Nat. 2. 1041. 12: Amoen. acad. 6. 414. 98.

Herbst. Cancr. 132. 40. tab. 3. fig. 39.

Knorr. Delic. tab. 4. fig. 3.

Seb. Mus. 3. tab. 19. fig. 18.

Habitat in Indiae aquis.

Huius generis videtur mihi haud rite notus.

*maculatus.* 16. C. thorace laevi: maculis sanguineis rotundis, lateribus unidentatis, fronte triloba. Ent. syst. 2. 447. 29. Linn. syst. Nat. 2. 1042. 18. Mus. Lud. Ulr. 433.

Petiv. Amb. tab. 1. fig. 8.

Seb. Mus. 3. tab. 19. fig. 12.

Rumph. Mus. tab. 10. fig. 1.

Habitat in mari Asiatico.

*vespertilio.* 17. C. thorace antice utrinque tridentato, corpore hirsuto Ent. syst. 2. 463. 35. \*

Habitat in Indiis Mus. Dom. Spengler.

Corpus paruum supra pilis densis undique tectum, subtus laeve, albidum. Thorax utrinque dentibus tribus at inter pilos vix conspicuis. Pedes et chelae hirti manuum digitis laevis.

*variolosus.* 18. C. thorace tuberculato utrinque crenato, fronte fissa.

Habitat in Oceano Mus. Dom. Meyer.



Tabercula magnitudine pifi minoris, glabra laenia, nitida. Margo utrinque crenatus. Chelae intus glabrae, fubeoncauae. Pedes breues, compressi margine fuperiorif ciliato dentato, apice pilofa fpinofa. Statura C. corallini.

19. C. thorace utrinque bidentato, tarfis hirtis. *fetofus*.  
Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Corpus paruum, laenifculum margine utrinque acuto, bidentato. Orbita oculorum haud eleuata. Chelae breues, inermes, pilofae. Pedum tarfi hirti.

20. C. thorace laeui utrinque quinque dentato: *fpinifrons*,  
dente fecundo tertioque bifidis, fronte manibusque multi fpinofis.

*Cancer fpinifrons* Ent. fyft. 2. 455. 55.\*

Herbft. Cancr. tab. 9. fig. 58.

Habitat in Oceano Muf. Dom. Lund.

\*\* *Obcordati corpore gibbo: lateribus laeuius antice tantum carinatis.*

21. C. tarfis fasciculato pilofis, digitis bifarie ferruricola.  
ratis. Ent. fyft. 2. 440. 7. Linn. fyft. Nat. 2.  
2040. 11.

Degeer Inf. 7. 417. 1. tab. 25. fig. 1.

Herbft. Cancr. 2. 119. 37, tab. 3. fig. 36. tab.  
4. fig. 37.

Sloan. Iamaic. 1. tab. 2.

Seb. Muf. 3. tab. 20. fig. 5.

Catesb. Carol. 2. tab. 32.

Habitat in Carolina.

*senex.*

22. *C. thorace* plica antica, carpis unispinosis digitis ferratis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Minor. *C. ruricola* et omnino distinctus. Thorax laevis plica unica transuersa ante oculos. Chelae breues carpis spina sesquialtera, valida, acuta digitis elongatis. Pedes laeues digitis ferratis.

Variat corpore unicolore et variegato at vix distincti.

*tridens.*

23. *C. thorace* laeui antice utrinque tridentato, fronte transuersa integra.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus paruum, glabrum ante oculos utrinque dentibus tribus acutis. Frons integerima. Carpi unidentati manibus laeuis. Pedes laeues digitis ferratis.

*vocans.*

24. *C. thorace* laeui utrinque unidentato, oculis approximatis unidentatis. Ent. syst. 2. 446. 25. Linn. syst. Nat. 2. 1041. 14. Amoen. acad. 6. 414. 96.

Degeer Inf. 7. 430. 4. tab. 26. fig. 12.

Rumph. Mus. tab. 10. fig. 1.

Herbst. Caner. 1. 81. 4. tab. 1. fig. 10.

Pis. Bras. 77. tab. 78.

Seb. Mus. 3. tab. 13. fig. 8.

Petiv. Gazoph. tab. 78. fig. 5.

Habitat in Jamaica.

Chelae maris dissimiles, altera semper corpore maiore, mox dextra, mox sinistra, altera minuta, faeminae aequales, minutae.

25. C. thorace laevi utrinque bidentato, *mani-angulatus*.  
 bus longissimis. Ent. syst. 2. 449. 38.  
 Herbst. Cancr. 1. 85. 6. tab. 1. fig. 13.  
 Penn. Zool. britann. 4. tab. 5. fig. 10.  
 Habitat in Oceano Anglico prope Weymouth.

\*\*\* *Quadrati corpore gibbo, supra plano:  
 margine undique carinato.*

26. C. thorace antice fasciculato utrinque biden- *tetragonus*.  
 tato.

Habitat in India orientali.

Medius. Frons retusa, inaequalis. Oculi crassi, cylindrici. Thorax quadratus antico pilis nigris fasciculatis utrinque dentibus duobus acutis, validis. Chelae breues, crassae brachiis utrinque crenatis, carpis scabris, manibus sublaeuibus. Pedes tibiis compressis ante apicem unidentatis.

27. C. thorace laevi antice utrinque unidentato *quadratus*,  
 postice plicato.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff,

Præcedente duplo minor. Frons retusa, inaequalis. Thorax quadratus, laeuinisculus, glaber utrinque dente acuto et pone dentem margo plicatus. Chelae breues, crassae, sublaeues. Pedes tibiis compressis, plicatis, ante apicem unidentatis.

28. C. thorace laevi: lateribus antice unispinosis, *rhomboides*.  
 fronte truncata. Ent. syst. 2. 446. 28. Linn.  
 syst. Nat. 2. 1042. 14.

Herbst. Cancr. 1. 84. 5. tab. 1. fig. 12.

Sulz. Hist. Inf. tab. 31. fig. 2.

Barrel. Icon. rar. tab. 1287. fig. 1.

— — — tab. 1286. fig. 1. 2.

Habitat in mari mediterraneo.

\*\*\*\* *Depressi corpore depresso piano.*

*grapsus.* 29. C. thorace utrinque plicato antice bidentato, fronte deflexa, ante apicem quadridentata, corpore variegato. Ent. syst. 438. 2. \* Linn. syst. Nat. 2. 1048. 53. Am. acad. 4. tab. 3. fig. 10.

Herbst. Caner. 125. 23.

— — 124. 32. tab. 3. fig. 33. 34.

Catesb. Carol. 2. tab. 36. fig. 1.

Seb. Mus. 3. tab. 18. fig. 5. 6.

Habitat in Americae meridionalis Insulis.

*variegatus.* 30. C. thorace laevi utrinque tridentato, fronte ante apicem quadridentata. Ent. syst. 2. 450. 40.

Habitat in Indiis.

Statura et affinitas C. *grapsus*. Corpus paullo minus, vix plicatum, magis obscurum utrinque pone oculos tridentatum. Frons margine acuto prominens dentibus quatuor ante apicem latis obtusissimis. Pedes variegati tibiis ante apicem unidentatis. Chelae breves brachiis apice dentatis manibus laevibus.

*litteratus.* 31. C. thorace laevi littera H. impresso utrinque tridentato, unguibus compressis ciliatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus magnitudine C. *grapsus*, depressum, laeve, in medio H. distincto impressum,

utrinque crenatum dentibus tribus pone oculos acutis. Frons transuersa margine acuto absque dentibus. Chelae breues, paruae carpis dente uno alteroue manibus laeuibus. Pedes compressi, apice ciliati.

32. C. thorace scabro utrinque quadridentato, *depressus*.  
antennis frontalibus. Ent. syst. 2. 455. 57.

Herbst. Caner. 2. 117. 36. tab. 3. fig. 35.

Petiv. Gazoph. tab. 75. fig. 11.

Habitat in mari mediterraneo, americano.

Statura omnino C. graphi. Corpus planum, scabrum, variegatum, in medio utrinque impressum, pone oculos utrinque quadridentatum. Frons deflexa margine prominulo, dentato. Antennae oculique supra hunc marginem insertae, anteriores in canali recondendis. Inter antennas dentes duo parui, eleuati, acuti. Pedes pro femore eleuato, femoribus dente ante apicem valido, acuto, tarsis ciliatis: articulo ultimo subtus ferrato.

33. C. thorace orbiculato laeui integerrimo obtuso, cauda corporis amplitudine. *Pisum*.  
Ent. syst. 2. 441. 8. Linn. syst. Nat. 2. 1039. 6.

Herbst. Caner. 295. 15. tab. 2. fig. 21.

Penn. Zool. Brit. 4. tab. 1. fig. 1.

Habitat in mari Britannico, mediterraneo.

34. C. thorace laeui integerrimo subquadrato: *minutus*.  
margine acutiusculo, pedibus compressis.  
Ent. syst. 2. 443. 15. Linn. syst. Nat. 2. 2040.  
8. Mus. Ad. Frid. 1. 8. Linn. It. Wgoth. 137.  
tab. 3. fig. 1.

Herbst. Caner. 2. 110. tab. 2. fig. 32.

Scopol. carn. 1133.

Sloan. Iamaic. 2. tab. 245. fig. 1.

Penn. Zool. Brit. 4. tab. 1. fig. 2.

Bast. subse. 2. 26. tab. 4. fig. 12.

Habitat in Pelago frequens.

*pusillus.* 35. C. thorace laevi quadrato integerrimo, tarsis unidentatis. Ent. syst. 2. 443. 16.

Herbst. Caner. 2. 112. 31.

Habitat in Oceano boreali.

Præcedente quadruplo minor.

*plicatus.* 36. C. thorace laevi utrinque plicato antice quadridentato, fronte carinata.

Habitat in China Dom. Lund.

Paruus. Thorax laevis, in medio arcu duplici compressus. Frons transverse carinata margine acuto integro. Margo lateralis antice quadridentatus, postice plicatus. Carpi unidentati.

\*\*\*\*\* *Obuersi thorace integro postice latiore.*

*sexpes.* 37. C. thorace laevi integerrimo, fronte emarginata, pedibus senis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Paruus thorax laevis in medio lineolis duabus impressis. Frons deflexa, emarginata. Pedes omnino sex incrimis. Chelae breues, laeues altera maiore.

*semicylindrus.* 38. C. thorace laevi integerrimo, fronte deflexa bifida.

Habitat in Oceano indico Dom. Daldorff.

Corpus paruum, gibbum, laeve, in medio lineola duplici impressum. Frons deflexa, bifida laciniis rotundatis, ciliatis. Chelae breves, inermes manibus ovatis, laevissimis.

39. C. thorace antice unispinoso, dorso canalicu-*auritus*, lato molliusculo. Ent. syst. 2. 467. 102. \*

Habitat in Islandia Dr. Koenig.

**CALAPPA.** *Antennae* quatuor subaequales.

*exteriores* fetaceae in cantho oculi insertae, *interiores* quadriarticulatae, palpiformes: articulo ultimo bifido.

1. C. thorace laevi crenulato: angulis posticis di-*fornicata*, latato integerrimis, manibus cristatis.

*Cancer Calappa* Ent. syst. 2. 454. 54. Linn. syst. Nat. 2. 1048. 52. Mus. Lud. Ulr. 449.

Petiv. Gaz. tab. 75. fig. 11.

Seb. Mus. 3. tab. 20. fig. 7. 8.

Rumph. Mus. tab. 11. fig. 2. 3.

Habitat in Oceano americano.

2. C. thorace nodoso multidentato: angulis posticis dilatatis crenato dentatis, manibus dentatis. *tuberculata*.

*Cancer tuberculatus* Ent. syst. 2. 454. 53. \*

Habitat in Oceano pacifico Mus. Dom. Banks.

- granulata*. 3. *C. thorace sublaevi crenato: margine postico dilatato quinquedentato, manibus cristatis.*  
*Cancer granulatus* Ent. syst. 2. 454. 52. Linn. syst. Nat. 2. 1043. 26.  
 Catesb. 2. tab. 36.  
 Seb. Mus. 3. tab. 19. fig. 13.  
 Habitat in Mari mediterraneo.  
 Aliam vidi in Musaeo Dom. Herbft. margine postico sexdentata, at vix distincta.  
*Cancer Lophos* Herbft. *Cancer*. fig. 7.
- marmorata*. 4. *C. thorace subplicato utrinque tridentato, fronte crenata emarginata, brachiis apice dilatatis dentatis.*  
*Cancer marmoratus* Ent. syst. 2. 450. 39.  
 Herbft. *Cancer*. App.  
 Habitat in Oceano Dom. Herbft.
- cristata*. 5. *C. thorace subplicato utrinque crenato margine postico septemdentato anguloque postico dilatato dentato.*  
 Habitat in China Mus. Dom. Lund.  
 Statura praecedentium et certe affinis at distincta dentibus septem validis acutis approximatis marginis postici. Angulus posticus varius dilatatus tridentatus. Manus cristatae dentatae.
- Lophos*. 6. *C. thorace subplicato utrinque crenato: margine postico crenato sexdentato anguloque postico dilatato quadridentato.*  
*Cancer Lophos* Herbft. *Cancer*. fig. 7.  
 Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.



Affinis praecedentibus. Margo anticus utrinque crenatus angulo pollice dilatato quadridentato. Margo posticus crenatus dentibus sex minoribus, acutis, distantibus,

7. C. thorace laevi utrinque crenato dentato pollice angustato laevi.

Habitat in Americae Oceano Mus. D. Lund.

Statura a reliquis aberrat. Testa magna laevis margine utrinque dentato, crenato pollice angustato laevi. Manus parum cristatae dentatae. Pedes albidi fasciis violaceis.

OCYPODE, *Antennae* duae breuissimae, setaceae in cantho interiori oculorum insertae.

1. O. thorace quadrato crenato, oculis porrectis *ceratophthalmis* spina terminatis.

*Cancer ceratophthalmus* Ent. syst. 2. 439. 6.

*Cancer cursor* Linn. syst. Nat. 2. 1039. 1.

Herbst. Cancr. 174. 1. tab. 1. fig. 8. 9.

Pall. spic. Zool. 9. tab. 5. fig. 7.

*Cancer Uca* Linn. syst. Nat. 2. 1041. 13.

Habitat in mari Indico.

In varietate rubra Indorum tarsi antici subtus barbati.

2. O. thorace quadrato laevi: lateribus crenatis, *quadrata*, manibus scabris.

*Cancer quadratus* Ent. syst. 2. 439. 5. \*

Habitat in Iamaica Mus. Dom. Banks.

*rhombica.* 3. O. thorace laeuiusculo utrinque unidentato.

Habitat — — —

Corpus paruum, laeuiusculum utrinque margine acuto ad canthum oculorum in dentem acutum excurrente. Oculi magni, simplices. Frons deflexa, integra. Chelae brachiis crenatis carpis utrinque unidentatis, manibus sublacuibus.

*laevis.* 4. O. thorace laeui utrinque unidentato, chelis laeuissimis: dextra maiore.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Corpus paruum, laeue, fuscum thorace antice utrinque unidentato. Frons deflexa, integra. Oculi ad dentem marginis porrecti, cylindrici, simplices. Chelae et pedes laeuissimae ferruginae, Chela dextra corpore multo maiore.

*minuta.* 5. O. thorace laeui utrinque unidentato, chelis laeuissimis aequalibus.

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Affinis certe praecedenti at minutus. Oculi porrecti apice crassiores, ouati. Chelae et pedes flavescentes, aequales.

**LEUCOSIA.** *Antennae* duae palpiformes in foveola sub fronte prominente recondendae, quadriarticulatae.

\* *Chelis ovatis.*

1. L. thorace depresso scabro, fronte emarginata. *scabriuscula.*  
Habitat in India orientali Dom. Daldorff. *la.*

Corpus paruum, depressum, cinereum punctis parvis, elevatis, albidis scabrum. Frons vix porrecta, emarginata. Chelae elongatae brachiis cylindricis, scabris, carpis brevissimis manibusque ovatis laevibus. Pedes reliqui filiformes, laeves.

2. L. thorace globoso: dente medio elevato marginique crenato dentato. *pila.*

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Corpus paruum, globosum, laeve dente unico in medio elevato, obtuso. Margo crenatus dentibusque pluribus, maioribus cinctus. Frons obtusa vel potius truncata, integra. Chelae breves, laeves.

3. L. thorace laevi subcrenato, cauda basi bino- *globosa.*  
di, brachiis scabris.

*Cancer globosus* Ent. syst. 2. 441. 9. \*

Herbst. Cancr. 2. 9. 10.

Habitat ad littora malabarica Dr. Koenig,

*craniolaris.* 4. L. thorace laevi integerrimo ouato glaberrimo antice porrecto tridentato, manibus laevis.

*Cancer craniolaris* Ent. syst. 2. 441. 10 \* Linn. syst. Nat. 2. 1041. 15. Mus. Lud. Ulr. 431. Petiv. Gazoph. tab. 9. fig. 3.

Seb. Mus. 3. tab. 19. fig. 4. 10.

Rumph. Mus. tab. 10. fig. A. B.

Herbst Cancer. 2. 90. 11. tab. 2. fig. 17.

Habitat ad littora malabarica ubi et frequens petrificatus inuenitur.

*porcellana.* 5. L. thorace laevi glaberrimo ouato antice obtuso, brachiis granulatis.

*Cancer porcellanus* Ent. syst. 2. 441. 11. \*

Herbst Cancer. 92. 12. tab. 2. fig. 18.

Seb. Mus. 3. tab. 19. fig. 11. 12.

Habitat in Oceano Indico.

Aliam misit Dom. Daldorff ex India simillimam at rostro porrecto, ante apicem compresso, inermi. An varietas sexus?

*planata.* 6. L. thorace orbiculato plano: lateribus bidentatis, fronte tridentata.

*Cancer planatus* Ent. syst. 2. 446. 26. \*

Habitat in Terre del Fuego Mus. Dom. Banks. Minuta.

\*\* *Chelis filiformibus.*

*punctata.* 7. L. thorace ouato postice crenato tridentato, digitis inermibus.

*Cancer punctatus* Ent. syst. 2. 461. 78.

Brown. lam. tab. 42. fig. 3.

Habitat in Americae Insulis.

Corpus magnum, ovatum punctis parvis elevatis scabrum. Margo crenulatus postice dentibus tribus validis: intermedio ante marginem margine ipso sub dente crenatus. Chelae elongatae, filiformes brachiis granulatis, Manus elongatae digitis inermibus.

8. L. thorace oblongo postice tridentato: dente *fugax*.  
medio longiore recurvo, digitis dentatis.

*Cancer punctatus*. Herblt. Cancr. 2. 89. 8. tab.  
2. fig. 14. 15.

Rumph. Amboin. tab. 10. fig. C.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Varietatem praecedentis olim credidi, at distincta omnino videtur. Corpus magis oblongum, vix scabrum linea laterali carinata. Dentes tres postici: intermedio longiore, recurvo. Chelae elongatae brachiis scabris. Manus filiformes digitis intus multidentatis. Mas ante apicem caudae unidentatus.

9. L. thorace orbiculato postice bispinoso, brachiis granulatis.

*Cancer nucleus* Ent. syst. 2. 461. 79. Linn. syst.  
Nat. 2. 1042. 20.

Herblt. Cancr. 2. 87. tab. 2. fig. 14.

Sulz. Hist. Inf. tab. 31. fig. 3.

Habitat in mari mediterraneo.

10. L. thorace utrinque spina elongata acutissima *septemspinosa*.  
postice quinespinoso.

*Cancer septemspinosus* Ent. syst. 2. 462. 81. \*

*Cancer hystrix* Ent. syst. 467. 98. \*

Habitat in Oceano Indico.

*Erinaceus*. 11. L. thorace ovato spinosissimo: spinis marginalibus longioribus dentatis, brachiis aculeatis.

*Cancer Erinaceus* Ent. system. 2. 460. 75. \*

Habitat in Oceano Indico Dom. Spengler.

*cylindrus*. 12. L. thorace bifurcato: lateribus dilatato cylindricis apice spinosis.

*Cancer cylindrus* Ent. syst. 2. 456. 60.

Herbst. Cancr. 308. 29. fig. 29—31.

Habitat in Oceano Indico.

PARTHENOPE. *Antennae* quatuor subaequales.

*exterior*es fetaceae in cantho sub oculis insertae.

*interiores* palpiformes; complicatae, in fovea restri lateris inferioris latentes.

*fornicata*. 1. P. thorace inaequali: angulo postico dilatato, fornicato.

*Cancer fornicatus* Ent. syst. 2. 453. 50. \*

Habitat in India orientali.

*giraffa*. 2. P. thorace spinoso: spinis ramosis, chelis longissimis subtus tuberculatis.

---

Pedes omnes unguiculati, cursorii.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino *P. longimanae*. Thorax valde inaequalis spinis numerosissimis marginalibus imprimis ramosis. Rostrum prominens, planum, acutum, inerme. Chelae longissimae supra spinis ramosis, subtus tuberculis numerosis, obtusis. Carpi breuissimi. Manus elongatae pollice curuato. Pedes omnes spinosissimi.

3. *P. thorace spinoso*: spinis simplicibus, chelis *longimana*. longissimis, subtus laevibus.

*Cancer longimanus* Ent. syst. 466. 96. Linn. syst. Nat. 2. 1046. 42.

Rumph. Mus. tab. 8. fig. 2.

Petiv. Amb. tab. 2. fig. 15.

Seb. Mus. 3. tab. 20. fig. 12.

Habitat in Oceano Asiatico.

4. *P. thorace inaequali*: margine spinoso, chelis *regina*. longissimis: angulis spinosis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura praecedentium. Thorax ouatus foveis duabus dorsalibus impressis margine antice dentato, postice spinis nouem elongatis validis cincto. Frons in medio impressa rostro porrecto acuto, inermi. Chelae elongatae, triquetrae angulis spinosis. Pedes compressi, subserrati.

5. *P. thorace aculeato nodoso*, manibus ouatis *horrida*, cauda cariosa.

*Cancer horridus* Ent. syst. 2. 465. 92. \* Linn. syst. Nat. 2. 1047. 43. Mus. Lud. Ultr. 442.

Petiv. Amb. tab. 1. fig. 7.

Rumph. Mus. tab. 9. fig. 1.

Habitat in Oceano asiatico.

*Lar.*

6. P. thorace inaequali quadridentato: margine spinoso, chelis laevibus.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Corpus paruum obouatum. Rostrum truncatum, vix exsertum. Thorax inaequalis dentibus duobus in medio duobusque in linea dorsali postice elevatis, acutis. Spinae marginalis utrinquetris planae, acutae: intermedia longiore. Chelae longissimae at omnino laeves.

*Maja.*

7. P. thorace aculeato manibus ventricosus spinosis, digitis penicillato hirsutis. Ent. syst. 2. 465. 90. Linn. syst. Nat. 2. 1646. 4. Fn. Su. 2031.

Seb. Mus. tab. 18. fig. 10. tab. 22. fig. 1.

Habitat in Oceano Norwegico.

*dubia.*

8. P. thorace laevi, manibus compressis ciliatis, pedibus posticis brevissimis dorsalibus.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Minuta. Thorax rotundatus, planus, laevis margine utrinque pone oculos dentibus duobus acutis. Frons margine tridentato absque rostro. Chelae elongatae carpis magnis triangularibus, manibus adhuc maioribus compressis extus ciliatis. Pedes postici brevissimi, dorsales.



INACHUS. *Antennae* quatuor aequales.

*exteriores* setaceae intra rostri denticulum insertae.

*interiores* palpiformes, compressae, chelatae in fovea lateris inferioris rostri recondendae.

\* *Pedibus cylindricis mediocribus.*

1. I. thorace hirta inaequali: linea dorsali spinis *muricatus*.  
que dorsalibus utrinque duabus, marginalibus quatuor, pedibus hirtis.

*Cancer muricatus* Ent. syst. 2. 459. 71. \*

Herbst. Cancr. fig. 75.

Habitat in India orientali.

2. I. thorace hirta: linea dorsali spinisque utrinque *hybridus*.  
que duabus dorsalibus, marginalibus quatuor, pedibus apice nudis.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Vix distinctus videtur. Differt tamen corpore maiore, spinis dorsalibus minoribus, manibus maris maioribus, pedibus apice manibusque laevibus.

3. I. thorace ovato hirta utrinque quadrispinosa. *Ovis*.

*Cancer ovis* Ent. syst. 2. 459. 70.

*Cancer hircus* Herbst. Cancr. fig. 74.

---

Pedes omnes unguiculati, cursorii.

Habitat in India orientali.

*hircus.* 4. I. thorace lanato tuberculato, brachiis muricatis, manibus lacuibus.

*Cancer hircus* Ent. syst. 2. 458. 66. \*

Habitat in Jamaica Mus. Dom. Banks.

*ursus.* 5. I. thorace ovato fasciculato hirsutissimo, chelis lacuibus.

*Cancer Ursus.* Ent. syst. 2. 458. 65. \*

Habitat in Oceano australi Mus. Dom. Banks.

An potius Dromia?

*cornutus.* 6. I. thorace aculeato, rostro spinis corniformibus barbatis, manibus rotundatis.

*Cancer cornutus* Ent. syst. 2. 462. 80. \* Linn.

syst. Nat. 2. 1047. 46. Mus. Lud. Ulr. 445.

Habitat in mari mediterraneo, Oceano.

*Araneus.* 7. I. thorace inaequali: margine utrinque crenato, antice dilatato acuto.

*Cancer Araneus* Ent. syst. 2. 458. 67. Linn. syst.

Nat. 2. 1044. 50. Fn. Su. 2031. Mus. Lud.

Ulr. 459.

Iconst. Exsangu. tab. 5. fig. 13.

Penn. Zool. Brit. 4. tab. 9. fig. 16.

Habitat in Oceano Europaeo.

*Opilio.* 8. I. thorace aculeato: margine postico tridentato, manibus sublacuibus.

*Cancer Opilio* Ent. syst. 2. 458. 68. \*

Habitat in mari mediterraneo Prof. Vahl.

*condyliatus.* 9. I. thorace ovato aculeato: supra caudam spinis tribus erectis, chelis muricatis.

*Cancer condyliatus* Ent. syst. 2. 459. 69. \*

Herbst Cancr. fig. 92.

Habitat in mari mediterraneo.

10. I. thorace undique aculeato, rostro elonga-*aculeatus*.  
to bifido: supra dentibus quinque, sub-  
tus unico.

*Cancer aculeatus* Ent. syst. 2. 464. 89. \*

Habitat in Oceano Norwegico Prof. Vahl.

11. I. thorace nodoso inaequali, rostro plano re-*chiragra*.  
tuso, pedibus nodulosis.

*Cancer chiragra* Ent. syst. 2. 465. 93. \*

Habitat in mari mediterraneo.

12. I. thorace sublaevi ovato mutico, rostro bi-*mascaroni-*  
fido: lobis bidentatis. *us.*

*Cancer mascaronius* Ent. syst. 2. 457. 63. \*

*Cancer mascaroni* Herbst Cancr. fig. 62.

*Cancer planatus* Sulz. Hist. Inf. tab. 31. fig. 1.

Habitat in mari mediterraneo.

13. I. thorace undique aculeato, rostro bifido: *nasutus*.  
subtus dente unico supra duobus.

*Cancer nasutus* Ent. syst. 2. 457. 64. \*

Habitat in Oceano Norwegico.

Minutus.

14. I. thorace antice attenuato laeviusculo, ro-*angustatus*.  
stro porrecto barbato emarginato.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus minutum, valde oblongum, siue anti-  
ce attenuatum rostro porrecto, cylindrico,  
barbato, apice emarginato. Thorax laevi-  
usculus margine integro. Pedes spinosi. Che-

lae breues brachiis tarsisque spinosis, manibus laevibus.

- Maja.* 15. I. thorace aculeato, manibus ventricosis spinosis, digitis pemicillato hirsutis. Ent. syst. 2. 465. 90. Linn. syst. Nat. 2. 1646. 4. Fn. Su. 2031.  
Seb. Mus. 4. tab. 18. fig. 10. tab. 22. fig. 1.  
Habitat in Oceano Norwegico.
- \*\* *Pedibus elongatis, filiformibus.*
- scorpio.* 16. I. thorace pubescente: spinis quatuor erectis, pedibus anticis longissimis.  
*Cancer scorpio* Ent. syst. 2. 462. 83. \*  
*Cancer Dorsettensis* Penn. Zool. Brit. 4. tab. 9. fig. 18.  
Habitat in Oceano Norwegico.
- phalangi-um.* 17. I. thorace pubescente antice spinis tribus erectis acutis postice tuberculis obtusis, rostro bifido.  
*Cancer phalangium* Ent. syst. 2. 463. 84 \*  
*Cancer phalangium* Penn. Zool. Brit. 4. tab. 9. fig. 17.  
Habitat in Oceano boreali.
- longirostris.* 18. I. thorace aculeato porrecto ascendente, rostro acuto bifido.  
*Cancer longirostris* Ent. syst. 2. 462. 82.  
*Cancer dodecos* Linn. syst. Nat. 2. 1046 38?  
Habitat in mari mediterraneo.
- longipes.* 19. I. thorace aculeato, manibus ovatis scabris, pedibus posterioribus longissimis.

*Cancer longipes* Ent. syst. 2. 466. 97. Linn. syst.

Nat. 2. 1047. 47. Mus. Lud. Uir. 447.

Rumph. Mus. tab. 8. fig. 4.

Habitat in Oceano Indico.

20. I. thorace postice uniaucleato inaequali, pe-*spinifer*.  
dibus secundi paris longissimis.

*Cancer spinifer* Ent. syst. 2. 467. 99. Linn. syst.

Nat. 2. 1047. 48. Mus. Lud. Uir. 447.

Habitat in Oceano asiatico.

21. I. thorace hirtio: linea dorsali spinosa spina-*Lar*.  
que utrinque laterali.

*Cancer Lar* Ent. syst. 2. 467. 100.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

I. longipes affinis videtur.

22. I. thorace ovato laevi, rostro longissimo utrin-*sagittari-*  
que ferrato. *us.*

*Cancer sagittarius* Ent. syst. 2. 443. 13. \*

Habitat in Insula Guadeloupe.

**DROMIA.** *Maxillae* exterioris lacinia  
exterior flagelliformis.

*Antennae* quatuor: interme-  
diis palpiformibus; arti-  
culo primo angulato ca-  
naliculato reliquos recipi-  
ente.

1. D. thorace hirtio utrinque quinquedentato, pe-*Rumphii*.  
dibus quatuor posticis aequalibus.

---

Pedes huius generis octo unguiculati: postici quatuor  
prehenfiles inter dorsum et ventrem inferti.

*Cancer Dromia* Ent. syst. 2. 451. 45. Linn. syst.

Nat. 2. 1043. 24. Amoen. acad. 6. 413. 96.

*Cancer lanosus* Rumph. Mus. tab. 11. fig. 1.

Seb. Mus. 3. tab. 18. fig. 1—3.

Habitat in Indiae orientalis profundo.

Sub arena latens valvula conchae pedibus posticis supra corpus tenente pisciculis insidiatur.

*aegagropila.* 2. *D. thorace globoso mutico hirsutissimo, digitis nudis dentatis.*

*Cancer aegagropila* Ent. syst. 2. 456. 59. \*

*Cancer caput mortuum* Linn. syst. Nat. 2. 1050. 61 ?

Habitat in Oceano australi.

*artificiosa.* 3. *D. thorace tomentoso utrinque tridentato, pedibus posticis maioribus.*

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Corpus praecedente minus, magis depresso, tomentosum. Frons spinis tribus validis unicaque oculari. Thorax planiusculus, utrinque tridentatus: dente anteriori inferiori. Chelae breves, inaequales, nodosae. Pedes quatuor postici dorsales: anticis crassioribus ungue magno arcuato valido pollice breui obtuso.

**DORIPPE.** *Maxillae* secundae lacinia  
exterior apice ossea inter  
antennas porrecta.

*Antennae* quatuor.

*exteriores* setaceae supra  
foveam interiorum pal-  
piformium insertae.

1. *D. thorace* cordato inaequali depresso hirto *quadridens*.  
cauda basi sexdentata.

*Cancer quadridens* Ent. syst. 2. 464. 88. \*

*Cancer lanatus* Ent. syst. 2. 457. 63. Linn. syst.  
Nat. 2. 1044. 29.

Planc. Conch. 36. tab. 5. fig. 1.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Cauda parva segmentis duobus anticis denti-  
bus tribus cylindricis: intermedio validiori,  
obtusiori. Praeterea in segmento secundo  
utrinque dentes tres minores.

2. *D. thorace* cordato depresso hirto antice qua-*astuta*.  
dridentato, cauda laevi.

*Cancer Pinnophylax* Ent. syst. 2. 444. 18. Linn.  
syst. Nat. 2. 1039. 5. Amoen. acad. 6. [415.  
93?

Herbst. Cancr. 2. 104. 27. tab. 2. fig. 27?

Habitat in mari Indico Dom. Daldorff.

---

Chelae maris inaequales: altera mox dextra, mox si-  
nistra semper maiore, faeminae breves, aequales. Pe-  
des octo unguiculati: postici quatuor prehensiles, dor-  
sales.

Statura praecedentis at paullo minor. Thorax depressus, vix inaequalis, antice truncatus, quadridentatus lateribus inermibus. Chelae inermes. Pedes quatuor postici dorsales ungue arcuato.

*callida.*

3. *D. thorace cordato depresso nudo antice quadridentato, cauda carinata.*

*Cancer Pinnotheres* Ent. syst. 2. 443. 17? Linn. syst. Nat. 2. 1040. 92?

Habitat in mari Asiatico Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentis at minor et alia. Thorax depressus, nudus, antice quadridentatus lateribus inermibus. Pedes quatuor postici dorsales, magis porrecti, cylindrici quam in praecedente. Cauda in medio tuberculis parvis carinata.

Dorippe et Dromiae species omnes insidiatrices, id est valuula conchae pedibus dorsalibus prehensa, supra dorsum eleuata, aut dorso appressa sub arena latentes pisciculis insidiantur et hinc forsan fabula de Pinnothere concharum custode orta.



ORITHYIA. *Maxilla* exterior lacinia laterali lanceolata, acuta, breui, mutica.

*Antennae* quatuor inaequales: interioribus longioribus, palpiformibus.

1. O. mammillaris.

mammillaris.

*Cancer mammillaris* Ent. syst. 2. 465. 91 \*

Habitat in Oceano Indico Mus. D. Spengler.

Pedes postici natatorii, pinnati.

PORTUNUS. *Maxillae* exterioris lacinia lateralis flagelliformis.

*Antennae* quatuor inaequales.

*exterioribus* longiores setaceae.

*interiores* palpiformes.

\* *Thorace* utrinque bidentato.

1. P. thorace laevi utrinque bidentato, brachiis *vigil.* spinosis.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Medius. Oculi approximati pedunculo longissimo. Thorax transuersus, bidentatus: den-

te anteriore multo longiore. Pedes postici natatorii.

\*\* *Thorace utrinque sexdentato.*

- crucifer.* 2. P. thorace sublaevi utrinque sexdentato: dente ultimo emarginato, fronte octodentata. Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff. Magnus. Dentes frontales octo obtusi. Color rufus cruce media vittisque lateralibus albis.
- lucifer.* 3. P. thorace sublaevi utrinque sexdentato, fronte octodentata, digitis rufis apice atris. Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff. Color testae rufus maculis quatuor magnis albis, in uiuo phosphorescentibus. Brachia spinosa.
- annulatus.* 4. P. thorace laevi utrinque sexdentato, fronte octodentata, pedibus violaceo annulatis. Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff. Praecedentibus minor, laeuior, obscurus. Chelae spinosae digitis rubris: fascia media alba, apice nigris albo terminatis. Pedes omnes albo violaceoque variegati.
- variegatus.* 5. P. thorace cordato pubescente utrinque sexdentato: dente postico maiori, fronte octodentata, manibus spinosis. Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff. Affinis certe P. holosericeo. Differt tamen magnitudine minore, thoracis rugis, spina postica longiore, digitisque albis.

6. P. thorace cordato pubescente utrinque sexden *holoserice-*  
tato, fronte octodentata, manibus spinosis. *us.*

*Cancer holosericeus* Ent. syst. 2. 464. 87. \*

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

7. P. thorace cordato pubescente utrinque sex-*truncatus.*  
dentato, fronte truncata octodentata.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Affinis praecedentibus. Differt tamen thorace latiore, antice truncato dentibusque omnibus minoribus obtusioribus. Brachia margine interiori spinis duabus arcuatis, manibus granulatis spinosisque, digitis sulcatis albis apice incurvis.

\*\*\* *Thorace utrinque quinquedentato.*

8. P. thorace cordato hirtio utrinque quinqueden-*puber.*  
tato, manibus unidentatis apice nigris.

*Cancer puber* Ent. syst. 2. 463. 36. \* Linn. syst.

Nat. 2. 1046. 40.

Habitat in mari mediterraneo.

9. P. thorace laevi utrinque quinquedentato, ma-*depurator.*  
nibus apice compressis.

*Cancer depurator* Ent. syst. 2. 451. 44. Linn.

syst. Nat. 2. 1043. 23. Rumph. Mus. tab. 6.

fig. P

*Cancer ramipes* Barrel. Icon. 1287. 2.

Planc. Conchyl. 34. tab. 3. fig. 7.

Seb. Mus. 3. tab. 18. fig. 9.

Penn. Zool. Brit. 4. tab. 2. fig. 6.

Gronov. Act. Helv. 5. 360. tab. 5. fig. 443.

Habitat in Oceano Europaeo.

Frons tridentata: dente intermedio maiore.  
Palma triquetra angulo superiore ciliato. Co-  
lor flavescens annulis parvis rufescentibus.  
Chelae rufomaculatae.

*feriatus.* 10. P. thorace laevi utrinque quinquentato,  
manibus multangulis ovatis: carpis uniden-  
tatis.

*Cancer feriatus* Ent. syst. 2. 452. 47. Linn. syst.  
Nat. 2. 1043. 25. Mus. Lud. Ulr. 437.

Habitat in mari Indico.

*lancifer.* 11. P. thorace subtuberculato utrinque unispino-  
so antice quadridentato, pedibus anticis li-  
neatis.

*Cancer lancifer* Ent. syst. 452. 48. \*

Habitat in Oceano pacifico. Mus. Dom. Banks.

*holsatus.* 12. P. thorace laeviusculo fronteque quinquentato.  
tatis.

Habitat in Oceano Europaeo Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo omnino P. depuratoris.

Thorax laevis, glaber dorso impressura du-  
plici dentibusque utrinque quinque aequali-  
bus. Frons inter oculos quinquentata  
dentibus subaequalibus.

\*\*\*\* *Thorace utrinque nouemdentato.*

*tranquebaricus.* 13. P. thorace laevi utrinque nouemdentato:  
dentibus aequalibus.

Habitat in Oceano Indico esculentus D. Dal-  
dorff.

Magnitudine maxime differt. Thorax glaber,  
laevis utrinque nouem dentatus dentibus ae-

qualibus. Frons quadridentata. Brachia dentata.

14. P. thorace laevi utrinque nouemdentato: *pelagicus*.  
dente postico maiore, manibus multangula-  
to prismaticis.

*Cancer pelagicus*. Ent. syst. 2. 447. 31. Linn.

syst. Nat. 2. 1049. 29. Mus. Lud. Ulr. 434.

Degeer Ins. 7. 427. 3. tab. 26. fig. 8.

Rumph. Mus. tab. 7. fig. R.

Habitat in Pelagi fuceo natante.

Brachia spinosa.

15. P. thorace laevi utrinque nouemdentato: den *sanguino-*  
te postico maiore testaceo: maculis tribus *lentus*.  
sanguineis.

*Cancer sanguinolentus*. Herbst. Canc. 161. 68.

tab. 8. fig. 56. 57.

Habitat in Oceano indico Dom. Daldorff.

Nimis certe affinis P. pelagico. Differt tantum  
maculis tribus dorsalibus sanguineis una alte-  
raque in manibus. Manus breuiores, cras-  
siores.

16. P. thorace laevi utrinque nouemdentato: den- *defensor*.  
te postico breuiore fronte quadridentata:  
dentibus intermediis breuissimis.

*Cancer defensor*. Ent. syst. 2. 448. 32. \*

Habitat in Oceano australi Mus. Dom. Banks.

17. P. thorace rugoso utrinque nouemdentato: *hastatus*.  
dente postico maiore, fronte quadridentata:  
dentibus aequalibus.

*Cancer hastatus*. Ent. syst. 2. 448. 33. Linn. syst.

Nat. 2. 1046. 39.

Habitat in Americae Insulis Dr. Pflug.

- armiger.* 18. P. thorace sublaevi utrinque nouemdentata: dente postico maiore, fronte quinqueloba, brachiis utrinque dentatis.

*Cancer armiger.* Ent. syst. 2. 448. 34. \*

Habitat in Oceano australi Mus. Dom. Banks.

Affinis videtur P. tranquebarico.

- gladiator.* 19. P. thorace tomentoso utrinque nouemdentato: dente postico maiore, manibus sanguineo maculatis.

Habitat in Oceano Asiatico Dom. Daldorff.

Praecedentibus affinis at minor. Thorax holosericeus, parum inaequalis, hinc inde scaber. Chelae sanguineo maculatae digitis apice dentibusque albis.

- hoftatoides.* 20. P. thorace tomentoso inaequali utrinque nouemdentato: dente postico maiore, postice utrinque unidentato.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Praecedentibus multo minor thorace inaequali et distinctus dente postico utrinque minuto, acuto. Manus albae, immaculatae.

- forceps.* 21. P. thorace laevi utrinque nouemdentato: dente postico maiore, digitis longissimis filiformibus.

*Cancer forceps* Ent. syst. 2. 449. 36. \*

Habitat in Oceano.

- ponticus.* 22. P. thorace rugoso utrinque nouemdentato: dente postico maiore, manibus filiformibus: digitis breuibus.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Paruus. Thorax rugosus, brunneus. Manus filiformes digitis breuibus apice subreflexis.

**MATUTA.** *Antennae* duae breues, palpiformes, in cantho oculorum recondendae, quadriarticulatae: articulo quarto breuiore, incuruo, sabulato, bifido.

1. M. thorace undique punctato.

*viator.*

*Cancer viator.* Ent. syst. 2. 449. 37. \*

*Cancer lunaris.* Herbst. Cancr. 140. 49. tab.

6. fig. 45.

Seb. Mus. 3. tab. 20. fig. 10. 11.

Rumph. Mus. tab. 7. fig. f.

Brown. Iamaic. 422. 6. 7.

Habitat ad littora malabarica Dom. Daldorff.

2. M. thorace postice striato.

*planipes.*

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Vix a praecedente distincta. Differt tempore, et striis posticis loco punctorum.

Pedes omnes Matutae pinnati, natatorii.

HIPPA. *Antennae* quatuor pedunculatae, inaequales.

*interiores* breuiores, bifidae: laciniis setaceis utrinque ciliatis inter oculorum pedunculos insertae.

*exteriores* crassae, filiformes, conuolutae, utrinque ciliatae sub maxilla exteriori latentes.

*adactyla.* 1. H. cauda inflexa: articulo ultimo elongato subulato.

*Hippa adactyla.* Ent. system. 2. 474. 1. \*

Habitat in Oceano australi Mus. Dom. Banks.

*emeritus.* 2. H. cauda inflexa: articulo ultimo ouato.

*Aflacus emeritus.* Ent. syst. 2. 484. 21.

*Cancer emeritus.* Linn. syst. Nat. 2. 1055. 79.

*Emerita.* Gronov. Zooph. 1000. tab. 17. fig. 8. 9.

Petiv. pterig. tab. 20. fig. 9.

Habitat in mari Indico.

---

Oculi approximati, pedunculati: pedunculo elongato triarticulato; articulo primo connato, antennas interiores ambiente.



SYMETHIS. *Antennae* duae breuissimae, quadriarticulae, intra rostrum binulae reconditae.

1. *Symethis*.

*Hippa variolosa*. Ent. system. 2. 476. 7. \* *variolosa*.  
Habitat in Oceano Indico Dom. Spengler.

LIMULUS. *Palpi* utrinque quatuor: posticis tribus chelatis.  
*Mandibula* chelata.  
*Antennae* nullae.

1. L. testa plana conuexa: futura lunata postice dentata, cauda subulata longissima. Ent. *Polyphemus*.  
syst. 2. 487. 1.

*Monoculus Polyphemus*. Mant. Inf. 1. 240. 1.  
Linn. syst. Nat. 2. 1057. 1. Mus. Lud. Ulr.  
460.

*Limulus gigas* Myll. Entomast. 125. 60.

Rumph. Mus. tab. 12. fig. A. B.

Seb. Mus. 3. tab. 17. fig. 1.

Kaempf. Japan. tab. 13. fig. 8.

Olear. Mus. tab. 28. fig. 1. 2.

Schaeff. Monogr. 1756. tab. 7.

Habitat in Indiae aquis.

2. L. testa plana conuexa: lineis tribus spinarum *Cyclops* eleuatarum, cauda longissima inermi. Ent. syst. 2. 488. 2.

Habitat in Indiae aquis.

---

CLASSIS X.  
EXOCHNATA.

*MAXILLAE* PLURES EXTRA LABIUM  
TECTAE PALPIS.

---

A L B U N E A.

**O**s palpis, inferne tectum mandibulis maxilla-  
que triplici.

*Palpi* exteriores os obtegentes, maiores, quin-  
quearticulati, compressi, extus ciliati: arti-  
culo primo brevissimo, transverso, trape-  
ziformi: angulo inferiori obsolete genicula-  
to, porrecto, secundo reliquis longiore, sub-  
fornicato, seta rigida longitudine fere arti-  
culi, ad basin obsolete geniculata, externe  
suffulto tertio minore compresso, obconico,  
inflexo, apice oblique truncato, sinuato,  
quarto minore, ovato interne sub apice ter-  
tii inserto, quinto minuto, ovato.

*Palpi* secundi porrecti, bifidi: lacinia inferiore se-  
curiformi, latiore, compressa, cornea, quin-  
quearticulata: articulo primo brevi futuris  
aliquot obsolete diviso, secundo longissimo,  
tertio obovato, incurvo, quarto quintoque  
minoribus, rotundatis, lacinia exteriori fe-  
tacea, flagelliformi, longiore, multiarticu-

lata: articulo primo compresso, corneo, ad basin latiore, secundo ouato, reliquis numerosis, breuissimis, decrefcentibus.

*Maxilla* porrecta, bifida: lacinia interiore multo breuiore, cornea, fornicata, intus ciliata, basi subgeniculata, exteriori multo longiore, porrecta supra mandibulas adfcendente, basi membranacea, depressa, apice cornea, dilatata, rhombea, extrorsum pilis longioribus ciliata.

*Maxilla* secunda minor trifida: lacinia interiore lineari, minore, fornicata, membranacea, intermedia longiore, fornicata, cornea, versus apicem dilatata, ciliata, apice ipso oblique truncato, exteriori tenuiore, cornea, arcuata, acuta, unguiformi.

*Maxilla* tertia subcornea, trifida: lacinia interiore breuiore, fornicata, apice rotundata, intermedia longiore, apice dilatata, fornicata, truncata, ciliata, exteriori breui, fornicata, rotundata.

*Labium* mandibulis arcte adhaerens, membranaceum, rotundatum.

*Mandibula* ossea, cylindrica dente uno alteroue obsoleto apice fornicata, subdilatata, truncata, dentata, palpigera.

*Palpus* in sinu dorsi mandibulae infertus, breuis, incuruus, quadriarticulatus: articulo primo breui, secundo longiore: medio exteriori dilatato setigero, tertio apice exteriori dilatato, acuto, quarto minuto, rotundato.

*Antennae* quatuor pedunculatae, inaequales.

*interiores* longissimae, porrectae, setaceae, compressae, interne bifarie ciliatae, multiarticulatae.

*Pedunculus* compressus, fornicatus, foueam sub oculis formans, quadriarticulatus: articulo quarto tenuiore; margine interiore carinato, ciliato.

*exteriores* breuiores, crassiores, compressae, utrinque ciliatae septem articulatae: articulo primo minuto, secundo obouato, maximo, reliquis quadratis, decrefcentibus.

*Pedunculus* fissus articulo communi, maiori, regulari impositus: lacinia inferiore maiore, compressa, pilis longioribus ciliata, triarticulata: articulo primo secundoque multo latioribus, ouatis, tertio angustiore, obconico, antennifera, superiore minore, compressa, pilis longioribus ciliata, biarticulata: articulo primo maiore, irregulari, secunda linearis, longiore, mutico.

## SCYLLARUS.

Os palpis inferne tectum mandibula maxillaque duplici.

*Palpi* exteriores officii, angulati, sexarticulati: articulo primo breuissimo, transuerso, intus canaliculato, secundo longiore, externe lamina ossea, plana, lanceolata, acuta basi suffulto, tertio longiore, attenuato, fornicato, intus canaliculato, extus carinato,

quarto breui, obconico, incuruo, cum sequentibus in canali praecedentis recondendo, quinto longiore, triquetro, tenuiore, sexto breui, triquetro, conico.

*Palpi* secundi minores, bifidi: lacinia interiore securiformi, cornea, compressa, latiore, quinquearticulata: articulo primo brevissimo, secundo latiore, longissimo, interne ciliato, tertio breui, incuruo, quarto latiore, quadrato, quinto minore, ovato, lacinia exteriori lineari, membranacea, inarticulata, plana, rotundata, ciliata.

*Maxilla* bifida: lacinia interiore minore, cornea, bifida; pinna interiore unguiformi, bifida: pinnaulis distantibus, arcuatis, corneis, acutis: interiore setigera, pinna exteriori multo maiore, apice dilatata, rotundata, fornicata, ciliata, lacinia exteriori maiore, membranacea, bifida; pinna interiore breuiore, tenuiore, filiformi, exteriori multo maiore, dilatata, membranacea, apice rotundata, ciliata.

*Maxilla* secunda bifida: laciniiis subaequalibus rotundatis.

*Labium* mandibulis arte adhaerens rotundatum, integerrimum.

*Mandibula* ossea, concaua, utrinque sinuata, apice dilatata, inaequaliter dentata, palpigera.

*Palpus* breuis, planus, obtusus, triarticulatus: articulis subaequalibus in sinu mandibulae insertus.

*Antennae* quatuor inaequales.

*interiores* paullo longiores, filiformes, quadriarticulatae: articulo primo crassiore, pedunculum referente, secundo tertioque subaequalibus, longioribus, tenuioribus, ultimo brevioribus bifido.

*exteriores* breviores, depressoae, planae, dilatatae, spinoso ciliatae, quadriarticulatae: articulo primo tertioque minoribus, simplicibus, transversis, secundo et ultimo maioribus, dilatatis, planis, spinoso ciliatis, secundo superne carinato, acuto, quarti margine interno incumbente, quarto subtus carinato, conuexo.

## PALINURUS.

Os palpis inferne tectum, mandibulis maxillaque duplici.

*Palpi* exteriores maiores, elongati, os obtegentes, sex articulati: articulo primo brevi latiore, secundo et tertio longioribus, compresso, triangularibus interne concavis, margine interiori osseo ciliato, dentato, quarto et quinto minoribus cylindricis, intus ciliatis, sexto tenuiore, longiore, fasciculato piloso.

*Palpi* secundi minores, porrecti, bifidi: laciniis subaequalibus, corneis; interiore securiformi, crassiore, depresso, fornicata: articulis quinque, primo distincto, brevi, latiore, secundo longissimo, intus ciliato, tertio

incuruo, minuto, quarto transuerso, dilatato, perpendiculari utrinque et apice ciliato, quinto tenuiori, breui, rotundato, exteriori multiarticulata: articulo primo breuissimo, secundo longissimo, compresso, reliquis breuissimis, transuersis, ciliatis.

*Maxilla* prima cornea bifida: lacinia interiore multo maiore dilatata, fornicata: margine interno recto, densissime ciliato, exteriori minuta, ouata, ciliata basi exteriori palpigera.

*Palpus* maxillae lacinia duplo longior, ouatus multiarticulatus: articulo primo longissimo, triquetro, subtus carinato, superne late canaliculato, reliquis breuissimis, transuersis, numerosis ciliatis.

*Maxilla* secunda cornea, trifida: lacinia interiore breui, incurua, apice rotundata, ciliata, intermedia maiore apice dilatata, rhombea: margine altero ciliato, exteriori breuissima, oblonga, ciliata.

*Labium* mandibulis arcte adhaerens membranaceum, trifidum: lacinis lateralibus maioribus, distantibus, rotundatis, integerrimis, intermedia rotundata, minuta, integra.

*Mandibulae* magnae, crassae, concauae, obtusae superne dente magno acuto, subulato, dissimiles: dextra in medio sinuata, rotundata, obtusa, sinistra, truncata.

*Palpus* in dorso mandibularum ad basin dentis superioris insertus, breuis triarticulatus, com-

pressus linearis: articulo primo breuiore, secundo longiore, tertio rotundato ciliato.

*Antennae* quatuor inaequales, pedunculatae: pedunculo longo, articulato, simplici.

*interiores* breuiiores, porrectae longitudine fere corporis setaceae, bifidae: articulis numerosis, breuissimis, transuersis, decreescentibus.

*Pedunculus* muticus longior quam exteriorum, quadriarticulatus: articulis cylindricis decreescentibus; primo duplo longiore, superne ad basin bifarie ciliato.

*exteriores* corpore duplo longiores, setaceae, aculeatae, ad basin compressae, utrinque subcanaliculatae: articulis numerosissimis, breuissimis, transuersis, decreescentibus.

*Pedunculus* triarticulatus, angulato depresso, spinosus: articulo primo maiore, ultimo longiore.

## PALAEEMON.

Os palpis inferne tectum mandibulis maxillaque duplici.

*Palpi* exteriores maiores, ossei, porrecti os obtegentes quadriarticulati: articulo primo latiori, breui, irregulari, secundo longissimo, compresso, fornicato margine interno ciliato, tertio paullo breuiore, recto, inferne hirto, quarto breuiore, cylindrico, hirto.

*Palpi* secundi latiores, subcornei, compressi, fornicati, bifidi: lacinia interiore maiore, securiformi, sexarticulata; articulis tribus in-



ferioribus breuibus, transuersis, quarto minore transuerso, incuruo, quinto et sexto dilatatis perpendiculariter transuersis, exteriore minore membranacea, compressa.

*Maxilla* cornea, bifida: lacinia interiore maiore fornicata, rotundata, intus ciliata, exteriore minore rotundata.

*Maxilla* secunda minor, trifida: laciniis exterioribus minoribus, membranaceis, oblongis, ciliatis; intermedia maiore, fornicata, extorsum dilatata apice truncata, ciliata.

*Labium* mandibulis arcte adhaerens, membranaceum, trifidum: laciniis lateralibus maioribus, rotundatis integris.

*Mandibula* magna, crassa, cylindrica, concaua apice bifida, palpigera: lacinia interiore dentem molarem referente, quadrata, truncata, dentata, exteriore dentes incisores referente, compressa, subfornicata, apice tridentata.

*Palpus* compressus, hirtus, triarticulatus, inter lacinias mandibulae insertus.

*Antennae* quatuor pedunculatae, inaequales se invicem super impositae.

*Superiores* breuiores, setaceae: articulis numerosissimis, vix conspicuis, trifidae: laciniis inaequalibus, exterioribus longitudine corporis, intermedia minore longitudine thoracis.

*Pedunculus* crassus, triarticulatus: articulo primo maiore, depresso, superne ad receptionem

oculorum excauato, margine exteriori osseo, antice producto, bifido: pinna interna ciliata, externa acuta, articulo secundo minore subcylindrico, apice interiore porrecto, ciliato, tertio longiore, tenuiore, obconico: apice inaequali antennifero.

*inferiores* setaceae, simplices, corpore multo longiores: articulis numerosissimis, transversis, brevissimis.

*Pedunculus* crassus, triarticulatus: articulo primo crassiore, irregulari, apice externo dilatata, squamifera: squama oblonga, elongata, pedunculo duplo longiore, extus a basi ad apicem oblique ossea, crassiore, ante apicem spinosa, intus tenuiore, cornea, pellucida, secundo tertioque inaequaliter cylindricis, breuibus, inermibus.

## ALPHEUS.

Os palpis inferne tectum mandibulis maxillaque duplici.

*Palpi* exteriores longissimi, os obtegentes, ossei, quadriarticulati: articulo primo brevissimo, latiori, secundo longissimo basi subfornicato, apice carinato: margine interiori crenato, exteriori lacinia tenui, membranacea, setacea longitudine fere articuli aucto, tertio breui, obouato, depresso, quarto angustiori, duplo longiori, depresso, oblongo lineari, utrinque pilis longioribus ciliato.

*Palpi* secundi multo minores, bifidi: lacinia interiore cornea, securiformi, quinquearticulata: articulo primo brevissimo, secundo longissimo, fornicato, tertio minuto, incurvo, quarto perpendiculariter transverso: capitulo parvo ciliato in apice exteriori, quinto transverso, ciliato, lacinia exteriori nobis deficiente.

*Maxilla* bifida: laciniis inaequalibus, interiore brevioribus, ovatis, fornicatis, exteriori striis vel futuris variis exarata; margine interiore rectiore, ciliato, lacinia exteriori duplo longiore, tenui, membranacea, setacea.

*Maxilla* secunda subcornea, bifida: lacinia interiore brevi incurva, tenuiore, subpellucida, intermedia longiore, opaca, cornea, apice latiore, fornicata, oblique truncata, ciliata, exteriori minore angustiore, parum torta.

*Labium* mandibulis arcte adhaerens, submembranaceum, bifidum: laciniis aequalibus, ovatis.

*Mandibula* magna, crassa, cylindrica, apice bifida, inter lacinias palpigeras: lacinia interiore crassiori, quadrata, apice truncata, inaequali, exteriori longiore, compressa, fornicata margine multidentato: dentibus minutis inaequalibus.

*Palpus* brevis, hirtus: articulis tribus subaequalibus.

*Antennae* quatuor inaequales, pedunculatae, setaeae.

*interiores* paullo altius insertae, breuiores, bifidae: laciniis subaequalibus, multiarticulatis.

*Pedunculus* cylindricus externe subcarinatus: articulis tribus inaequalibus, primo breui sequentibus paullo crassiore, superne ad basin lamina ouata, subulata, acuta, articulo ipso breuiore acuto, secundo reliquis duplo longiore tertio minuto annulo ante apicem impresso.

*exteriores* longitudine corporis, simplices: articulis numerosissimis, transuersis, ultimis vix conspicuis.

*Pedunculus* cylindricus: articulis tribus inaequalibus, primo latiore, breui, irregulari, apice exteriori squamifero: squama longitudine totius pedunculi, lanceolata; margine exteriori corneo, acuto, interiori membranaceo, subpellucido, ciliato, secundo longissimo inerini, tertio breui, tenuiore, obconico.

## ASTACUS.

Os palpis inferne tectum mandibulis maxillaque triplici.

*Palpi* exteriores elongati, os obtegentes, offei, bifidi: lacinia interiore maiore, sexarticulata: articulo primo latiore, communi, transuerso, irregulari, secundo longiori, triquetro: angulo altero multidentato, altero ciliato, tertio mutico, articulo tertio breuiori, com-

presso, triquetro, flexo: angulo interiori acuto, ultimis tribus brevioribus, subaequalibus, ciliatis: lacinia exteriori multo minore, angusta, setacea, versus apicem membranacea, multiarticulata; articulo primo longissimo, triquetro, reliquis brevissimis, numerosis, vix conspicuis.

*Palpi* secundi minores, cornei, bifidi: lacinia interiori maiore, securiformi, plana, subfornicata, quinquearticulata: articulo primo brevissimo, transverso, secundo longissimo versus apicem angustiore, margine interiori ciliato, tertio minuto, incurvo, quarto multo maiore perpendiculariter transverso, ciliato, quinto breui, rotundato, ciliato, lacinia exteriori tenuiori, flagelliformi: articulo primo breui, secundo longissimo, subarcuato, reliquis numerosis, decreascentibus.

*Maxilla* maiore, cornea, trifida: lacinia interiori brevissima, crassa, ciliata, intermedia multo maiore dilatata, fornicata: margine interno ciliato, serieque setarum ad marginem exteriorem, exteriori longiore, lanceolata, plana, in medio geniculata, basi exteriori palpigera.

*Maxilla* secunda minor, cornea, trifida: laciniiis duabus interioribus fornicatis, apice dilatatis, ciliatis, bifidis: pinnis introrsum sensim decreascentibus, exteriori longiore, plana, subulata, externe ciliata.



*Maxilla* tertia cornea bifida: lacinia interiore breui, incurua, rotundata, ciliata, basi lamina breui, ouata augeta, exteriore longiore, recta, fornicata, apice dilatata, oblique truncata, ciliata basi exteriore palpigera.

*Palpus* flagelliformis: articulo primo breui, transuerso, secundo longissimo, depresso, apice angustiore, tertio ouato, incuruo, reliquis numerosis, minutis, decrefcentibus.

*Labium* mandibulis arête adhaerens bifidum: laciniiis simplicibus, recuruis, intus dilatatis, ciliatis.

*Mandibula* crassa, cornea apice bifida, palpigera: lacinia superiore compressa, inermi, inferiore intus dilatata, acuta.

*Palpus* inter mandibulae lacinias insertus, compressus, triarticulatus: articulo ultimo latiore, ciliato.

*Antennae* quatuor pedunculatae, inaequales, setaceae, multiarticulatae.

*interiores* breuiores, bifidae: laciniiis subaequalibus.

*Pedunculus* quadriarticulatus: articulo primo maiore, depresso, rotundato, superne plano, macula rotundata, subpellucida, apice spinis obsoletis, rarioribus coronata, reliquis tribus subaequalibus, cylindricis decrefcentibus, apice setis rarioribus coronatis.

*exteriores* longiores, simplices: articulis numerosissimis, transuersis, decrefcentibus.

*Pedunculus* elongatus, quadriarticulatus: articulo primo maiori, irregulari; apice exteriori longiore, spinoso, secundo sub apice inserto, breui parum depresso, tertio longiore, interne carinato, ciliato, quarto minore, externe carinato, ciliato.

## PENAEUS.

Os palpis inferne tectum mandibulis maxillaque triplici.

*Palpi* exteriores longissimi, recti, rigidi, bifidi: laciniis inaequalibus, interiore maiore, longiore, crassiore: articulis sex; primo breui, secundo longissimo, reliquis brevioribus, subaequalibus, sexto brevioribus, exteriorē dimidio brevioribus, multiarticulata, compressa, utrinque ciliata, pennacea: articulo primo longiore, angustiore, cylindrico, distincto, reliquis numerosissimis, transversis, vix conspicuis.

*Palpi* secundi breviores, bifidi: lacinia interiore brevioribus, securiformi, lata, depressa: quinquearticulata, articulo primo breui, transverso, secundo longissimo, latiore: margine interiori ciliato, tertio breui, tenuiori, incurvo, quarto maiore, perpendiculariter transverso, subquadrato, quinto minore, oblongo, dependente sub apice inserto externe ciliato: lacinia exterioribus duplo longiore, compressa, attenuata, pennacea, vel utrin-

que ciliata: articulis numerosissimis; primo angustiore, distincto, oblongo, reliquis brevissimis, transuersis.

*Maxilla* reliquis maior, cornea, ouata, bifida: lacinia interiore minuta, ouata, exteriori margine interno ciliato serieque setarum margini parallela.

*Maxilla* secunda subcornea, bifida: lacinia interiore breuiore, tenuiore, acuta, exteriori maiore, apice dilatata, subfornicata, oblique truncata, ciliata, fissâ.

*Maxilla* tertia simplex apice dilatata, ouata, intus ciliata.

*Labium* membranaceum, bifidum: laciniis basi cylindricis, apice ouatis, integerrimis.

*Mandibula* crassa, cornea, obtusissima, utrinque unidentata dente superiore maiore.

*Palpus* foliaceus, latissimus, membranaceus, utrinque ciliatus, triarticulatus: articulo primo breuissimo, secundo breui transuerso, tertio maximo, plano, foliaceo, magnitudine totius mandibulae.

*Antennae* quatuor inaequales, pedunculatae se inuicem super impolitae.

*Superiores*; breuiore, porrectae, setaceae, bifidae: laciniis aequalibus: inferiore basi subtus barbata.

*Pedunculus* crassus conicus longitudine dimidia antennarum, triarticulatus: articulo primo maximo ad receptionem oculorum excauato,



secundo tertioque breuibus subcompressis muticis.

*inferiores* simplices setaceae, corpore multo longiores: articulis numerosissimis, breuissimis, decrefcentibus.

*Pedunculus* triarticulatus superiorum pedunculo breuior, tenuior, triarticulatus: articulo primo crassiore, irregulari; apice exteriori elongato, squamifero; squama oblonga, elongata, pedunculo longiore, a medio ad marginem internam oblique striata, cornea, tenuiore, subpellucida a medio ad marginem externam crassiore, opaca; margine exteriori ipso lamina lineari, offea ante apicem in spinam elongata, suffulto, articulo secundo cylindrico, inaequali, inermi tertio minore subgloboso.

## CRANGON.

Os palpis inferne testum mandibulis maxillaque duplici.

*Palpi* exteriores elongati, os obtegentes, bifidi: lacinia interiore multo maiore, offea, compressa, ciliata, sexarticulata: articulo primo transuerso, breui, communi, secundo longissimo, reliquis subaequalibus, exteriori multo breuiore, angustiore, membranacea, multiarticulata: articulo primo plano, longissimo, reliquis breuissimis, cylindricis, decrefcentibus innumeris.

*Palpi* secundi breuiores, cornei, bifidi: laciniis inaequalibus, inferiore latiore, plana incurua quadriarticulata, articulo primo breui, transuerso, secundo longissimo, tertio incuruo, quarto fornicato, paullo latiore ciliato, exteriori flagelliformi multiarticulata: articulo primo breui, secundo longissimo, reliquis breuissimis, innumeris, decrefcentibus.

*Maxilla* membranacea, plana, trifida: lacinia inferiore minore, subulata, media maiori rotundata, exteriori subulata longissima.

*Maxilla* secunda nobis deest.

*Labium* breue, membranaceum, rotundatum mandibulis arcte adhaerens.

*Mandibula* incurua cylindrica, apice tridentata, palpigera.

*Palpus* inter dentes mandibulae infertus, breuis, planus, filiformis, triarticulatus: articulis subaequalibus.

*Antennae* quatuor pedunculatae, exteriores longissimae, setaceae pedunculo squama exteriori, ouata ciliata saffulto, posteriores breuiores, bifidae: lacinia exteriori paullo longiore ciliata pedunculo basi dente acuto, valido armato.

## PAGURUS.

Os palpis inferne tectum mandibulis maxillaque triplici.

*Palpi* exteriores longissimi, cornei, os obtegentes, bifidi: laciniis inaequalibus; inferiore

longiore, crassiore, sexarticulata: articulis subaequalibus, primo latiore, breui, irregulari, secundo, angulato: angulo altero crenato, altero ciliato tertio et quinto longioribus, compressis: margine interiori pilis longioribus ciliatis, quarto obconico, incuruo, ultimo angustiore apice obtuso fasciculato, exteriori minore tenui, quadriarticulata: articulo primo breui, crassiore, secundo longissimo, compresso, tertio breui, ultimo breui truncato, fasciculato.

*Palpi* secundi minores bifidi: laciniis subaequalibus, interiore latiore, compressa, subsecuriformi, quinquearticulata: articulo primo breui, transuerso, intus ciliato, secundo longissimo, intus ciliato, tertio breui, obovato, incuruo, quarto quadrato: angulo superiori interne porrecto pilis longioribus ciliato, quinto acuto, ciliato, exteriori tenuiore, membranacea, flagelliformi: articulo primo breuissimo, secundo longissimo, compresso, reliquis numerosis, minutis, decrescentibus.

*Maxilla* cornea bifida: lacinia interiore rotundata, fornicata latiore, intus ciliata, exteriori plana, basi dilatata, intus seta acuta armata, in medio coarctata, apice bifida: pinna interiore subulata, acuta, exteriori longiore, cylindrica.

*Maxilla* secunda cornea, trifida: lacinia interiore fissa; pinna interiore ciliata breuiore, exte-

riore subulata, acuta, intermedia longiore, bifida; pinna interiore latiore, apice fornicata, ciliata, fissa, exteriori minore, conica subulata, lacinia exteriori — —

*Maxilla* tertia subcornea bifida: lacinia interiore brevissima, rotundata, ciliata, exteriori longiore, bifida; pinna interiore apice dilatata, ciliata, exteriori brevi, acuta.

*Labium* membranaceum, mandibulis arcte adhaerens, rotundatum, integrum.

*Mandibula* ossea utriusque sinuata apice fornicata, dilatata, intus palpigera.

*Palpus* triarticulatus, parvus, in mandibulae apicem excavatum recondendus: articulo ultimo latiore, compresso.

*Antennae* quatuor inaequales, pedunculatae, transversaliter dispositae.

*interiores* breves, palpiformes, oculorum pedunculos vix superantes: articulis tribus; primo compresso, secundo longiori cylindrico ultimo brevi bifido.

*Pedunculus* uniarticulatus, gibbus, spinosus.

*exteriores* corporis longitudine, setaceae, multiarticulatae.

*Pedunculus* extra oculos ad latera frontis superne insertus: articulo primo multo latiore, irregulari spinoso spinaque rigida, basi articulata longitudine fere totius pedunculi externe aucto, secundo minore, ovato, mutico, inflexo, tertio lineari, longissimo compresso.

## GALATHEA.

Os palpis inferne tectum mandibulis maxillaque triplici.

*Palpi* exteriores porrecti, os obtegentes, bifidi: lacinia inferiore paullo longiore, crassiore, ossica, sexarticulata: articulo primo breui, latiore, irregulari, secundo longiore apice inferiore spina una alteraque armato, tertio longiore intus spinoso quarto breui, incuruo, obconico, apice interiori setola, quinto longiori, lineari, ultimo minori, arcuato, ciliato, lacinia exteriori tenuiore, flagelliformi: articulo primo breuissimo, secundo longissimo, compresso, parum arcuato, tertio ouato, incuruo, reliquis numerosis, breuissimis, vix decreescentibus.

*Palpi* secundi minores, compressi, porrecti, bifidi: lacinia inferiore brevior, crassiore subfecniformi, quinquearticulata: articulo primo breui, transuerso, intus ciliato, secundo longissimo itidem ciliato, tertio breui, obouato, inclinato, quarto quadrato, quinto lanceolato, ciliato, exteriori duplo longiore ad oculos porrecta, flagelliformi, submembranacea: articulo primo breui, secundo longissimo, oculos attingente, compresso a basi usque ad medium interne barbato, tertio ouato, introrsum reclinato, reliquis numerosis, minutis, decreescentibus.

*Maxilla* subcornea, trifida: lacinia inferiore latiore, fornicata, intus ciliata, ad basin inci-

sa, intermedia longiore, angustiore apice elongata, subulata, tertia multo breuiore, oblonga.

*Maxilla* secunda subcornea, bifida: laciniis aequalibus fornicatis, extrorsum latioribus, apice truncatis, ciliatis; exteriori seta subulata extus armata.

*Maxilla* tertia subcornea, trifida: laciniis inaequalibus: interiore brevissima, latiore, rotundata, apice oblique truncata, ciliata intermedia longissima, apice latiore, fornicata, oblique truncata, ciliata, exteriori unguiformi, tenui, arcuata, acuta.

*Labium* mandibulis arcte adhaerens, bifidum: laciniis aequalibus, membranaceis, rotundatis, integris.

*Mandibula* ossea, utrinque sinuata, apice dilatata, fornicata, in sinu superiore palpigera.

*Palpus* intra mandibulae cavitatem recondendus, compressus, quadriarticulatus: articulo ultimo maiore, latiore, ovato.

*Antennae* quatuor pedunculatae, inaequales.

*interiores* palpiformes, breves, triarticulatae: articulo primo et secundo cylindricis, subaequalibus, ultimo breui, bifido: lacinia inferiore breuiore setacea, multiarticulata, superiore maiore falcata.

*Pedunculus* brevis, crassus, spinosus, triarticulatus, *exteriores* simplices, setaceae, corpore longiores, extra oculos insectae: articulis numerosis, minutis,

*Pedunculus simplex*, conicus, triarticulatus; articulis spinosis, decrefcentibus.

## SQUILLA.

Os palpis inferne teftum mandibulis maxillaque duplici.

*Palpi* exteriores longiffimi, compressi, sexarticulati: articulo primo breui, craffiore, apice inaequali, externe porrecto, fecundo longiffimo lineari, arcuato, tertio parum breuiore, apice incraffato, interne pilofa, quarto breui, latiore margine interiore pilis longioribus ciliato, quinto dilatato, orbiculato; latere exteriori pilofa, margine superiori canaliculato ad receptionem ultimi articuli; sexto breui, arcuato, acuto, unguiformi, in canalem marginis articuli quinti reconduendus.

*Palpi* fecundi breues, lati, os obtegentes: articulis quinque fubaequalibus, transuerfis, medio canaliculatis, ultimo longiori, acutiufculo, ciliato.

*Maxilla* bifida: lacinia interiore latiore, fornicata, apice oblique truncata, ciliata, ad basin fquama tenui aucta, exteriori vix longiore, cylindrica fubulata.

*Maxilla* fecunda nobis deeft,

*Labium* breue, membranaceum, mandibulis arcte adhaerens, bifidum laciniiis fimplicibus, quadratis, obtufis, diftantibus.

*Mandibula* ossea, crassa, concava, apice bifida palpigera: lacinia altera porrecta, compressa, incurva, margine dentato, altera laterali, triquetra, recta, acuta, intus bifariam dentata.

*Palpus* dorso mandibulae ante basin hinciarum infertus, filiformis, compressus, setis terminatus articulis tribus subaequalibus.

*Chypeus* concavus, membranaceus mandibulas regens.

*Antennae* quatuor inaequales, setaceae; pedunculatae, multiarticulatae.

*interiores* longiores longiusque pedunculatae, trifidae laciniis subaequalibus multiarticulatis, setaceis.

*Pedunculus* elongatus, muticus, triarticulatus: articulis cylindricis, subaequalibus, decrecentibus.

*exteriores* breviores, simplices: pedunculo bifido.

*Pedunculus* crassus, irregularis: articulo primo depresso, lato, orbiculato, secundo depresso, lato transverso, bifido: lacinia exteriori uniaarticulata, squamifera, articulo minuto, globoso, squamae basin efficiente, squama oblongo lanceolata, plana, ciliata longitudine totius antennae, lacinia interiori biarticulata, antennifera: articulis cylindricis, primo breviori et latiore.



---



---

## POSYDON.

Os palpis tectum.

*Palpi* exteriores magni compressi, semimembranacci, secundum totam longitudinem foliacei, apice unguiculati. Reliqua instrumenta cibaria mihi ob specimina nimis intus putrescentia, desunt.

*Antennae* quatuor setaceae pedunculatae: pedunculis simplicibus muticis.

*interiores* breviores, bifidae, subpilosae.

## GAMMARUS.

Os palpis inferne tectum, mandibulis maxillaque triplici.

*Palpi* anteriores longiores, compressi bifidi: lacinia interiore quadriarticulata; articulo ultimo incurvo, exteriori brevior: articulo secundo longissimo, reliquis brevissimis.

*Palpi* secundi paullo breviores, bifidi: lacinii subaequalibus; interiore triarticulata, exteriori subulata, acuta.

*Maxilla* membranacea, bifida: lacinii subaequalibus, linearibus.

*Maxilla* secunda membranacea, bifida: lacinii rotundatis, aequalibus.

*Maxilla* tertia membranacea bifida: lacinii aequalibus rotundatis extrorsum crassioribus.

*Labium* breve membranaceum, mandibulis arte adhaerens, rotundatum, integrum.

---

*Mandibula* brevis, cornea, crassa, fornicata, obtusa, vix dentata, dorso palpigera.

*Palpus* hic brevis, filiformis, triarticulatus, compressus.

*Antennae* quatuor inaequales, simplicissimae.

*anteriores* breviores, subulatae: pedunculo biarticulato.

*posteriores* longiores, setaceae: pedunculo triarticulato.

---

ALBUNEA. *Antennae* quatuor inaequales, pedunculatae. *interiores* longissimae, scitaceae interne bifariam ciliatae: pedunculo fornicato.

*exteriores* breviores, crassiores, compressae, utrinque ciliatae: pedunculo bifido.

1. A. thorace antice truncato ciliato ferrato, *manibus symnista*.  
*nibus chelatis.*  
*Hippa symnista* Ent. syst. 2. 474. 2.  
*Cancer symnista* Linn. syst. Nat. 2. 1013. 70.  
 Mus. Lud. Uir. 453.  
 Habitat in Oceano Indico Mus. Dom. Banks.
2. A. thorace sub integro ciliato, *manibus chescutellata*.  
*latis.*  
*Hippa chescutellata* Ent. syst. 2. 474. 3 \*  
 Habitat — — Mus. britann.
3. A. thorace glabro antice truncato septem *dentibus dorsipes*.  
*tato, manibus compressis: pollice falcato.*  
*Hippa dorsipes* Ent. syst. 2. 475. 5. \*  
*Cancer dorsipes* Linn. syst. Nat. 2. 1053. 71.  
 Mus. Lud. Uir. 452.

---

Oculi minuti, orbiculati, pedunculi apice immerſi, approximati, pedunculis planis, femiorbiculatis, fornicatam, quam antennae interiores formant superne claudentes.

Rumph. Mus. tab. 10. fig. 3.

Petiv. Amboin tab. 6. fig. 2.

Habitat in Oceano Indico, australi Mus. D. Banks.

*scabra.*

4. A. thorace onato antice truncato multidentato, manibus compressis utrinque dentatis.

*Hippa scabra* Ent. syst. 2. 476. 6. \*

Habitat in Oceano australi Mus. Dom. Banks.

*dentata.*

5. A. thorace laevi utrinque quinquedentato, tarsis spinosis.

*Hippa dentata* Ent. syst. 2. 475. 4.

*Cancer Cassilaunus* Penn. Zool. Brit. 4. tab. 7. fig. 13.

*Cancer personatus* Herbst. Cancr. tab. 12. fig. 21.

Habitat in Oceano Europaeo et Indico.

Proprii generis videtur haud rite examinata.

**SCYLLARUS.** *Antennae* quatuor inaequales.

*interiores* sublongiores, filiformes: articulo ultimo bifido.

*exteriores* depressae planae, dilatatae, spinoso ciliatae.

*Arctus.*

1. S. thorace antice quinquefarie aculeato, antennarum squamis ciliato aculeatis.

*Scyllarus Arctus* Ent. syst. 2. 477. 1.

*Cancer Arctus* Linn. syst. Nat. 2. 1053. 75. Fu.

Su. 2040. Lund. Aët. Hafn. S. N. 2. 2. 21. 1.

Subz. Hist. Inf. tab. 32. fig. 3.

Barrel. Icon. tab. 1288. fig. c.

Ionst. Exsangu. tab. a. fig. 4. 8. 12.

Habitat in Oceano Europaeo.

2. *S. scaber* thorace antennarumque squamis cre- *aequinocti-*  
natis. *alis.*

Lund. Aët. Hafn. N. S. 2. 2. 21. 2.

Brown. Jamaic. tab. 41. fig. 1.

Habitat in Americae Insulis.

3. *S. pilosus* thorace antennarumque squamis fer- *antarcticus.*  
rato ciliatis.

Lund. Aët. Hafn. S. N. 2. 2. 22. 3.

Seb. Mus. 3. tab. 20. fig. 1.

Rumph. Mus. tab. 2. fig. 6.

Ionst. Exf. tab. 9. fig. 14.

Habitat in India orientali.

4. *S. scaber* thoracis margine antico spinoso ocu- *orientalis.*  
lifero.

Lund. Aët. Hafn. S. N. 2. 2. 22. 4.

Rumph. Mus. tab. 2. fig. D.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Distinctus ab omnibus reliquis oculis in ipso margine spinoso thoracis. Squamae antennarum ciliato spinosae. Frons spinis duabus validis. Thorax scaber linea dorsali elevata dentibus tribus. Margo antice spinis quinque et inter anteriores tres oculi prominent.

- australis.* 5. *S. antennarum squamis rotundatis laevibus.*  
 Ent. syst. 2. 477. 2. \*  
 Habitat in Oceano australi Mus. D. Banks.  
 Species haud rite nota.

**PALINURUS.** *Antennae quatuor inae-*  
*quales pedunculatae:*  
*pedunculo articulado*  
*simplici.*  
*interiores breuiores, se-*  
*taceae bifidae, muti-*  
*cae.*  
*exteriores longissimae,*  
*setaceae, aculeatae.*

\* *Spinis ocularibus simplicibus.*

- Homarus.* 1. *P. viridis albo punctatus abdominis segmentis*  
*fulco medio impresso:*  
*Aflacus Homarus* Ent. syst. 2. 479. 3.  
*Cancer Homarus* Linn, syst. Nat. 2. 1053. 74:  
 M. L. V. 457.  
 Rumph. Mus. tab. 1. fig. A.  
 Margr. Bras. 245. tab. 246.  
 Petiv. Amboi. tab. 6. fig. 1.  
 Seb. Mus. 3. tab. 21. fig. 5.  
 Penn. Zool. Brit. 4. tab. 11. fig. 22:  
 Habitat in Oceano Asiatico.  
*Antennae interiores variegatae. Pedes virides,*  
*albo maculatae: articulo ultimo piloso.*
- ornatus.* 2. *P. viridis lateribus albo maculatis, abdominis*  
*segmentis laevibus.*

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentis et vix distinctus.

Antennae posticae et pedes omnes coeruleae, albofasciatae. Sulcus in abdominis segmentis omnino deest.

3. *P. virescens* abdominis segmentis fascia postica *fasciatus*.  
ca alba.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Praecedentibus valde affinis at distinctus videtur. Abdomen virescens segmento singulo fascia postica distincta, integra alba.

\*\* *Spinis ocularibus subtus dentatis.*

- P. spinis ocularibus subtus dentatis rufus maculatus* *quadriconis*.  
abdominalibus albis.

*Astacus elephas* Ent. syst. 2. 479. 4.

*Cancer elephas* Herbst. Cancr. fig. 138.

Habitat in Americae meridionalis Insulis.

A reliquis omnino distinctus, minor. Antennae rufae petiolo anticarum valde aculeato. Spinae oculares quatuor: intermediis maioribus subtus dentatis, lateralibus multo inferioribus, brevioribus, inerimibus. Thorax valde aculeatus. Abdomen rufum, albo maculatum, segmentorum lateribus deflexis, elongatis, basi dilatatis, dentatis.

PALAEMON. *Antennae* quatuor inaequales, pedunculatae. *superiores* breviores, trifidae, fetaceae, lacinia intermedia brevior. *inferiores* longissimae, fetaceae, simplices.

- carcinus.* 1. P. chelis aequalibus porrectis muricatis, rostro adscendente antennarum squamis longiore. *Astacus carcinus*. Ent. syst. 2. 479. 6. *Cancer carcinus* Linn. syst. Nat. 2. 1051. 64. Rumph. Mus. tab. 1. fig. B. Sloan. Jam. 2. 271. tab. 245. fig. 2. Seb. Mus. 3. tab. 21. fig. 4. Habitat in Americae fluviis. Corpus amoene coerulco variegatum. Pedes laenes.
- Lar.* 2. P. chelis porrectis aequalibus muricatis, rostro recto antennarum squamis aequante. Habitat in India Dom. Daldorff. Statura praecedentis at paullo minor. Thorax laevis antice utrinque dentibus duobus acutis. Rostrum compressum, rectum, ferratum. Pedes muricati.
- longimanus.* 3. P. chelis porrectis inaequalibus laevibus, rostro recto antennarum squamis aequante. Habitat in India orientali Dom. Daldorff. Praecedentibus minor. Thorax laevis antice dentibus utrinque duobus. Chelae filiformes,



porrectae, laeues sinistra semper longiore.  
Pedes laeues.

4. P. chelis medioeribus: digitis manu breviori *brevimanus*.  
bus, rostro adscendente antennarum squamis longiore.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Præcedentibus minor. Rostrum compressum, utrinque ferratum, adscendens, antennarum squamis longius. Thorax laevis, glaber, antice utrinque bidentatus. Chelae filiformes pedibus paulo longiores, laeues digitis manu brevioribus.

5. P. chelis medioeribus: digitis manu breviori *coromandelianus*.  
bus, rostro antennarum squama aequante.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et summa affinitas præcedentis, cuius forte mera varietas. Differt tantum rostro breviori, chelarumque digitis brevioribus.

6. P. chelis longioribus filiformibus: manibus *tranquebaricus*.  
ovatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus magnitudine P. squilla. Rostrum adscendens antennarum squamis paulo longius, dorso ferratum. Thorax laevis vix dente antice notatus. Chelae longitudine corporis, filiformes, tenuissimae, laeues manibus crassioribus digitis eiusdem longitudinis. Pedes filiformes, laeues.

7. P. thorace laevi, rostro supra ferrato subtus *squilla*.  
tridentato, thoracis margine quinquedentato.

*Astacus squilla* Ent. syst. 2. 485. 23.

*Cancer squilla* Linn. syst. Nat. 2. 1051. 66. Fn.

Su. 2037. Seb. Mus. 3. tab. 21. fig. 9. 10.

Habitat in Oceano Europaeo.

*locusta.* 8. P. thorace laevi, rostro porrecto supra ferrato  
subtus laevi, digitis elongatis filiformibus.

*Astacus locusta* Ent. syst. 2. 486. 24.

*Cancer locusta* Linn. syst. Nat. 2. 1051. 65.

Habitat in Oceano Mus. Dom. Banks.

*ferratus.* 9. P. thorace laevi subcarinato, rostro utrinque  
ferrato. Ent. syst. 2. 486. 25. \*

Habitat in Oceano Norwegico D. Prof. Vahl.

*fucorum.* 10. P. thorace laevi, rostro ascendente apice  
quinquedentato.

Habitat in Oceani Fucis natante Dom. Daldorff.

Corpus P. squilla duplo minus. Thorax laevis,  
Rostrum laeue, apice quinquedentatum.

**ALPHEUS.** *Antennae* quatuor pedunculatae, inaequales, setaceae.

*interiores* breuiiores, bifidae.

*exteriores* longiores, simplices: pedunculi primo articulo basi squamifero.

*avarus.* 1. A. chelis inaequalibus difformibus, rostro breui subulato.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo P. squilla. *Antennae* interiores coerulecentes. Thorax laevis an-

rice rostro breui, acutissimo. Chelae quatuor: anteriores maiores, inaequales, dextra carpo brevissimo, rotundato, manu maxima, compressa, dorso bisinuata digitis brevibus, crassis, sinistra paullo longiore, tenuiore digitis longioribus, posteriores tenuissimae, filiformes.

2. A. chelis inaequalibus difformibus: manu sinistra minore filiformi.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Nimis praecedenti affinis et forte mera eius varietas. Differt tantum manu sinistra filiformi digitis aequalibus.

3. A. chelis inaequalibus difformibus, thorace rapax, antice carinato, rostro subulato.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura praecedentium at distinctus. Thorax laevis, glaber, antice carinatus, quae carina in rostrum breue, subulatum transit. Chelae quatuor altera mox dextra, mox sinistra manu maiore, compressa, laevi digitis brevibus, compressis, altera manu paullo minore, compressa digitis longioribus, intus pilosis, hiantibus, chelae posticae tenuissimae, filiformes.

4. A. chelis inaequalibus difformibus: altera pal-malabarica breui digitis longissimis filiformibus, cus.

*Astacus malabaricus* Ent. syst. 2. 483. 16.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Corpus praecedentibus minus thorace laevi rostro brevissimo, acuto, chela altera manu

magna, compressa pollice incurvato, acuto, altera palma minuta digitis longissimis, filiformibus, parallelis, intus pilosis, apice fetigeris.

**ASTACUS.** *Antennae* quatuor pedunculatae, inaequales, setosae.

*interiores* breviores, bifidae.

*exteriores* simplices: pedunculi primo articulo apice spinoso.

\* *Chelis* sex.

- marinus.* 1. A. thorace laevi, rostro lateribus dentato: basi supra dente duplici. Ent. syst. 2. 478. 1. 2.  
*Cancer gammarus* Linn. syst. Nat. 2. 1051. 62.  
 Fn. Su. 2033.  
 Bast. subsc. 2. 6. tab. 1.  
 Penn. Zool. Britann. 4. tab. 10. fig. 21.  
 Habitat in Oceano frequens.
- fluviatilis.* 2. A. thorace laevi, rostro lateribus dentato, basi dente utrinque unico. Ent. syst. 2. 478. 2.  
*Cancer Astacus.* Linn. syst. Nat. 2. 1051. 63.  
 Fn. Su. 2034.  
 Degeer Inf. 7. 365. 1. tab. 20. fig. 1.  
 Roess. Inf. 3. tab. 54. 55.  
 Sulz. Inf. tab. 23. fig. 151.  
 Penn. Zool. Britann. tab. 15. fig. 27.

Habitat in Europae lacubus, fluviis.

3. A. thorace laevi, rostro breui, acuminato, car- *Bartonii*.  
pis dentatis.

Habitat in America boreali Prof. Smith Barton.

- A. fluuiatili minor. Thorax laevis, punctatus lateribus antice parum scabris. Rostrum breue, planum, apice acuminatum. Chelae sex anticis maioribus, brachiis ferratis. Carpis dentatis, manibus ouatis, lacuibus, punctatis, reliquis quatuor filiformibus.

\*\* *Chelis quatuor.*

4. A. thorace antrorsum aculeato, manibus prismaticis: angulis spinosis. Ent. syst. 2. 485. 22.

*Cancer norwegicus*. Linn. syst. Nat. 2. 1053. 73.

Fn. Su. 2039. Mus. Lud. Ulr. 456.

Degeer Inf. 7. 398. 3. tab. 24. fig. 1.

Seb. Mus. 3. tab. 21. fig. 3.

Penn. Zool. Brit. 4. tab. 12. fig. 24.

Habitat in mari Norwegico.

5. A. thorace antice scabro, rostro breui subulato, chelis anticis oblongis pilosis. *scaber*.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Praecedente minor. Rostrum breue, subulatum, acutum. Thorax scaber dorso antico spinoso spinis utrinque duabus, maioribus, validioribus. Chelae quatuor, anticae maiores brachiis utrinque dentatis, carpis breuibus, subtus dentatis, manibus oblongis, scabris, hirtis, posticae breuiores, filiformes.

- fulvus.* 6. A. thorace laevi, rostro breui utrinque ferrato, manibus compressis utrinque crenatis. Ent. syst. 2. 480. 7. \*
- Habitat in Oceano.
- coerulescens.* 7. A? thorace laevi, rostro porrecto subulato bidentato, corpore coerulescente. Ent. syst. 2. 480. 8 \*.
- Habitat in Pelago inter Tropicos Dom, Banks.
- fulgens.* 8. A? rostro breuissimo subulato, inermi, corpore albido subdiaphano. Ent. syst. 2. 480. 9. \*
- Habitat in Oceano Brasiliam alluente noctu fulgens. Mus. Dom. Banks.

**PENAEUS.** *Antennae* quatuor inaequales, setaceae, pedunculatae se inuicem super impositae.

*superiores* breuiiores, bifidae.

*inferiores* longissimae, simplices, pedunculi articulo primo apice squama bifida: lacinia exteriori spinosa.

- monodon.* 1. P. rostro porrecto ascendente supra ferrato subtus tridentato.

Habitat in Oceano Indico edulis Dom. Daldorff. Corpus maiusculum, variegatum. Thorax laevis dentibus anticis utrinque duobus. Ro-

strum porrectum, ascendens, supra ferratum, subtus tridentatum. Chelae sex filiformes posticis longioribus.

2. P. rostro recto porrecto supra ferrato subtus *monoceros*, ciliato.

Habitat in Oceano Indico esculentus Dom. Daldorff.

Praecedenti affinis at triplo minor et differt rostro omnino recto subtus inermi,

3. P. rostro breui ferrato, antennis superioribus *planicornis*, compressis.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

Distinctus a reliquis antennis superioribus bifidis breuibus, compressis. Inferiores mihi desunt. Rostrum breue, compressum, supra ferratum. Thorax laevis utrinque dente antico eleuato. Pedes omnes filiformes.

**CRANGON.** *Palpi* exteriores porrecti, ciliati, bifidi: lacinia exteriori breuiore, flabeliformi.

*Antennae* quatuor pedunculatae, inaequales.

*interiores* breuiore, bifidae.

*exteriores* longissimae, fetaceae pedunculo squama ciliata suffulto.

1. C. thorace aculeato, pedibus secundi tertii *boreas*, que paris filiformibus.

*Aflacus boreas*. Ent. syst. 2. 483. 18. \*

*Cancer boreas* Phipps It. boreal. 190. tab. 12.  
fig. 1.

Habitat in Oceano boreali Mus. D. Banks.

*vulgaris*. 2. *C. thorace laeni*, rostro breui integerrimo.

*Aflacus Crangon* Ent. syst. 2. 485. 26.

*Cancer Crangon* Linn. syst. Nat. 2. 1052. 67.

Fn. Su. 2038.

Bast. subf. 2. 27. tab. 3. fig. 1—4.

Seb. Mus. 3. tab. 31. fig. 8.

Roef. Inf. 3. tab. 63. fig. 1. 2.

Penn. Zool. Britann. 4. tab. 15. fig. 30.

Herbst. Cancer. tab. 29. fig. 4.

Habitat in mari balthico.

*margina-* 3. *C. rostro breui compresso subulato*, abdomi-  
*tus.* nis margine basi argenteo.

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo omnino *Crangon vulga-*  
*ris* ac distinctus margine abdominis ultra di-  
midium argenteo.

---

Pedes octo filiformes. Chelae manu ouata ungue  
arcuata, acutissima, mobili.



PAGURUS. *Antennae* quatuor pedunculatae.

*interiores* filiformes: articulo ultimo bifido, pedunculo uniarticulato, spinoso.

*exteriores* setaceae.

1. P. thorace futuris quadrifido, cauda simplici *Latro*.  
 subtus ventricoso Ent. syst. 2. 468. 1.  
*Cancer Latro* Linn. syst. Nat. 2. 1049. 56.  
 Rumph. Mus. tab. 4. fig. H. I.  
 Seb. Mus. 3. tab. 21. fig. 1. 2.  
 Habitat in Indiae orientalis cryptis rupium, terrestribus, nocturnus.
2. P. parasiticus thorace ovato: lateribus ciliatis, *aniculus*.  
 pedibus rugosis hirtis. Ent. syst. 2. 468. 2.\*  
 Habitat in Oceano australi Mus. Dom. Banks.
3. P. parasiticus chelis muricatis: dextra maiore. *Bernhardus*.  
 Ent. syst. 2. 469. 3.  
*Cancer Bernhardus* Linn. syst. Nat. 2. 1049. 57.  
 Mus. Lud. Ulr. 454. Fn. Su. 2032.  
 Degeer Inf. 7. 405. 4. tab. 23. fig. 5. 6.  
 Penn. Zool. Brit. 4. tab. 17. fig. 38.  
 Ionst. exsangu. tab. 7. fig. 6. 12.  
 Swamm. Bibl. Nat. tab. 11. fig. 1. 2.  
 Bast. subsc. 1. 74. tab. 10. fig. 3. 4.  
 Habitat in Oceano Europaeo intra testas Cochlearum, quas vacuas intrat trahitque, mutatas, prout adolescit.

- hungarus.* 4. *P. parasiticus* chelis hirtis apice atris: dextra maiore, corpore rubro fasciato. Ent. syst. 2. 469. 4. \*  
*Cancer hungarus* Herbst. Cancr. fig. 122.  
 Habitat in India orientali.
- Diogenes.* 5. *P. parasiticus* chelis muricatis pubescentibus: sinistra maiore. Ent. syst. 2. 469. 5.  
*Cancer Diogenes* Linn. syst. Nat. 2. 1049. 58.  
 Rumph. Mus. tab. 5. fig. K. L.  
 Catesb. Carol. 2. tab. 33. fig. 1. 2.  
 Kaempf. Jap. tab. 13. fig. 7.  
 Habitat in Oceano americano, asiatico intra Cochlearum testas.
- miles.* 6. *P. parasiticus* chela sinistra maiore utrinque muricata, pedum unguibus longissimis ferratis. Ent. syst. 2. 470. 6.  
*Cancer miles* Herbst. Cancr. fig. 114.  
 Habitat in India orientali.
- custos.* 7. *P. parasiticus* chela sinistra maiore: manu laeviuscula, pedum unguibus longissimis laevibus.  
 Habitat in India orientali Dom. Daldorff.  
 Nimis affinis praecedenti, differt tamen corpore minus hirtio, manibus laeviusculis nullo modo spinosis unguibusque vix ferratis.
- diaphanus.* 8. *P. parasiticus* depressus chela sinistra maiore laeviuscula, carpis dorso dilatatis.  
 Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.  
 Statura praecedentis at duplo minor et depressus. Chela sinistra maior manu compressa

margine inferiori ferrato, carpisque submuricatis margine dorsali dilatato, angulato. Pedes glabri unguis lacuissimis.

9. *P. parasiticus* thorace laevi integerrimo com- *clypeatus*.  
 presso, chela sinistra maiore pedibusque punctatis. Ent. syst. 2. 470. 7. \*  
*Cancer clypeatus* Herbst. Cancr. fig. 116. 117.  
 Habitat in India orientali.
10. *P. parasiticus* chelis scabris subaequalibus, pe- *eremita*.  
 dibus sex anterioribus pollicatis. Ent. syst. 2.  
 470. 8.  
*Cancer eremita* Linn. syst. Nat. 2. 1049. 59.  
 Habitat in mari Italico intra tophum suberosum, subrotundum, apertura transuersali.
11. *P. parasiticus* subcylindricus testa punctis ex- *tubularis*.  
 cauatis; Ent. syst. 2. 470. 9.  
*Cancer tubularis* Linn. syst. Nat. 2. 1050. 60.  
 Habitat in Serpulae glomeratae testa maris mediterranei.
12. *P. parasiticus* chelis muricatis aequalibus ocu- *oculatus*.  
 lorum pedunculis thoracis longitudine. Ent.  
 syst. 2. 471. 10. \*  
 Habitat in Murice Brandaris Oceani.  
 Chelae muricatae.
13. *P. parasiticus* manibus laeuibus trialatis: dex- *alatus*.  
 tra maiore. Ent. syst. 2. 471. 11. \*  
 Habitat in Islandiae Bullis Dr. Koenig.
14. *P. parasiticus* chelis aequalibus muricatis, pe- *ophthalmi-*  
 dibus fasciculato pilosis, oculis clauatis. *cus*.  
 Habitat in Oceano Indico D. Daldorff,

Corpus magnitudine et statura P. oculati. Oculi magni pedunculo breuiore, tenuiore basi squamula parua acuta. Chelae breues, aequales, rufo hirtae valdeque muricatae. Pedes fasciculato pilosi.

*araneiformis.* 15. P. parafiticus chelis scabris, cauda apice callosa, unguiculata. Ent. syst. 2. 471. 12.

Habitat in fissuris rupium maris Edimburgici intrans helices et turbines.

**GALATHEA.** *Antennae* quatuor inaequales, pedunculatae. *interiores* breues, filiformes, triarticulae: articulo ultimo bifido; lacinia inferiore setacea, multiarticulata, superiore falcata. *exteriores* setaceae: pedunculo simplici.

*strigosa.* 1. G. thorace antrorsum rugoso spinis ciliato, rostro acuto septem dentato. Ent. syst. 2. 471. 1.  
*Cancer strigosus* Linn. syst. Nat. 2. 1052. 69.  
 Degeer Inf. 7. 393. 2. tab. 23. fig. 1.  
 Column. Aquatic. 8. tab. 6.  
 Ionst. Exsangu. tab. 2. fig. 7.  
 Barr. rar. tab. 1288. fig. 1.  
 Seb. Mus. 2. tab. 19. fig. 19. 20.  
 Act. Helv. 4. 23. tab. 2. fig. 1. 2.  
 Penn. Zool. Brit. 4. tab. 14. fig. 26.

Sulz. Hist. Inf. tab. 22. fig. 1.

Habitat in Oceano Europaeo.

2. *G. thorace rugoso antice ciliato spinoso, rostro rugosa. tridente, manibus filiformibus.* Ent. syst. 2.

472. 2.

*Cancer Bamffius* Penn. Zool. Brit. 4. tab. 14.

fig. 27.

Habitat in mari mediterraneo.

3. *G. thorace rugoso ciliato, rostro tridentato, gregaria. palpibus anticis elongatis.* Ent. syst. 2. 473. 3.\*

Habitat in Oceano Americano Patagoniam alluente unde saepe mare eruentum videtur. Praecedentibus multo minor.

4. *G. thorace laevi, rostro brevissimo emarginato, pedibus inter mediis longissimis.* Ent. syst. 2. 473. 4.\*

Habitat in Oceano Brasiliam alluente, noctu fulgens Mus. Dom. Banks.

**SQUILLA.** *Antennae* quatuor subaequales, pedunculatae.

*interiores* longiores, trifidae.

*exteriores* simplices: pedunculo bifido.

1. *S. pollice falcato rodentato, corpore laevissimo, cauda utrinque quadridentata.* Ent. syst.

2. 511. 1.\*

Rumph. Mus. tab. 3. fig. 2.

Habitat in India orientali.



- mantis.* 2. *S. pollice falcato sexdentato corpore subangulato, cauda ferrato spinosa.* Ent. syst. 2. 511. 2.  
*Cancer Mantis* Linn. syst. Nat. 2. 1084. 76. Fn. Su. 2035.  
 Degeer Inf. 7. 533. 5. tab. 34. fig. 1.  
 Margr. Bras. 186. tab. 187.  
 Seb. Mus. 3. tab. 20. fig. 2. 3.  
 Habitat in mari asiatico, mediterraneo.
- raphidea.* 3. *S. pollice falcato octodentato, palmis intus ferrato spinosis.*  
 Habitat in Oceano Indico D. Daldorff.  
 Statura et magnitudo omnino praecedentis.  
 Differt tamen palmis ferratis spinisque longioribus armatis polliceque octodentata. Corpus utrinque striis duabus eleuatis. Cauda ferrato spinosa.
- phalangium.* 4. *S. pollice falcato quinquentato: dente tertio quintoque longioribus, corpore laeui.*  
 Habitat in India orientali Dom. Daldorff.  
 Corpus *S. Mantis* paullo minor, laeue, glabrum ultime segmento spinoso ferratum.
- ichneumon.* 5. *S. pollice falcato quadridentato cauda margine nodoso spinoso.*  
 Habitat in India orientali D. Daldorff.  
 Praecedente adhuc minor. Corpus utrinque lineis tribus eleuatis. Cauda rotundata spinis crassis nodosis ciliata.
- scyllarus.* 6. *S. manibus rectis ventricosis, angulatis: pollice tridentato.* Ent. syst. 2. 512. 3.

*Cancer feyllarus* Linn. syst. Nat. 2. 1054. 77.

Seb. Mus. 3. tab. 20. fig. 6.

Habitat in mari asiatico.

7. *S. pollice falcato tridentato abdominis segmen- ciliata.*  
tis duobus ultimis spinoso ciliatis. Ent. syst.

2. 512. 4. \*

Habitat in Oceano Indico D. Spengler.

8. *S. pollice subulato basi nodosa rufa.* Ent. syst. *chiragra.*

2. 513. 5. \*

*Squilla arenaria* Rumph. Mus. tab. 3. fig. F.

Habitat in Oceano australi Mus. D. Banks pol-  
lice acutissimo vulnerans.

9. *S. thorace laevi carinato: angulis subulatis, vitrea,*  
pollice falcato subulato inermi. Ent. syst. 2.

513. 6. \*

Habitat in Oceano atlantico Mus. D. Banks.

POSYDON. *Palpi* exteriores foliacei  
apice unguiculati.

*Antennae* quatuor setaceae  
pedunculo simplici.

*interiores* breuiores, bis-  
fidae.

1. *P. cauda heptaphylla: foliolo intermedio trans-depressus;*  
uerso truncato.

Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff.

---

Corpus crassa tenuiore subpellucida.

Oculi orbiculati pedunculis in medio marginis ex-  
terioris immerfi. Pedunculi depressi, squamaeformes;

*cylindrus*. 2. P. cauda pentaphylla: foliolo medio triangulari.

*Astacus cylindrus* Ent. syst. 2. 483. 15. \*

Habitat in Oceano Indico.

**GAMMARUS.** *Antennae* quatuor simplicissimae, pedunculatae:

*anticae* breues, subulatae.

*posticae* setaceae.

*Homari*. 15. G. corporis segmentis dorso subspinosis, cauda fasciculata: stylis ferratis.

*Astacus Homari* Ent. syst. 2. 481. 10.

Stroem. Act. Hafn. 10. 5. tab. 2.

Myll. Zool. Dom. 197. 2358.

Habitat in Oceano Norwegico.

*Antennae* simplices haud bifidae.

uniarticulati, approximati super antennarum interiorum basin porrecti, triangulares: margine postico longiore exteriore arcuato.

Chelae quatuor, compressae absque pollice mobili: anterioribus maioribus, inaequalibus, dissimilibus, maiore mox dextra, mox sinistra. Pedes compressi inaequales, intermedii longiores.



---

CLASSIS XI.  
GLOSSATA.

OS LINGVA SPIRALI INTER PALPOS  
REFLEXOS.

---

LITHOSIA.

*Os* palpis linguaque spirali.

*Clypeus* brevis, rotundatus.

*Palpi* duo breves, in cantho oculorum reflexi, biarticulati: articulo primo compresso, piloso, secundo paullo tenuiori, falcato, obtusifuculo.

*Lingua* spiralis tenuis, membranacea, thorace paullo longior.

*Antennae* multiarticulatae, fetaceae.

GALLERIA.

*Os* palpis linguaeque spiralis rudimento.

*Clypeus* fasciculo pilorum longitudine palporum.

*Palpi* duo breves, reflexi, uniaarticulati, basi cylindrici, nudi, apice incrassati, pilosi, oblique truncati.

*Linguae* rudimentum inter palpos bifidum.

*Antennae* fetaceae, multiarticulatae: articulo primo crassiori, cylindrico.

---



---

## PHYCIS.

Os palpis quatuor linguaque spirali.

*Clypeus* brevis, pilosus, integer.

*Palpi* inaequales.

*anteriores* breviores, incurvi, triarticulati: articulo primo crassiori, secundo longiori, incurvo, tertio breviori subulato.

*posteriores* elongati, recurvi, biarticulati: articulis aequalibus, primo crassiori, compresso, piloso, secundo cylindrico obtusiusculo.

*Lingua spiralis* brevis, membranacea.

*Antennae* setaceae, multiarticulatae.

## CRAMBUS.

Os palpis linguaque spirali.

*Clypeus* brevis, pilosus, integer.

*Palpi* quatuor inaequales.

*anteriores* multo breviores, uniarticulati basi cylindrici, apice incrassati, oblique truncati.

*posteriores* porrecti, conniuentes, rostriformes, triarticulati: articulo secundo longissimo, ultimo brevi, subulato.

*Lingua spiralis* brevis, membranacea.

*Antennae* setaceae, multiarticulatae.

## TINEA.

Os palpis linguaque spirali.

*Clypeus* brevis, pilosus, integer.

*Palpi* quatuor inaequales.

*anteriores* breves, cylindrici, uniarticulati.

*posteriores* porrecti, arcuati, corniformes, biarticulati: articulis aequalibus: primo crassiori, compresso, villoso, obtuso, secundo tenuiori, setaceo, acuto.

*Lingua spiralis* brevis, membranacea.

*Antennae* setaceae.

## ALUCITA.

Os palpis linguaque spirali.

*Chypeus* brevis, pilosissimus, integer.

*Palpi* duo elongati, recurvi, extus hirsutissimi, cylindrici, triarticulati: articulo secundo longiori, ultimo apice setaceo.

*Lingua spiralis* brevis, membranacea.

*Antennae* elongatae, setaceae.

## YPSOLOPHUS.

Os palpis linguaque spirali.

*Palpi* duo valde porrecti, basi cylindrici, medio dilatati, compressi, versus apicem attenuati, canaliculati, acuti. In medio insertus unguis elongatus, arcuatus, tenuis, acutus, in canale palpi recondendus.

*Lingua* brevis, membranacea.

*Antennae* filiformes.

PAPILIO. *Palpi* duo reflexi.  
*Lingua* spiralis exserta.  
*Antennae* capitatae.

*Manlius.* 30—1. P. E. T. alis dentatis caudatis atris viridi maculatis: posticis subtus striga macularum albarum.

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Affinis videtur P. Phorbanta. Alae anticae supra atrae macula magna media transuersa et una alteraue apicis viridibus, subtus nigrae, immacolatae. Posticae supra macula magna media, nervis diuisa strigaque posticae punctis viridibus. Subtus striga e maculis paruis approximatis punctoque ad angulum ani albis.

*Grachus.* 30—1. P. E. T. alis dentato caudatis atris viridi maculatis: posticis subtus fascia sesquialtera glauca.

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Caput nigrum punctis quatuor albis. Alae anticae supra atrae macula magna, viridi, nervis diuisa in medio, et quinque minoribus, sensim decrescenibus, transuersim positae pone medium, subtus nigrae fascia obsoleta, glauca. Posticae supra macula magna repanda in medio maculisque flexuosis versus apicem viridibus, subtus nigrae fascia media abbreviata posticaque repanda glaucis.

180—1. P. F. alis integerrimis concoloribus nigris basi albo striatis apice punctatis. *Eryx.*

Habitat Cajennae.

Affinis certe P. similis at distinctus videtur duplo minor. Caput et thorax nigra, albo punctata. Alae omnino integrae, concolores, basi striatae, apice punctatae.

184—5. P. F. alis integerrimis nigris: anticis albo punctatis, posticis ante apicem albis. *Euphon.*

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Medius. Caput et thorax nigra, albo punctata. Alae anticae concolores, nigrae, versus apicem albo punctatae. Posticae supra nigrae fascia lata ante apicem strigaeque punctis apicis albis. Subtus fuscae, concolores at basi albo punctatae et in medio puncta quinque minuta alba annulo paruo nigro cincta.

184—5. P. F. alis repandis atris: anticis flavo punctatis, posticis fascia strigisque duabus punctatis flavis. *Phoedon.*

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Statura praecedentis at minor et alius. Antennae nigrae. Caput et thorax atra, albo punctata. Alae anticae concolores, atrae, apice flavo punctatae. Posticae supra atrae maculis duabus marginalibus, fascia lata medii et punctis apicis flavis in duplici serie, subtus concolores at pallidiores, basi atrae albo punctatae et margo interior totus flavus.



*interrogati-* 243—4. P. N. alis caudatis fulvis nigro macula-  
*onis,* tis, subtus glaucis: striga punctorum nigro-  
rum, posticis e aureo notatis,

Habitat in America boreali.

Nimis affinis P. C. aureo at paullo maior et alae  
subtus glaucae striga punctorum nigrorum,

*Hierta.* 281—2. P. N. alis denticulatis luteis margine ni-  
gris: omnibus ocellis duobus, posticis basi  
fulcis.

Habitat in India orientali.

Statura et summa affinitas P. Oenone, cuius  
varietatem olim credidi at distinctus videtur.  
Corpus fuscum. Alae omnes flavae margine  
crassiori sinuato, fusco, postico fusco strigo-  
so. Oculi duo in singula ala: postico anti-  
carum maiori. Posticae basi fuscae. Sub-  
tus anticae concolores, posticae cinereae,  
fusco strigosae punctis quatuor ocellaribus.

*Larinia.* 284—5. P. N. alis angulato dentatis variegatis:  
omnibus supra ocellis duobus, anticis subtus  
unico, posticis griseis coecis.

*Papilio Larinia* Cram. Pap. 2, tab, 21. fig. C. D.  
Habitat in India.

Statura et magnitudo omnino P. Orythia, cuius  
varietatem olim credidi. Alae anticae supra  
fuscae maculis fulvis fasciisque duabus pal-  
lidis: ocellis duobus, subtus variegatae ocel-  
lo unico. Posticae supra basi atrae, apice  
coeruleae ocellis duobus magnis margine-  
que strigoso, subtus obscure griseae.

284—5. P. N. alis dentatis fuscis rufo flauoque *Efra.*  
 variis: omnibus supra ocello sesquialtero:  
 anticis subtus unico, posticis obscuris coecis.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Differre a praecedente videtur. Alae vix angu-  
 latae haud atrae, sed fuscae. Ocellus alter  
 in pagina superiore minutus. Alae posticae  
 haud coeruleae, subtus obscurae.

334—5. P. N. alis rotundatis fusco hyalinis: po- *Rhea.*  
 sticis punctis quinque ocellaribus albis.

*Papilio Lena* Ent. syst. 3. 108. 334. β

Habitat in America meridionali.

400—1. P. N. alis repandis fuscis: fascia commu- *Frobenia,*  
 ni fulua anticarum interrupta.

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Magnitudo et statura P. Heliodore. Corpus ni-  
 grum, immaculatum. Alae fuscae fascia po-  
 stica, communi, fulua anticarum e maculis  
 tribus, subtus concolores at pallidiores.

454—5. P. N. alis dentatis fuluis atro maculatis, *Hegzsa,*  
 posticis subtus flauis: striga punctis quatuor  
 uorum ocellatorum,

Habitat in America,

Statura et summa affinitas P. Phalaena. Alae  
 supra fuluae maculis strigisque punctis quatuor  
 anticarum flauae, nigro maculatae, posticae  
 sulphureae lunulis fuluo nigris punctis quatuor  
 striga e punctis ocellatis fuluis, quatuor ocellis  
 coecis,

*Blastus.* 488 — 9. P. N. alis integerrimis fuscis supra immaculatis, subtus anticis ocellis tribus, posticis septem.

Habitat in India orientali.

Corpus paruum, fuscum. Alae omnes integerrimae, supra fuscae, immaculatae. Subtus vix pallidiores striga media obliqua, alba. Anticae pone strigam ocellis tribus atris iride flavescente pupillaque alba, intermedio minuto. Ocelli annulo communi reniformi includuntur. Margo strigosus. Posticae ocellis septem inaequalibus strigis duabus undatis utrinque cocinibus cinereis inclusis. Margo strigosus.

*Fabia.* 587 — 8. P. D. alis integerrimis albis: anticis puncto apiceque nigris, posticis cinereis immaculatis.

Habitat in Americae Insulis.

Corpus medium, cinereum. Alae anticae albae puncto paruo medio margineque apicis albis. Posticae cinereae, immaculatae. Subtus omnes cinereae.

*Ilea.* 587 — 8. P. D. alis integerrimis albis: anticis puncto apiceque nigris, subtus omnibus cinereis: puncto minuto ferrugineo.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Omnino distinctus a P. Fabia duplo minor. Alae omnes supra albae anticis puncto apiceque nigris, posticis immaculatis. Subtus omnes cinereae puncto medio minuto, ferrugineo.



595—6. P. D. alis integerrimis albis: anticis margine exteriori nigro venoso, postico nigro flavo punctato. *Cassida*.

Habitat in India orientali.

Magnitudo P. Sinapis. Alae anticae albae margine exteriori strigis duabus nigris, quae in medio coeunt et postice iterum ad marginem exteriorem nigrum extenduntur. Margo posticus niger punctis tribus flavescentibus. Subtus albae stria atra, quae ante apicem puncto atro terminatur. Apex alae flavescentis. Posticae supra albae margine fuscescente, subtus flavescentes fusco obsolete venosae.

598—9. P. D. alis rotundatis integerrimis flavis *Libythea*, extimo nigris, subtus immaculatis.

*Papilio Nise* Cram. Pap. 2, tab. 20, fig. K. L.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et summa affinitas P. Hecabe, at alae subtus omnes immaculatae.

617—18. P. D. alis rotundatis albis: anticis apice posticis maculis sex margineque nigris. *Callirrhoe*.  
Mant. Inf. 2. 20. 215.

Habitat in India.

Varietatem sexus P. Leucippe credidit a Linné at vix rite. Corpus magnū, cinereum.

Alae anticae foedide albae apice nigrae macula magna, fulva, subtus albae apice marmoratae. Posticae albae margine maculisque sex ante marginem nigris. Subtus totae marmoratae.

*Larra.* 653—4. P. D. alis rotundatis integerrimis fulvis: margine nigro, subtus pallidioribus: punctis duobus argenteis.

Habitat in America.

Corpus magnum, nigrum, cinereo villosum. Alae supra fulvae, nitidae margine tenuissime nigro, subtus magis flavescentes strigis aliquot undatis brunneis punctoque medio gemino in anticis ferrugineo, in posticis argenteo.

*Titania.* 655—6. P. D. alis integerrimis rotundatis basi flavis apice albis, subtus griseis: posticis puncto gemino argenteo.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo P. Eubule. Corpus hirtum, cinereum antennis fulvis. Alae omnes basi flavae, tunc albae anticis apice parum nigris, posticis immaculatis. Subtus omnes griseae anticis puncto medio ferrugineo, posticis punctis duobus argenteis annulo ferrugineo cinctis: altero minore.

*Narcissus.* 672—3. P. S. alis integerrimis fuscis: area rufa, anticis utrinque ocello posticis duobus minutis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo P. Hyperbii. Antennae nigrae, albo annulatae. Alae anticae fuscae area rufa et in hac ocellus niger papilla alba, subtus concolores at pallidiores. Posticae supra fuscae area rufa ocellis duobus minutis.

tis pupilla alba, subtus basi obscurae apice pallidiores ocellis duobus minutis pupilla alba.

- 693—4. P. S. alis integerrimis fuscis: posticis supra ocellis duobus minutis, subtus sex; exteriori remoto. *Miris.*

Habitat in Germania.

Affinis certe P. Leander at distinctus videtur.

Alae anticae supra fuscae, immaculatae; subtus flavescentes ocellis tribus strigaque terminali, argentea, posticae supra fuscae ocellis duobus aut tribus minutis pupilla alba, subtus flavescentes ocellis sex exteriori remoto. Ante ocellos striga abbreviata alba, pone striga argentea fere terminalis.

**HESPERIA.** *Palpi* duo compressi, hirti, apice cylindrici, nudi.  
*Antennae* clava oblonga, saepius uncinata.

- 43—4. H. R. alis bicaudatis coeruleis: limbo fusco, subtus cinereis, posticis punctis duobus apicis atris. *Cippus.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura H. sphinx. *Antennae* nigrae. Alae supra cyanae, nitidae limbo inprimis in anticis fusco. Subtus cinerae, nitidae, anticae immaculatae, posticae striga postica obscuriore punctisque duobus magnis, atris. *Caudae* duae fetaceae, nigrae, apice albae.

*Longinus.* 77—8. H. R. alis caudatis cyaneis: limbo atro, subtus cinereis: posticis striga lunulari punctisque duobus atris.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino et magnitudo H. Cippi, at cauda tantum unica. Alae supra cyanae, nitidae limbo imprimis anticarum nigro. Subtus omnes cinerae, anticae immacolatae, posticae striga postica et lunulis nigris. Angulus ani punctis duobus atris. Cauda elongata, atra apice alba.

*Cnejus.* 100—101. H. R. alis caudatis coeruleo-cyanis: limbo fusco, subtus cinereis albo undatis: posticis punctis plurimis baseos duobusque apicis ocellaribus atris.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Affinis certe H. Strabo. Antennae nigrae clava acuminata. Alae omnes supra coeruleo-nitidae limbo fusco, posticae interdum fasciola rufa punctis atris, interdum immacolatae. Subtus cinerae albo undatae, posticae basi punctis quatuor subocellaribus atris. Angulus ani macula rufa et in hac puncta duo atra: iride aurea. Cauda apice albida.

*Eleus.* 180—1. H. R. alis emarginatis fuscis: anticis utrinque disco fulvo nigro punctato, posticis fasciola fulva, subtus cinereis nigro punctatis.

Habitat in Germania.

Affinis certe H. Helle at omnino distincta. Antennae fuscae, albo annulatae, clava oblon-

ga nigra, apice ferruginea. Alae anticae fuscae disco fulvo, nitido punctis maioribus nigris, subtus cinereae disco fulvo punctis subocellaribus atris. Posticae valde emarginatae et fere bicaudatae, fuscae, nitidae fascia abbreviata, dentata, fulva, subtus cinereae punctis minutis nigris strigaque postica obsoleta, fulva.

231—2. H. R. alis integerrimis fulvis nigro maculatis: posticis subtus fusco alboque variis. *Zachaeus.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Minutus. Alae omnes supra fulvae, nigro maculatae. Subtus anticae fuscae macula basos fulva fascia in medio flexuosa lunulisque apicis albis. Posticae albo fuscoque variae.

232—3. H. U. alis diuaticis fuscis: anticis macula strigaque maculari fulvis, posticis immaculatis. *Phocion.*

Habitat in America meridionali Dom. v. Rohr. Statura omnino H. Comma. Antennae obscurae clava nigra. Alae anticae fuscae macula magna oblonga, submarginali strigaque pone medium fulvis. Subtus concolores at pallidiores. Posticae immaculatae, supra fuscae, subtus griseae.

236—7. H. U. alis integerrimis diuaticis supra fuscis subtus brunneis: margine postico tenuissime fulvo. *Naso.*

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Daldorff.

Statura omnino H. Linea. Corpus supra nigrum subtus fulvum. Alae omnes supra fus-

cae, subtus brunneae, immaculatae margine postico tantum utrinque tenuissime fuluo.

*Bion.* 240—1. H. U. alis diuaticatis fuscis: anticis macula marginali, posticis disco fuluis.

Habitat in America meridionali Dom. v. Rohr.  
Statura parua praecedentium. Corpus fuscum ore albo. Alae anticae supra fuscae macula fere marginali fulua, subtus fuscae margine exteriori late fuluo. Posticae supra fuscae macula magna disci fulua, subtus cinerea margine interiori parum fuluo.

*Maro.* 242—3. H. U. alis integerrimis diuaticatis flauis apice fuscis flauo maculatis, posticis subtus fusco punctatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.  
Statura praecedentium. Corpus nigrum. Antennae supra fuscae, subtus flavae. Alae anticae supra basi flavae margine tenuiori fusco lineola flaua, apice fuscae maculis magnis flauis. Subtus concolores. Posticae fuscae puncto baseos discoque flauis. Subtus flavae, fusco punctatae.

*Ericus.* 267—8. H. U. alis subcaudatis fuscis: punctis anticis fenestratis minutis, posticis subtus macula postica flaueteente.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.  
Statura omnino H. Phocas. Caput grande palpis crassis, hirtis, apice cylindricis, nudis. Antennae uncinatae. Alae anticae fuscae punctis tribus fenestratis, minutissimis. Sub-

tus concolores at pallidiores. Posticae subcaudatae, supra immacolatae, subtus pallidiores macula ante marginem flavescente.

282—3. H. U. alis ecaudatis fuscis: anticis hyalino maculatis maculaque flava, posticis subtus cinereis atro punctatis. *Gremius.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo H. Thrax. Antennae uncinatae, nigrae. Corpus supra fuscum, subtus cinereum. Alae anticae concolores maculis hyalinis et versus marginem tenuiorem macula flava. Posticae supra fuscae, immacolatae, subtus cinereae punctis disci ocellaribus atris.

289—90. H. U. alis ecaudatis fuscis: anticis hyalino maculatis, posticis subtus striga interrupta alba. *Nero.*

Habitat in Americae Insulis.

Statura et magnitudo. H. Lucas. Alae anticae concolores, fuscae, hyalino maculatae, posticae supra immacolatae, subtus obscuriores striga media maculari alba.

289—90. H. U. alis ecaudatis fuscis: anticis utrinque hyalino maculatis, posticis subtus punctis albis. *Mathias.*

Habitat in India Dom. Daldorff.

Minor H. Lucas. Corpus fuscum, immaculatum. Alae anticae concolores, fuscae, hyalino maculatae, posticae fuscae, supra immacolatae, subtus punctis quinque albis.

*Flaccus.* 347—8. H. U. alis integerrimis reversis fuscis: anticis hyalino punctatis, posticis puncto fasciisque albis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus paruum, supra fuscum, subtus album.

Alae anticae fuscae punctis aliquot fenestratiss, subtus concolores, at pallidiores. Posticae reuersae, fuscae puncto fasciisque media, quae tamen margines haud attingit albis. Subtus pallidiores.

*Remus.* 348—9. H. U. alis integerrimis subreuersis nigris: posticis subtus fascia repanda alba: puncto fulco.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Corpus paruum, nigrum. Antennae uncinatae. Alae omnes supra uti anticae subtus nigrae, immacolatae, posticae subtus fascia repanda alba et in hac punctum paruum, fulcum.

SPHINX. *Palpi* duo reflexi, pilosi.

*Lingua* spiralis cornea, exserta.

*Antennae* squamatae.

*Lachesis.* 26—7. S. alis integris: posticis nigris luteo fasciatis, abdomine nigro flauo fasciato.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Nimis S. *Atropos* affinis at magis obscura. Alae subtus flavae puncto bascos ocellari fasciisque plurimis nigris.



56—7. S. alis integris cinereis: anticis nigro strigatis, posticis fasciatis, abdomine maculis lateralibus atris. *Abadonna.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino S. Conuoluuli at duplo minor. Antennae albae squamis fuscis. Caput album. Thorax albo nigroque varius. Abdomen cinereum maculis lateralibus atris. Alae cinerae maculis strigisque variis fuscis. Posticae cinerae fascis nigris. Subtus anticae obscurae, posticae cinerae strigis undatis, fuscis.

**BOMBYX.** *Palpi* duo compressi, reflexi.  
*Lingua* brevis, membranacea.

*Antennae* filiformes.

15—16. B. alis patulis: anticis obscuris, subtus ocello atro, posticis supra testaceis: ocello magno atro. *Eryx.*

Habitat in India Dom. Redouté.

Magna. Caput et thorax fusca. Alae anticae supra obscurae strigis duabus maculaque media obicurioribus, subtus magis ferrugineae ocello medio atro pupilla niuea strigaeque postica obscuriore. Posticae supra ferrugineae striga e lunulis nigris margineque postico obscuro. In medio ocellus maximus iride magna atra in medio obscurus maculis tribus magnis, atris: pupilla parua alba. Subtus subferrugineae puncto medio niueo.

- brunnea.* 45—6. B. alis subreuerfis brunneis: strigis ob-  
 feurioribus supra tribus, subtus duabus.  
 Habitat in India orientali Dom. Daldorff.  
 Corpus magnum, totum brunneum, immacu-  
 latum. Alae integrae, brunneae supra stri-  
 gis tribus anteriore obsoleta fuscis, subtus  
 pallidiores strigis duabus.
- lobolina.* 83—4. B. alis subreuerfis griseis: fasciis undatis  
 atris lunulaque centrali niuea.  
*Bombyx lobolina* Wien. Verz. 57. 6.  
 Klemann. 2. 79. 28. tab. 12.  
 Hybn. Beytr. 2. 1. tab. 2. fig. L. ♀  
 — — — tab. 3. fig. L. ♂  
 Esp. Pap. 3. 114. 27. tab. 22. fig. 5. 6.  
 — — — — tab. 82. fig. 3. 4.  
 Habitat in Europae Pino.  
*Larua* flauescens: incisuris violaceis lineolisque  
 lateralibus transuerfis atris.  
*Pupa* folliculata, glabra, brunnea.  
*Quies* 24dierum.
- cristata.* 94—5. B. alis deflexis cinereo fuscis albo strigo-  
 fis, thorace niueo: crista nigricante.  
 Habitat in noua Hollandia Dom. Weber.  
 Magna. Caput et thorax hirta, niuea, in me-  
 dio dorfi crista parum eleuata, oblonga, ni-  
 gricante. Abdomen cinereum. Alae de-  
 flexae, obscure cinerae strigis albis, dua-  
 bus; bafeos, duabus approximatis, undatis  
 pone medium unicaque versus apicem unda-  
 ta. Posticae cinerae margine albo.

134—5. B. alis deflexis brunneis: macula media *hepatica*.  
 fusca strigaeque postica punctorum ferrugineorum.

Habitat in Germania australiori.

Media. Caput et thorax hirta, brunnea. Antennae vix pectinatae. Abdomen supra pallidum, subtus brunneum. Alae anticae brunneae macula media obscuriore. Versus marginem posticum striga e punctis ferrugineis, distinctis subtus disco fusco. Posticae supra fuscae, subtus brunneae puncto medio strigaeque posticae fuscis.

140—1. B. alis deflexis niveis: posticis supra *virginica*, puncto anali, subtus puncto medio atris.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura et summa affinitas B. Menthastris. Caput et thorax nivea ore tantum fulvo. Abdomen niveum lineis tribus punctorum nigrorum lateribusque parum fulvis. Alae anticae niveae, immacolatae, posticae supra puncto ad angulum ani, subtus in medio atris. Pedes albi femoribus anticis supra fulvis puncto baseos atro.

141—2. B. alis deflexis testaceis fusco strigosis: *transversa*.  
 macula media transversa alba.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Media. Antennae pectinatae. Caput et thorax obscure testacea, immacolata. Alae anticae supra testaceae strigis quatuor margineque postico fuscis. In medio macula trans-

uerfa niuea. Posticae fuscae. Subtus omnes cinereae puncto medio strigaeque postica fuscis.

*discors.* 153—4. B. alis deflexis cinereis: posticis albis, antennis apice setaceis.

Habitat in Hungaria Mus. Dom. Bose.

Antennae pectinatae, apice setaceae. Caput et thorax hirta, nigricantia. Abdomen griseum. Alae anticae cinereae, maris fere immacolatae, faeminae obscuriores, fusco undatae et pone medium striga e punctis minutis nigro albis. Posticae albae. Pedes annulati.

*Venutia.* 158—9 B. alis deflexis fuscis: vitta flexuosa alba; punctis tribus ferrugineo nigris.

*Phalaena Venutia* Cram. Pap. tab. 165. fig. D.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Forte cum B. grata proprii generis at specimen nostrum mutilatum. Caput villosum, album. Thorax villosus, albus lineis quatuor fuscis. Abdomen flavum punctis dorsalibus nigris. Alae anticae supra nigrae vitta in medio flexuosa alba, quae tamen marginem haud attingit. In hac vitta puncta tria: anterioribus duobus minoribus, altero fusco altero fuluo, posteriori in medio maiori, transuerso subtus flavescentes: punctis tribus margineque postico fuscis. Posticae concolores puncto medio margineque postico fuscis.

*frida.* 179—80. B. alis deflexis flavis: lineola media margineque postico ferrugineis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo B. Ruffula. Antennae pectinatae apice fere testaceae, fuscae. Corpus flavum. Alae flavae lineola media atomisque paucis ferrugineis. Margo posticus tenuissime ferrugineus. Alae posticae uti omnes subtus albae.

196—7. B. alis atris: maculis albis, posticis flavis nigro maculatis. *Flauia*.

Fyesh. Magaz. 2. 1. tab. 1. fig. 11.

Habitat in Helvetiae montibus Dom. de Clairville.

Statura B. Caja. Thorax niger fascia antica alba. Abdomen rufum linea dorsali anoque atris. Alae atrae linea baseos strigae anticae iuncta, pone medium cruce flexuosa albis. Posticae flavae maculis aliquot atris. *Larva* atra pilis cinereis hirsuta.

204—5. B. alis deflexis fusco hyalinis immaculatis. *obscurata*.

Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.

Minor B. hyalinae. Antennae valde pectinatae. Alae omnes obscurae, fere hyalinae, immacolatae.

215—16. B. alis incumbentibus testaceis immaculatis. *testacea*.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Rustica media. Alae testaceae, supra immacolatae, subtus macula media fusca.

215—16. B. alis incumbentibus cinereo subhyalinis: lineola media transversa nigra. *perspicua*.

Habitat in India orientali.

Statura praecedentis. Antennae pectinatae. Alae obscure cinereae, fere hyalinae lineola media transuersa, fusca. Posticae uti omnes subtus parum pallidiores.

*zfrigata.* 219—20. B. alis incumbentibus griseis: strigis duabus undatis nigris.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Rustica parua, grisea. Antennae valde pectinatae. Alae omnes griseae, anticae supra strigis duabus undatis nigris, altera in medio, altera posteriori.

*elata.* 221—3. B. alis conuolutis atris coccineo alboque variegatis: posticis albis apice atris.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino B. bella. Antennae nigrae. Caput et thorax nigro alboque varia thoracis margine coccineo. Abdomen niuem subtus utrinque striga punctorum nigrorum anoque barbato fusco. Alae concolores, anticae atrae, coccineo maculatae, basi coccineae punctis atris iride alba, in medio maculae duae niueae, altera quadrata, altera lunata. Posticae niueae, apice atrae.

**COSSUS.** *Palpi* duo breuiffimi, cylindrici, reflexi.

*Lingua* spiralis nulla.

*Antennae* breues, filiformes.

7. **C. niueus** alis punctis numerosis transuersis *Verbasci*.  
cyaneis parique ferrugineo, thoracis dorso  
cruce cyanea.

Habitat Monspeliae in Verbasco. Dom. Broussonet.

Praecedentibus minor. Caput villosum, album ore nigro. Antennae valde pectinatae, albae. Thorax valde villosus albus cruce magna dorsali cyanea. Abdomen villosum, niueum stria laterali duabusque dorsalibus et punctis nigris. Alae niueae punctis paruis costalibus, duobus in medio maioribus transuersis marginis tenuioris, magna transuersa versus apicem cyaneis. Praeterea par punctorum ferrugineorum, altero ad costam ante maculam transuersam maiorem, altero ad angulum ani. Posticae niueae supra immacolatae, subtus puncto medio nigro. Pedes villosi, niuei, apice nudi, nigri.

**NOCTUA.** *Palpi* compressi, pilosi, apice cylindrici, nudi.

*Lingua* porrecta, cornea.

*Antennae* setaceae.

- 14—15. **N.** alis patulis eroso dentatis obscuro *erosa*.  
variis: anticis macula media flavescente.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus paruum, obscureum. Alae omnes eroso dentatae, basi cinereae striga undata, atra, in medio macula flavescentis annulo albo cincta, apice obscure variegatae. Subtus omnes variegatae, posticae apice glaucescentes.

*Nyctea.* 16—17. N. alis parvis fusco alboque variis: anticis linea spirali conuoluta, subtus ferrugineis fuscostrigosis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo omnino N. spiralis. Corpus variegatum abdomine fusco cingulis albis umbrisque rufis. Alae anticae variegatae linea media spirali. Margo posticus cinereus strigis undatis fuscis, subtus ferrugineae strigis duabus fuscis. Margo posticus fuscus, ferrugineo maculatus. Posticae fuscae fascia media alba: striga dentata alba. Margo posticus cinereus, nigro undatus. Subtus ferrugineae puncto strigis tribus strigaeque e punctis fuscis.

*niclitans.* 100—1. N. laevis alis deflexis fuscis: puncto medio ocellari coeruleo.

Habitat in India orientali.

*Melin.* Corpus cinereo fuscum. Alae cinereo fuscae vix striga una alteraque obscuriore. In medio punctum ocellare distinctum, coeruleum. Posticae subtus albae striga undata, fusca.

*turcica.* 100—1. N. laevis alis deflexis cinereis: lunula media atra.



Habitat in India orientali.

Statura praecedentis. Alae cinereae, vix strigiferae lunula magna media atra. Subtus griseae.

- 105—6. N. laevis alis deflexis nigris: anticis *mar-panthorina*.  
gine tenuiore et postico cinereis, posticis albo maculatis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura N. tigrinae at paullo minor. Corpus fuscum abdomine cinerascente. Alae anticae nigrae margine tenuiori et postico late cinerascente. Posticae nigrae maculis tribus duabusque marginalibus albis. Subtus pallidae, anticae fasciis duabus fuscis, posticis puncto medio striga fasciaque repanda nigris.

- 107—8. N. laevis alis deflexis nigris: fasciis duabus albis; posteriore angulata punctoque ocellari atro anguli ani. *angulata*.

Habitat in Friendly Islands Mus, Dom, Banks.

Statura et magnitudo N. geometricae. Corpus obscurum antennis palpisque albis. Alae nigrae fascia ante medium obliqua et altera pone medium angulata albis. Ad angulum ani punctum ocellare atrum. Posticae nigrae fascia alba. Subtus omnes fuscae fascia alba.

- 109—10. N. laevis alis deflexis atris nitidulis im-*madida*,  
maculatis,

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino *N. niueae*. Antennae subtus albae, supra nigrae. Corpus atrum, nitidum. Femora postica valde ciliata.

*gemina.*

132—3. *N. laevis* alis deflexis cinereis: fasciis duabus brunneis punctoque postico gemino atro.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo omnino *N. repandae*. Antennae nudeae. Caput et thorax cinerea. Alae anticae cinerae fascia lata ante medium brunnea. Fascia haec in medio pallidior puncto distincto brunneo margineque postico sinuato. Fascia altera latior, repanda apice puncto gemino atro. Posticae basi obscurae, apice pallidiores: fascia obscura. Subtus flavescentes striga obscuriore.

*obscura.*

136—7. *N. laevis* alis deflexis obscuris: striga postica punctata fusca, subtus cinereis immaculatis.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom. v. Rohr.

Statura media praecedentium. Corpus obscurum. Alae obscurae, apice pallidiores striga e punctis fuscis.

Subtus omnes cinerae, immaculatae.

*fasciata.*

137—8. *N. laevis* alis deflexis fuscis: puncto strigaeque albis, posticis subtus striga punctorum alborum.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura praecedentium. Corpus fuscum, subtus albidum. Alae longitudine corporis.

Palpi apice albi. Alae omnes supra fuscae aut cinereae, anticis puncto paruo centrali strigaque postica albis, posticis striga tantum albida. Subtus anticae concolores, posticae basi cinereae strigis undatis fuscis, apice fuscae striga punctorum alborum.

- 218—19. N. cristata alis deflexis cinereis: strigis *cinerago*, undatis obscurioribus, in medio fuscis: maculis ordinariis flavis:

Habitat Kihæ.

Media. Statura praecedentium. Corpus cinereum. Alae cinereae, nitidulae strigis 5—6. undatis obscurioribus. Media pars alae fuscescens maculis duabus flavis: anteriore minore orbiculata, posteriore reniformi laete flavis. Subtus cinereae.

- 218—19. N. cristata alis deflexis obscure flavis *ochrago*, fusco undatis punctoque medio fusco.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Parua. Antennae cinereae. Corpus cinereum. Alae anticae obscure flavescentes strigis undatis fuscis. In medio alae punctum magnum, obscurum. Posticae fusco cinereae.

- 273—4. N. cristata alis deflexis cinereo fuscoque *marmorea*, variis: macula oblonga bascos nigra.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.

Statura et magnitudo omnino N. Linariae. Caput et thorax grisea. Abdomen cinereum. Alae deflexae, cinereae, mox magis mox minus fusco variae. Ad basin marginis te-

nuioris macula subocellaris grisea et huic adiacet macula oblonga distincta nigra. Maculae ordinariae in medio, anterior oblonga, posterior maior reniformis. Posticae subtus albae puncto medio strigaeque posticae fuscis.

*dimidiata.* 274—5. N. cristata alis deflexis basi cinereis apice fuscis cinereo strigosis.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Parua. Corpus obscurum. Alae obscurae, basi cinereae, apice fuscae strigis plurimis, undatis, cinereis. Macula obscurior in medio in colore fuscescente. Posticae fuscae.

*pumila.* 275—6. N. cristata alis brunneis: macula media flavescente punctoque centrali atro.

Habitat Kiliae.

Statura et magnitudo N. Pisi. Caput et thorax brunnea, immaculata. Alae anticae brunneae, pallidius maculatae puncto centrali, minuto, atro et pone hoc versus marginem crassiolem macula magna, transversa flavescentis. Posticae cinereae subtus macula media fusca.

*conuergens.* 297—8. N. cristata alis deflexis subdentatis griseo fuscis apice cinereis: angulo ani macula fulua.

*Nobilia conuergens* Wien. Verz. 84. 8.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Alae ultra medium fusco griseoque variae basi lineola atra. In medio maculae ordinariae, posteriore reniformi: lunula obsoleta alba,

apice cinereae macula anali ferruginea punctisque marginalibus nigris.

*Larva* coeruleo-cæcis lineis punctisque albis, capite brunneo.

298. *N. cristata* alis deflexis dentatis nigris atro *alchymista*.  
undatis apice cinerascens: posticis basi  
maculisque duabus marginalibus albis.

*Noctua alchymista* Wien. Verz. 89. 5.

*Noctua convergens* Ent. syst. 3. 100. 298. \*

Habitat in Europae Quercu.

*Larva* cinerea flavo subpunctata: spinis duabus  
dorsalibus, duabusque caudalibus, capite  
coeruleo.

*Puppa* folliculata, nigra, antice truncata, brunnea.

300—1. *N. cristata* alis deflexis nigris albo variis: *pupilla*.  
puncto medio ocellari distincto.

Habitat Kiliae.

Statura et magnitudo *N. riuularis*. Caput et  
thorax variegata. Alae nigrae, albo undatae  
puncto medio distincto annulo niueo cincto.  
Posticae fuscae.

309—10. *N. cristata* alis deflexis nigro alboque *Panthea*.  
variis: puncto medio distincto atro.

Habitat in Helvetiae Pino Dom. de Clairville.

*N. ludificae* affinis. Caput album antennis nigris.  
Thorax albo nigroque varius. Abdomen atrum  
segmentorum marginibus albis. Alae albo nigroque  
variae, in medio macula magna alba et in hac punctum  
distinctum,

atrum. Posticae cinereae margine nigro punctato.

*Larva* pilosa, fusca: dorso albo nigro maculato fasciculo colli caudaeque.

Roess. Inf. 3. tab. 48.

*Puppa* folliculata, brunnea.

*Vitis idaea*. 381. N. cristata alis deflexis fuscis: posticis fascia alba.

*Noctua vitis idaea* Linn. syst. Nat. 2. 853. 168.  
Fn. Su. 1169.

Habitat in Sueciae *Vitis idaea*.

Nimis affinis N. *Arbuti* at alae posticae fuscae fascia alba.

**HYBLAEA.** *Palpi* porrecti, compressi, in medio dilatati.

*Labium* porrectum, acutum.

*Antennae* setaceae.

*scabra.* 4—5. H. alis deflexis compressis obscuris: strigis tribus undatis punctoque eleuato piloso.

Habitat in America boreali D. v. Rohr.

Media. *Palpi* magni, valde compressi. *Antennae* setaceae. Caput et thorax cristatus, obscura, immaculata. Alae valde compressae, adscendentes, obscurae strigis tribus undatis, atris punctoque in medio eleuato e fasciculo pilorum.

*obliqua.* 7. H. alis deflexis brunneis nigro irroratis: striga obliqua fusca.

Habitat in — —

Statura parua H. fagittae. Palpi valde porrecti albo nigroque varii. Alae brunneae atomis numerosis minutissimis nigris. Striga fusca a marginis exterioris medio ad apicem ducta et ante apicem macula marginalis cinerea, linea nigra inclusa et in hac macula puncta tria costalia, albida. Posticae cinerea.

8. H. alis deflexis fuscis: anticis litura apicis al-*liturata*.  
bida.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Daldorff.

Reliquis minor. Corpus obscurum. Alae fuscae striga una alteraue obsoleta. Anticae apice litura flexuosa albida.

PHALAENA. *Palpi* cylindrici.

*Lingua* porrecta, membranacea.

*Antennae* filiformes.

6—7. P. pectinicornis alis angulatis obscure cinereis: puncto medio strigisque duabus punctorum nigrorum. *perspicaria*.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Paullo maior Ph. tristriariae, tota obscure cinerea. Alae omnes supra puncto medio strigisque duabus posticis e punctis minutis, atris. Subtus pallidiores puncto medio strigaeque unica atris.

17—18. P. pectinicornis alis falcatis pallide testaceis: fascia media obscuriore flavo notata, margine postico coeruleo. *harparia*.

*Bombyx harpagala* Esp. Phal. 3. tab. 73. fig.  
1. 2.

Habitat in Heluetiae Tilia Dom. de Clairville.  
Statura omnino *P. cultrariae*. Alae valde fal-  
catae at haud erosae, pallide testaceae ante  
medium striga flexuosa, in medio fascia lata  
punctis aliquot flavis, postice striga undata  
obscurioribus. Margo posticus coeruleus.

*Larva* ferruginea capite spinoso, dorso antico  
spinis duabus, cauda acuta.

*Puppa* dense folliculata, pallida antice denticu-  
lis recurvis.

*obscuraria.* 27—28. *P. pectinicornis* alis dentatis obscuris  
nigris.

Habitat in Gallia.

Magna. Antennae pectinatae ferrugineo nigro-  
que variae. Corpus obscurum. Alae val-  
de dentatae, obscurae, anticis strigis duabus,  
posticis unica atris. Subtus omnes paullo  
pallidiores puncto medio atro strigae ob-  
soleta pallida.

*crocataria.* 43—4. *P. pectinicornis* alis flauissimis: atomis ma-  
culaque transuerse marginis tenuioris palli-  
de obscuris.

Habitat in Virginia Dom. Bosc.

Minor *P. prunaria*. Antennae pectinatae, obscu-  
rae. Corpus flauum. Alae omnes flauissimae  
atomis et ad marginem tenuiorem versus an-  
gulum ani macula transuersa pallide obscuris.



In posticis macula opposita ad marginem exteriorem. Subtus concolores.

- 62—3. *P. pectinicornis* alis cinereis: strigis duabus punctoque medio transverso nigris; striga posteriore punctata. *belgaria.*

*Phalaena belgaria* Hybn. Beytr. 2. 4. tab. 2. fig. N.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Media. Antennae pectinatae, apice fetaceae. Alae cinereae striga antica incurva, in medio puncto magno transverso strigaeque postica punctata nigris. Margo ipse punctatus. Posticae uti omnes subtus puncto medio strigaeque postica punctata fulcis.

- 63—4. *P. pectinicornis* alis omnibus cinereis: oculo medio ferrugineo strigaeque nigro punctata. *pandularia.* Linn. Fn. Su. 1244.

Clerk. Phal. tab. 7. fig. 5.

Habitat in Galliae Salice Dom. Bose.

Alae omnes albae in medio puncto ocellari ferrugineo. Pone medium striga e punctis nigris margoque nigro punctatus. Subtus concolores at absque oculo.

- 64—5. *P. pectinicornis* alis omnibus cinereis fusco irroratis: oculo medio strigaeque subundata fusca. *circularia.*

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bose.

Statura omnino praecedentis. Alae omnes cinereae atomis fulcis. In medio punctum ocellare album annulo fusco et in anticis po-

ne hoc, in posticis per hoc striga fusca. Postice striga fere obsoleta e punctis nigris. Subtus omnes albidae striga e punctis nigris.

*omicraria.* 64—5. *P. peñnicornis* alis albidis; annulo gemino fusco.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Parua, tenera. Alae anticae albiae, in medio annulo geminato, fusco. Margo posticus nigro punctatus. Posticae margine tantum nigro punctato. Subtus omnes niueae, immaculatae: costa anticarum testacea.

*hyalinaria.* 85—7. *P. peñnicornis* alis fusco hyalinis: anticis apice ferrugineis; fascia obliqua alba.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura praecedentium. Caput atrum. Thorax ferrugineo hirtus. Abdomen supra nigrum, subtus albidum. Alae anticae fusco hyalinae, nervis nigris striatae margine omni apiceque latius ferrugineae fascia lata, obliqua, alba. Posticae fusco hyalinae margine tantum postico ferrugineo.

*coloraria.* 96—7. *P. peñnicornis* alis cinereis: striga purpurea, anticis punctis tribus fuscis.

Habitat in Virginia Mus. Dom. Bosc.

Corpus medium, cinereum. Alae omnes cinereae striga communi purpurea. Pone strigam in anticis puncta tria strigae adiacentia, duobus ad marginem interiorem approximatis. Subtus omnes ferrugineae puncto medio strigaeque postica ferrugineis.

105—6. *P. pectinicornis* alis albis: atomis nu-*mixtaria*.  
merosis nigris.

Habitat in Galliae Populo Dom. Bosc.

*Mas.* Antennae pectinatae, apice setaceae.  
Caput et thorax grisea. Abdomen album  
atomis nigris. Alae anticae albae atomis nu-  
merosis, striga baseos undata, macula media  
transuersa ad costam maculisque marginali-  
bus, nigris. Posticae albae puncto medio  
atomisque apicis fuscis. Subtus concolores.  
*Faemina* obscurior alis striga postica undata  
nigra.

112—13. *P. pectinicornis* alis flauis: anticis *fas-**rotaria*.  
cia lata purpurea, posticis immaculatis.

Habitat in Germania.

Statura et magnitudo omnino *P. purpurariae*.  
Antennae fuscae rachi alba. Alae anticae  
flauae fascia lata, ad marginem crassio-  
rem dilatata purpurea. Margo posticus tenuissi-  
me purpureus. Posticae magis testaceae, im-  
maculatae. Subtus flauae, immaculatae.

112—13. *P. pectinicornis* alis flauis: anticis *grataria*.  
puncto medio omnibusque fasciis duabus  
purpureis.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura parua *P. purpurariae*. Antennae val-  
de pectinatae. Alae flauae anticae puncto  
medio, fascia pone medium strigaeque postica  
purpureis. Margo posticus purpureus.  
Posticae itidem flauae fascia strigaeque purpu-

reis. Subtus concolores at fasciae magis distinctae.

*puffillaria.* 120—1. *P. pectinicornis* alis niueis: strigis numerosis fuscis; posteriore maiore.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Minuta, tota niuea strigis 5—6. fuscis, quae ad apicem alae coeunt, postica reliquis maiore.

*togata.* 145—6. *P. feticornis* alis angulatis purpurascens: margine postico flauo.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Parua: tenera. Alae omnes purpurascens margine postico flauo. Posticae flavae. Subtus pallidiores.

*bicolorata.* 149—50. *P. feticornis* alis dentatis cinereis: striga undata apiceque fuscis maculisque costalibus nigris.

Habitat in Virginia Mus. Dom. Bose.

Statura omnino *P. Wauariae*. Caput et thorax flavescentia antennis setaceis. Alae anticae cinereae striga media undata, fusca. Margo posticus late fuscus puncto emarginaturaque nigris. Puncta praeterea tria costalia, nigra, posteriori transuerso; maiori. Posticae valde dentatae striga ante medium, puncto medio apiceque fascia et in hac strigae aliquot undatae obscuriores. Subtus omnes flavescentes striga antica, puncto medio strigaeque postica fuscis.

185—6. *P. feticornis* alis cinerascens: fascia *variata*.  
media fusca puncto centrali strigaque undata  
utrinque nigris.

Habitat Kiliae.

Statura et magnitudo omnino *P. rufatae*. Caput et thorax fusca. Alae anticae cinereae, basi fuscae in medio fascia fusca, quae ad costam dilatata. In medio fasciae punctum distinctum nigrum et praeterea fascia antice posticeque striga valde undata, nigra terminatur. In apice alae litura fusca. Posticae cinereae, immacolatae. Subtus cinereae puncto medio strigisque duabus posticis fuscis.

190—1. *P. feticornis* alis cinereis: atomis strigis *numerata*.  
tribus maculaque media fuscis.

Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.

Media. Antennae fetidae, in faemina nigro punctatae. Alae anticae cinereae atomis numerosis fuscis strigisque tribus, baseos parva, incurva, duabus pone medium macula fusca iunctis. Macula media in faemina multo maior. Posticae strigis tantum duabus. Subtus omnes pallidiores atomis, puncto medio strigisque duabus fuscis.

206—7. *P. feticornis* alis albis: strigis undatis *rupestrata*.  
quinque punctoque centrali fuscis.

Habitat in Germaniae montosis.

Statura et magnitudo *P. bilineatae*. Corpus albidum. Alae albae, anticae supra strigis quinque omnibus undatis, fuscis. Inter stri-

gam 3—4 punctum centrale distinctum, fuscum. Margo posticus striga e punctis atris, subtus obscurae striga postica e punctis albis. Posticae albae striga unica fusca. Subtus albae puncto strigisque duabus.

*pluviata.* 220—1. *P. feticornis* alis cinereis: strigis duabus, atomis fasciaque fuscis.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Statura et magnitudo *P. atomatae*. Alae omnes cinereae atomis numerosis strigis duabus bascos fasciaque postica repanda nigris. Striga nigra alas terminat. Subtus omnes flavescentes, nigro irroratae strigaque nigra, apice fuscae macula marginali flavescente. In anticis praeterea puncta duo alba, alterum in medio, alterum versus apicem, in posticis punctum paruum, nigrum in medio.

*aerata.* 238—9. *P. feticornis* alis viridibus: striga niuea. Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Parua, tenera. Antennae simplices, albae. Thorax viridis. Abdomen album. Alae omnes virides striga parua, niuea.

*laetata.* 261—2. *P. feticornis* alis niueis: strigis punctorum atrorum.

Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.

Media. Corpus niueum. Alae anticae niueae striga antica e punctis tribus, puncto medio strigaque postica e plurimis atris. Margo nigro punctatus. Posticae niueae puncto medio strigaque postica atris. Margo nigro

punctatus. Subtus concolores at striga anterior alae anticae omnino deest.

269-70. *P. feticornis* alis fuscis cinereo undatis: *geminata*.  
fascia media cinerea; punctis duobus nigris.

Habitat Kiliae.

Statura media. Alae anticae fuscae basi fascia media et in hac puncta duo nigra strigisque undatis apicis cinereis. Posticae uti omnes subtus cinereae.

273-4. *P. feticornis* alis niueis: strigis tribus ob-*opicata*.  
liquis apice coeuntibus nigris.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Parua, tenera. Alae niueae, anticae supra strigis tribus posticis, nigris, quae in apice alae coeunt, subtus obscuriores. Posticae albae strigis tribus at minus obliquis.

278-9. *P. feticornis* alis cinereis fusco subfascia-*herbariata*.  
tis: margine punctato.

Habitat in herbariis folia plantarum exsiccatarum excedens Mus. Dom. Bosc.

Minuta. Alae cinereae fasciis atomisque numerosis fuscis. Margo fuscopunctatus.

300-1. *P. feticornis* alis flavescentibus: maculis *balteata*.  
annularibus strigisque undatis fuscis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Magnitudo *P. urticatae*. Corpus cinereum. Alae pallide flavescentes striga una alteraue baseos maculis tribus annularibus in medio strigisque tribus valde undatis posticis nigris. Subtus albidae lituris fuscis.

- rimulata*, 319—20. *P. feticornis* alis albidis annulis duobus  
 mediis strigisque tribus fuscis.  
 Habitat in Americae meridionalis Insulis.  
 Statura parva *P. lemnatae*. Palpi magni, compres-  
 si. Alae anticae albiae striga ante medium  
 undata, annulis duobus in medio, striga  
 pone medium in medio inflexa strigaeque ter-  
 minali fuscis. Posticae albiae strigis tribus  
 fuscis. Subtus omnes cinerea striga fusca.
- exaltata*, 324—5. *P. feticornis* alis fuscis: fasciis tribus  
 hyalinis; secunda puncto fusco.  
 Habitat in Americae Insulis Dr. Pflug.  
 Statura praecedentium. Alae anticae fasciis al-  
 ternis fuscis hyalinisque. In fascia secunda  
 hyalina punctum distinctum fuscum, in fas-  
 cia tertia fusca punctum nigrum. Praete-  
 rea macula marginalia hyalina versus api-  
 cem. Posticae albiae strigis posticis fuscis.
- amata*, 324—5. *P. feticornis* alis flavescentibus: anticis  
 puncto fasciaque abbreviata, posticis basi hy-  
 alinis.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Daldorff.  
 Statura omnino praecedentium. Alae anticae  
 flavescentes costa magis brunnea. In medio  
 versus costam punctum paruum, lunatum  
 et pone medium fascia abbreviata hyalina.  
 Posticae basi hyalinae, apice fuscae.
- vidualis*, 420—1. *P. alis atris*: anticis macula, posticis fas-  
 cia niuea.  
 Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.



Statura *P. atralis* at paullo maior. Frons alba. Abdomen nigrum, albo annulatum ano fulvo. Alae anticae atrae macula magna, media, transuersa, niuea, posticae atrae fascia margineque postico niueis. Subtus pallidae, in medio atrae fascia niuea.

**LITHOSIA.** *Palpi* duo recurui: articulo primo compresso, secundo falcato.

*Antennae* setaceae.

1. *L. alis* depressis luteis: anticis punctis duobus *quadra*, cyaneis.

*Noctua quadra* Entom. syst. 3. 2. 24. 54. Linn. syst. Nat. 2. 840. 14.

Wilk papil. 24. tab. 3. 2. 17.

Pod. Mus. Graec. tab. 2. fig. 8.

Schaeff. Elem. tab. 98. fig. 5.

Roef. Inf. 1. phal. 2. tab. 17.

- β. *Noctua diplana* alis incumbentibus cinereis, thorace flauo. Sp. Inf. 2. 215. 29. Linn. Mant. 1. 539.

Habitat in Pini, Quercus Lichenibus.

---

Lithosiae corpus medium, depressum, simmarginatum, agile, capite paruo, transuerso, oculis magnis, globosis, prominulis, lateralibus, distantibus, antennis thorace longioribus, distantibus, vertici insertis, thorace plano, breui, hirto, alis quatuor aequalibus, planis, conuolutis, abdomine longioribus, pedibus cursoriis tibiis anticis apice unispinosis, posticis bispinosis.



- depressa.* 2. L. alis depressis plumbeis: margine flauo, capite sanguineo.  
*Noctua depressa* Ent. syst. 3. 2. 24. 52.  
 Habitat in America boreali.
- complanata.* 3. L. alis depressis: margine exteriori pallido, posticis totis flauis.  
*Noctua complanata* Ent. syst. 3. 2. 24. 53. Linn. syst. Nat. 2. 840. 15. Fn. Su. 1153.  
 Wien. Verz. 68. 4.  
 Albin. Inf. tab. 70. fig. G. H.  
 Hybn. Beytr. 3. tab. 1. fig. F.  
 Habitat in Quercus Lichene.  
 Variat alis anticis totis pallidis.  
*Puppa folliculata*, brunnea.
- conuoluta.* 4. L. alis conuolutis cinereis, capite thoracisque lobo antico flauis.  
*Tinea gigantella* Ent. syst. 3. 2. 288. 3.  
 Wien. Verz. 135. 37.  
 Habitat in Galliae Lichenibus Dom. Bosc.
- magna.* 5. L. alis oblongis niueis immaculatis.  
*Tinea magnella* Ent. syst. 3. 2. 288. 4.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.
- socia.* 6. L. alis oblongis cinereis, antice albidis postice pallidis: striga undata nigra.  
*Tinea sociella* Ent. syst. 3. 2. 288. 6.  
*Tinea tribunella* Wien. Verz. 319. 62.  
 Clerk. phal. tab. 3. fig. 11.  
 Habitat in Europa boreali.
- gelata.* 7. L. alis fusco cinereis: anticis vitta alba.  
*Tinea gelatella* Ent. syst. 3. 2. 289. 11. Linn. syst. Nat. 2. 883. 344. Fn. Su. 1450.

*Tinea ligatella* Wien. Verz. 319. 60.

Clerk. phal. tab. 8. fig. 3.

Habitat in Pomonae arboribus.

8. L. alis oblongis cinereis postice obscurioribus: *grandis*.  
puncto albo strigaque undata cinerea.

*Tinea grandella* Ent. syst. 3. 2. 288. 7.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.

9. L. alis conuolutis flavis immaculatis, *flava*.  
Habitat in Italia Dr. Allioni.

Media quasi inter L. conuolutam et luteam.

Magnitudo et longitudo prioris at color posterioris.

10. L. alis obscure cinereis nitidis: marginibus *marginata*.  
niueis.

*Alucita marginella* Ent. syst. 3. 2. 333. 13.

Habitat in Anglia Dom. Yeats.

11. L. alis supra luteis immaculatis: anticis sub-*lutea*.  
tus limbo fusco.

*Tinea lutarella* Ent. syst. 3. 2. 292. 23. Linn.

syst. Nat. 2. 886. 355. Fn. Su. 1360.

Wien. Verz. 68. 3.

Clerk. phal. tab. 4. fig. 9.

Habitat in Europae Pino.

12. L. alis luteis: anticis punctis nigris trifariis, *irrorata*.  
thorace antice posticeque fuluo.

*Tinea irrorella* Ent. syst. 3. 2. 291. 18. Linn.

syst. Nat. 2. 885. 354. Fn. Su. 1361.

Wien. Verz. 68. 6.

Sulz. Hist. Inf. tab. 23. fig. 10.

Clerk. Phal. tab. 4. fig. 5.

Habitat in Lichene parietino aliisque.

- roscida.* 13. L. alis luteis: anticis nigro punctatis posticis maculatis, thorace atro.

*Tinea roscidella* Ent. syst. 3. 2. 291. 19.

Wien. Verz. 68. 7.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

- perla.* 14. L. alis cinereis: puncto medio strigaeque punctorum abbreviata nigris.

*Tinea perlilla* Ent. syst. 3. 2. 292. 21.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

- eborina.* 15. L. alis anticis pallidis: margine flauo punctisque duobus fuscis.

*Tinea mesomella* Ent. syst. 3. 2. 293. 25. Linn. syst. Nat. 2. 886. 356. Fn. Su. 1362.

Wien. Verz. 68. 5.

Clerk. Phal. tab. 4. fig. 14.

Hybn. Beytr. 3. tab. 3. fig. Q.

Habitat in Europae pratis.

- pustulata.* 16. L. alis anticis atris: punctis ferrugineis flauisque numerosis.

*Tinea pustulella* Ent. syst. 3. 2. 292. 20.

*Tinea punctella* Cram. Inf. tab. 372. fig. L.

Habitat — —

**GALLERIA.** *Palpi* duo apice incrassati, oblique truncati.  
*Antennae* setaceae.

- cereana.* 1. G. alis griseis postice emarginatis: dorso canaliculato fusco.

*Tinea cerella* Ent. syst. 3. 2. 287. 2.

*Tinea mellonella* Ent. syst. 3. 2. 305. 79. Linn.  
syst. Nat. 2. 888. 375. Fn. Su. 1383.

*Phalarna cereana* Linn. syst. Nat. 2. 874. 282.  
Wien. Verz. 137. 2.

Reaum. Inf. 3. tab. 19. fig. 7—9.

Swammerd. Bibl. Nat. tab. 26. fig. 2.

Roessl. Inf. 3. tab. 41.

Habitat in Apum aluearibus, angiportus, fa-  
uos penetrantes, struens.

2. G. alis fusco cinereis immaculatis, capite *aluearia*.  
flavo.

*Tinea grisfella* Ent. syst. 3. 2. 289. 10.

Reaum. Inf. 3. tab. 19. fig. 7. 8. 9.

Habitat in Apum aluearibus inel depascens.

Praecedente duplo minor,

**PHYCIS.** *Palpi* quatuor inaequales.

*anteriores* breuiores, in-  
curui.

*posteriores* elongati: articu-  
lo ultimo cylindrico.

*Antennae* setaceae.

1. P. alis oblongis nigris: dorso margineque po- *Boleti*.  
stico albidis.

*Tinea boletella* Ent. syst. 3. 2. 287. 1.

Habitat in [Austriae, Sueciae Fugo intrans et  
exiens per Boletos.

2. P. alis oblongis griseis, antennarum articulis *spissicornis*.  
duobus inferioribus incrassatis.

*Tinea spissicella* Ent. syst. 3. 2. 289. 9.  
Habitat Kiliae Dom. Lund.

CRAMBUS. *Palpi* quatuor.

*anteriores* breuiiores, ex-  
trorsum crassiores, ob-  
lique truncati.

*posteriores* porrecti, com-  
pressi, conniuentes.

*Antennae* setaceae.

- glaucina-*  
*tus.* 1. *C. alis* glaucis? strigis duabus fuscis repandis.  
*Phalaena glaucinalis* Ent. syst. 3. 2. 219. 337.  
Linn. syst. Nat. 2. 881. 328. Fn. Su. 1349.  
Clerk. phal. tab. 3. fig. 4.  
Wien. Verz. 120. 10.  
Habitat in Europa.
- barbatus.* 2. *C. antennis* pectinatis, femoribus anticis bar-  
ba porrecta.  
*Phalaena barbalis* Ent. syst. 3. 2. 219. 338.  
Linn. syst. Nat. 2. 881. 329. Fn. Su. 1345.  
Clerk. phal. tab. 5. fig. 3.  
Wien. Verz. 120. 9.  
Habitat in Trifolio pratensi.
- antennatus.* 3. *C. antennis* pectinatis, alis incumbentibus ci-  
nereis: striga postica albida.  
*Phalaena antennalis* Ent. syst. 3. 2. 219. 339.  
Habitat Kiliae.
- ventilabris.* 4. *C. antennis* pectinatis, tibiis anticis apice fas-  
ciculato pilosis.  
*Phalaena ventilabris* Ent. syst. 3. 2. 220. 340.

Habitat in Carinthia Dom. Saldoner.

5. *C. antennis pectinatis, alis cinereo rufis: stri-bombycalis:*  
*gis duabus albidis, posticis luteis: margine*  
*nigro.*

*Phalaena bombycalis* Ent. syst. 3. 2. 220. 341.

Wien. Verz. 120. 6.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

6. *C. antennis pectinatis, alis cinerascens: tentacula-*  
*strigis tribus fuscis.* *ris.*

*Phalaena tentacularis* Ent. syst. 3. 2. 220. 342.

Linn. syst. Nat. 2. 381. 330. Fn. Su. 1344.

Wien. Verz. 119. 2.

Degeer Inf. 1. tab. 5. fig. 1.

Habitat in Europae Taraxaco.

7. *C. alis griseis: strigis ferrugineis.*

*Phalaena proboscidalis* Ent. syst. 3. 2. 221. 343. *proboscis:*

Linn. syst. Nat. 2. 883. 331. Fn. Su. 1346. *deus,*

Wien. Verz. 119. 1.

Clerk. Icon. tab. 5. fig. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 23. fig. 6.

Habitat in Europae plantis.

8. *C. alis griseis: striga media ferruginea postica-ensalis:*  
*que punctorum alborum.*

*Phalaena ensalis* Ent. syst. 3. 2. 221. 344.

Habitat Kiliae Dom. Amthor.

9. *C. alis subdentatis fuscis: strigis posticis unda-elongatis:*  
*tis albis.*

*Phalaena elongalis* Ent. syst. 3. 2. 221. 345.

Habitat Tranquebariae Mus. D. Lund.

10. *C. alis griseis immaculatis.*

*lanceolatus.*

*Phalaena lancealis* Ent. syst. 3. 2. 221. 346.  
Habitat in Americae Insulis Dr. Pflug.

*rostratus.* 11. C. alis subgriseis: punctis duobus muricatis  
lineaque apicis nigris.

*Phalaena rostralis* Ent. syst. 3. 2. 222. 347. Linn.  
syst. Nat. 2. 881. 332. Fn. Su. 1347.

Wien. Verz. 119. 3.

Roef. Inf. 1. phal. 4. tab. 6.

Habitat in Carpino, Hamulo.

*nemorum.* 12. C. alis griseis: strigis tribus fuscis, interme-  
dia flexuosa.

*Phalaena nemoralis* Ent. syst. 3. 2. 222. 348.

Wien. Verz. 120. 11.

Harris Inf. tab. 6. fig. 2.

Habitat in Angliae nemoribus.

*crassalis.* 13. C. alis anticis fuscescentibus apice cinereis:  
punctis ocellaribus nigris.

*Phalaena crassalis* Ent. syst. 3. 2. 222. 349.

Habitat in Aultria Dom. Schieffermyller.

*alpestris.* 14. C. alis nigro coerulecentique variis: posticis  
nigris.

*Phalaena alpestralis* Ent. syst. 3. 2. 223. 350.

Habitat in Aultria Mus. Dom. Schieffermyller.

*palpalis.* 15. C. alis griseis: posticis margine crassiori albo.

*Phalaena palpalis* Ent. syst. 3. 2. 223. 351.

Habitat in Anglia.

*porrectus.* 16. C. alis fuscescentibus: striga media brunnea.

*Phalaena porrectalis* Ent. syst. 3. 2. 223. 352.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Mus.

D. Pflug.



17. *C. alis cinereis fusco irroratis: striga postica strigatus.*  
brunnea.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Medius. Palpi compressi, thorace longiores.

Alae omnes griseae striga distincta, brunnea pone medium.

18. *C. alis cinereis: puncto medio piloso fusco dilatatus.*  
strigae postica obliqua fulva.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Statura praecedentis at distincta et alia. Minor. Palpi compressi, porrecti. Alae anticae cinereae puncto medio elevato, piloso et pone hoc striga obliqua, fulva. Posticae fuscae.

19. *C. antennis pectinatis alis cinereis: puncto pectinatus.*  
medio strigae postica obsoletis fuscis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura praecedentium. Antennae pectinatae, obscurae. Alae cinereae puncto medio strigae postica fuscis. Posticae albae.

20. *C. alis glabris pallidis: strigis obliquis ferru-forficatus,*  
gineis.

*Phalaena forficalis* Ent. syst. 3. 2. 223. 353.

Linn. syst. Nat. 2. 882. 334. Fn. Su. 1352.

Wien. Verz. 122. 17.

Geoff. Inf. 2. 166. 111.

Reaum. Inf. 1. tab. 16. fig. 13. 14.

Habitat in Europae Brassica.

21. *C. alis glabris fusco cinereoque variegatis: posticis cinereis margine postico fuscis.*

- Phalaena sophilalis* Ent. syst. 3. 2. 223. 354.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
- triflis.* 22. C. alis griseis: strigis tribus recurvatis fulcis: tertia terminali.  
*Phalaena triflalis* Ent. syst. 3. 2. 224. 355.  
Habitat in Italia Dr. Allioni.
- obsoletus.* 23. C. alis fuscis: fascia postica obsoleta pallida, posticis subtus pallidis.  
*Phalaena obsoletalis* Ent. syst. 3. 2. 229. 373.  
Habitat in Italia Dr. Allioni.
- cornatus.* 24. C. alis cinereis: striga postica albida, antennis medio incrassatis.  
*Phalaena cornicalis* Ent. syst. 3. 2. 229. 374.  
Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.
- capitatus.* 25. C. alis fuscis: maculis duabus pallidis, capite bicorni.  
*Phalaena capitalis* Ent. syst. 3. 2. 229. 375.  
Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.
- dorsatus.* 26. C. alis cinereis: linea dorsali fasciaque postica fuscis.  
*Phalaena dorsalis* Ent. syst. 3. 2. 229. 376.  
Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.
- pinguis.* 27. C. alis cinereis margine crassiori nigro subfasciato.  
*Phalaena pinguinalis* Ent. syst. 3. 2. 230. 377.  
Linn. syst. Nat. 2. 882. 336. Fn. Su. 1350.  
Wien. Verz. 120. 13.  
Reaum. Inf. 3. tab. 20. fig. 5—11.  
Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 8. 9.  
Habitat in Europae pinguibus, lardo, butyro aliisque.

28. *C. alis oliuaceis: fascia postica dentata pal-ramalis.*  
lida.  
*Phalaena ramalis* Ent. syst. 3. 2. 230. 378.  
*Phalaena dentalis* Wien. Verz. 120. 14.  
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
29. *C. alis griseo fuscis: maculis duabus costali-niveus.*  
bus albis, corpore niveo.  
*Phalaena nivealis* Ent. syst. 3. 2. 232. 388.  
Habitat in Germania Dom. de Hattorff.
30. *C. alis ferrugineis: striga flava, margine cras-erigatus.*  
siori flavo punctato. *Laquebert*  
*Phalaena erigalis* Ent. syst. 3. 2. 237. 408. *Ill. Icon.*  
*Phalaena punctalis* Mant. Inf. 2. 222. 310. *Ins. Tab.*  
*Phalaena angustalis* Wien. Verz. 120. 7. *Tab. 17. fig. 11*  
Habitat in Sueciae nemoribus.
31. *C. alis striatis cinereis: margine postico atro Sacchari.*  
punctato.  
*Phalaena saccharalis* Ent. syst. 3. 2. 238. 411.  
Act. Soc. Hist. Nat. Hafn. 3. tab. fig.  
Habitat in Americae meridionalis Saccharo, cu-  
ius caules perforat, destruit, exsiccat. Dom.  
v. Rohr.
32. *C. alis oblongis cinereis: punctis duobus atris colonum.*  
ante strigam curvam undulatam obsoletam.  
*Tinea colonella* Ent. syst. 3. 2. 288. 5. Linn.  
syst. Nat. 2. 883. 346. Fn. Su., 1358.  
Clerk. phal. tab. 3. fig. 8.  
Wien. Verz. 133. 1.  
Habitat in Europa boreali.
33. *C. alis anticis griseis: costa inaequali striga-hortorum.*  
que media testaceis.

*Tinea hortella* Ent. syst. 3. 2. 296. 43.  
Habitat in Lapponia Dom. de Paykull.

*margaritaceus.* 34. C. alis fuscis: linea unica albissima.  
*Tinea margaritella* Ent. syst. 3. 2. 295. 35.  
Wien. Verz. 134. 5.

Hybn. Beytr. 2. tab. 4. fig. Z.  
Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

*Ova erecta, ovata, costata, albida.*

*carnea.* 35. C. alis anticis flavis: lateribus sanguineis.  
*Tinea carnella* Ent. syst. 3. 2. 296. 41. Linn.  
syst. Nat. 2. 887. 353.

Wien. Verz. 138. 13.

Schæff. Icon. tab. 147. fig. 2. 3.

Habitat in Germaniae Trifolio pratensi.

*Larva villosa, nigra, cauda bifida.*

*Puppa folliculata, brunnea.*

*lineatus.* 36. C. alis albidis fusco lineatis apice strigis duabus fuscis.

*Tinea lineatella* Ent. syst. 3. 2. 292. 22.

*Tinea rorella* Linn. syst. Nat. 2. 885. 353.

Habitat in agro Paedemontano Dr. Allioni.

*Pineti.* 37. C. alis anticis flavis: maculis duabus albissimis, anteriore oblonga, posteriore ovata.

*Tinea pinetella* Ent. syst. 3. 2. 294. 31. Linn.

syst. Nat. 2. 886. 356. Fn. Su. 1368.

Clerk. Phal. tab. 4. fig. 15.

Knoch. Beytr. 1. tab. 4. fig. 7.

Wien. Verz. 134. 7.

Panz. F. Germ. 6. tab. 22.

Habitat in Europae Pinetis.

38. C. alis cinereis: linea unica abbreviata albif. *culmorum*.  
 sima.  
*Tinea culmella* Ent. syst. 3. 2. 295. 54. Linn.  
 syst. Nat. 2. 886. 361. Fn. Su. 1370.  
 Reaum. Inf. 1. tab. 17. fig. 13. 14.  
 Wien. Verz. 134. 9.  
 Habitat in Europae graminosis.
39. C. alis anticis cinereis: linea albissima postice *pratorem*.  
 ramosa apice striis obliquis.  
*Tinea pratella* Ent. syst. 3. 2. 294. 12. Linn.  
 syst. Nat. 2. 886. 360. Fn. Su. 1369.  
 Clerk. phal. tab. 3. fig. 14.  
 Wien. Verz. 135. 29.  
 Habitat in pratis graminosis.
40. C. alis cinereis: linea albissima, margine po- *pascuum*.  
 stico nigro punctato.  
*Tinea pascuella* Ent. syst. 3. 2. 295. 33. Linn.  
 syst. Nat. 2. 886. 359. Fn. Su. 1367.  
 Wien. Verz. 134. 4.  
 Hybn. Beytr. 2. tab. 4. fig. U.  
 Habitat in Europae pascuis.
41. C. alis striatis argenteis fusco nitidulis, *argyreus*.  
*Tinea argyrella* Ent. syst. 3. 2. 294. 30.  
 Wien. Verz. 135. 28.  
 Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.
42. C. argenteus antennis fusco annulatis. *argenteus*.  
*Tinea argentella* Ent. syst. 3. 2. 296. 38. Linn.  
 syst. Nat. 2. 895. 421. Fn. Su. 1432.  
*Phalaena perlella* Wien. Verz. 134. 11.  
 Habitat in Rubo, Vrtica.

- arbusforum.* 43. *C. argenteus* alis anticis flavescentibus nitidis, ano barbato albo.  
*Tinea arbusfella* Ent. syst. 3. 2. 293. 24.  
 Habitat Kiliae.
- niueus.* 44. *C. argenteus* nitidus immaculatus, antennis concoloribus.  
*Tinea niuella* Ent. syst. 3. 2. 296. 39.  
 Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.
- conchaceus.* 45. *C.* alis anticis fuscis: linea unica interrupta albissima.  
*Tinea conchella* Ent. syst. 3. 2. 295. 36.  
 Wien. Verz. 134. 6.  
 Habitat in Austria Mus. D. Schieffermyller.
- cryptorum.* 46. *C.* alis griseis: linea dimidiata albissima strigaeque postica undata argentea.  
*Tinea cryptella* Ent. syst. 3. 2. 300. 58.  
 Habitat in India orientali Dr. Koenig.
- strigatus.* 47. *C.* alis anticis cinereo flavescentibus: striga marginali argentea.  
*Tinea strigella* Ent. syst. 3. 2. 297. 44.  
*Tinea chrysonuchella* Wien. Verz. 124. 8.  
 Habitat in Germania.
- marginatus.* 48. *C.* alis anticis griseis: margine crassiori albo.  
*Tinea marginella* Ent. syst. 3. 2. 297. 46.  
 Wien. Verz. 319. 65.  
 Habitat in Germania Dom. de Hattorff.
- vinetorum.* 49. *C.* alis anticis fuscis, lineolis tribus argenteis; intermedia longiore interrupta.  
*Tinea vinetella* Ent. syst. 3. 2. 294. 29.  
 Habitat Dresdae Mus. Dem. Romani.

50. *C. alis lanceolatis cinereis: vitta fusca.* *mucronatus.*  
*Tinea mucronella* Ent. syst. 3. 2. 298. 47.  
 Wien. Verz. 136. 45.  
 Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.
51. *C. alis cinereis fusco striatis.* *crinitus.*  
*Tinea barbella* Ent. syst. 3. 2. 297. 45.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.
52. *C. alis cinereis: vitta fusca, antennis pilosis. bicoftatus.*  
*Tinea bicoftella* Ent. syst. 3. 2. 306. 86. Linn.  
 syst. Nat. 2. 890. 387. Fn. Su. 1438.  
*Tinea pyropella* Wien. Verz. 137. 53.  
 Clerk. phal. tab. 3. fig. 15.  
 Habitat in Europae hortis.
53. *C. alis fuscis immaculatis.* *noerens.*  
*Tinea tristella* Ent. syst. 3. 2. 296. 40.  
 Wien. Verz. 134. 17.  
 Habitat in Austria.
54. *C. niger alis fuscis, abdomine rufo.* *niger.*  
*Tinea nigrella* Ent. syst. 3. 2. 298. 49.  
 Habitat in Daniae nemoribus.
55. *C. ater aeneo nitidus alis posticis apice ano- ater,*  
*que testaceis,*  
*Tinea atrella* Ent. syst. 3. 2. 298. 52.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.
56. *C. alis anticis griseis: strigis atomisque fuscis. Fagi.*  
*Tinea fagella* Ent. syst. 3. 2. 300. 57.  
 Wien. Verz. 134. 34.  
 Habitat in Austriae Fago,
57. *C. alis griseo fuscis nitidulis immaculatis.* *tetricus.*  
*Tinea tetricella* Ent. syst. 3. 2. 303. 69.

Wien. Verz. 138. 22.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

*Mercurii.* 58. C. alis albis fusco variegatis.

*Tinea mercuriella* Linn. syst. Nat. 2. 868. 373.

Habitat in Europæ hortis.

Media. Antennæ nigrae. Caput et thorax niuea. Alae niueae atomis maculisque geminatis fuscis. Margo posticus fuscus striga alba.

*Oxyacanthæ.* 59. C. alis fusco nebulosis: striga postica albida.

*Tinea oxyacanthella* Ent. syst. 3. 2. 294. 28.

Linn. syst. Nat. 2. 886. 357.

Habitat in Sueciæ Oxyacantha.

Striga niuea pone medium alae.

*lugubris.* 60. C. alis fusco cinereis: strigis posticis angulatis obsoletis brunneis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino C. moerens at duplo fere minor. Alae obscure cinereae strigis duabus aut tribus angulatis brunneis.

*hirtus.* 61. C. hirtus alis cinereis atomis punctisque fuscis.

Habitat Kiliae.

Corpus magnum, hirtum. Alae anticeae cinereae atomis numerosis, fuscis. In medio puncta tria nigra et margo posticus fusco punctatus. Posticae cinereae, immacolatae.

*finuatus.* 62. C. alis flauicantibus: strigis duabus undatis fuscis.



*Tinea sinuella* Ent. syst. 3. 2. 508. 94.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

PYRALIS. *Palpi* nudiusculi, basi cylindrici, medio dilatato ovati, apice subulati.

*Antennae* filiformes.

14—5. *P. fusca* alarum margine tenuiori postico-*caprana*.  
que niueis.

Habitat in Heluetiae Salice capraea Mus. D. de Clairville.

Magna. Caput et thorax fusca, immaculata.  
Alae deflexae, fuscae margine tenuiori communi inaequali posticoque niueis.

*Larua* 16poda alba, capite rufo albo striato.

*Puppa* nuda, brunnea.

15—16. *P. alis* flauis: punctis duobus ferru-*flauana*.  
gineis.

Habitat in Centaurea Scabiosa Mus. Dom. de Clairville.

Media. Caput et thorax flaua, immaculata.  
Alae incumbentes, flauae punctis duobus ferrugineis: uno post alterum.

*Larua* 16poda, atra.

*Puppa* nuda, brunnea.

17—18. *P. alis* cinereis: strigis numerosis unda-*orbana*.  
tis fuscis.

Habitat in Germania.

Magna. Caput et thorax grisea. Alae cinereae strigis numerosis undatis punctoque medio

distincto fuscis. Margo atro punctatus. Posticae supra fuscae, subtus cinereae.

*albana.* 31—2. P. alis niueis: margine postico nigro.

*Tinea laetella* Ent. syst. 32. 313. 16.

Habitat in Americae Insulis.

Parua. Corpus niueum. Alae anticae niueae margine postico nigro, posticae immaculatae.

*tuberculana.* 39—40. P. alis griseis fusco punctatis: margine crassiori antice trituberculato.

*Pyralis tuberculana* Bosc. Act. Soc. Linn. 1. 196. tab. 17. fig. 4. 5.

Habitat in Galliae Hedyfaro Onobrychis. Mus. Dom. Bosc.

Vix huius generis. Alae mox griseae, mox albae puncto nigris punctisque tribus costalibus, eleuatis.

*Larua* fusco viridis intra folliculum e parenchyma plantae fabricatum et cauli affixum.

*obscurana.* 44—5. P. alis anticis obscuris: costa albo punctata anguloque ani punctis nigris.

Habitat in Gallia Dom. Bosc.

Media. Alae anticae obscure brunneae. Ante medium macula dorsalis communis, fusca. Margo exterior albo punctatus. Angulus ani macula punctisque tribus approximatis, nigris. Posticae fuscae.

*Branderiana.* 63—4. P. alis fuscis ferrugineo variis margineque postico ferrugineo.

*Phalaena Branderiana* Linn. syst. Nat. 2. 880.

Habitat in Europa boreali.

Affinis *P. fuscanae* at omnino distincta. Alae fuscae ferrugineo variae margine postico ferrugineo macula magna fusca. Posticae fuscae margine postico fulvo.

72—3. *P. alis virescentibus albo variis: macula marmorata postica quadrata subargentea; punctis minutissimis atris.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura et magnitudo *P. arcuanae*. Alae anticae virescentes, albo maculatae. Versus angulum ani macula quadrata, obsoleta, argentata et in hac puncta aliquot minutissima, atra. Posticae cinereae striga submarginali, fusca. Subtus anticae fuscae, posticae cinereae.

74—5. *P. alis anticis flauissimis: maculis brunneis sparsis.* *Rohrana*.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo omnino *P. Christiannae*. Caput flauum antennis cinereis. Corpus cinereum. Alae anticae flauissimae maculis plurimis sparsis, brunneis praesertim ad marginem crassiolem et posticum. Posticae cinereae.

von Rohr Americae meridionalis indefessus scrutator periit in itinere Guineensi.

77—78. *P. alis nigris nitidulis: maculis duabus fuluanae, fuluis.*

*Tinea fuluella* Ent. syst. 3. 2. 317. 134.

Habitat in Germaniae Dom. de Paykull.

*repandana.* 87—8. P. alis brunneis: fasciis tribus albis, media repanda.

Habitat in Europa.

Magna. Corpus ferrugineum. Alae anticae brunneae fasciis tribus albis, anteriore distincta, media repanda, tertia obsoletiore. Posticae cinereae.

*Cuviana.* 94—5. P. alis anticis fusco viridique variis: punctis tribus marginalibus niueis.

Habitat Kiliae.

Nimis affinis videtur P. triangulanae. Alae anticae fusco viridique variae punctis tribus costalibus albis: anteriore minore. Versus marginem striga alba obsoleta.

Cuvier Professor Parisiensis amicissimus Anatomiae comparatae et Insectorum scrutator eximius.

*approximana.* 116—17. P. alis flavescenti nitidulis: punctis tribus approximatis costalibus nigris.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura, magnitudo et summa affinitas P. Boscanae. Caput et thorax fuscana. Alae pallide flavescentes, nitidulae punctis tribus approximatis, nigris. Posticae cinereae.

*lunana.* 122—3. P. niuea alis variegatis: lunula exteriori niuea.

Habitat in Heluetia Dom. de Clairville.

Statura et magnitudo sequentium. Caput et thorax niuea, immaculata. Alae variega-

tae lunula ad marginem crassorem niuea. In apice litura albida puncto nigro.

122—3. P. alis subcaudatis fuscis: margine te- *ephippano*.  
nuiore punctoque medio niueis.

Habitat in Heluetia Dom. de Clairville.

Magna in hac familia. Caput et thorax niuea, immaculata antennis cinereis. Alae incumbentes, fuscae margine interiori a thorace exeunte punctoque magno elevato in medio albis.

122—3. P. niuea alis subcaudatis fuscis inma- *liberana*.  
culatis.

Habitat in Heluetia Dom. de Clairville.

Magnitudo et statura praecedentis. Caput et thorax niuea, immaculata. Alae in angulum excurrentes, fuscae, immaculatae.

131—2. P. alis flauis fusco strigosis arcuque mag- *reticulana*,  
no costali fusco.

Habitat in Europae hortis.

Magna. Corpus cinereum. Alae anticae flavae strigis numerosis, fuscis et in medio costae macula magna fusca in cuius medio macula costalis flava. Posticae cinereae.

149—50. P. alis fuscis: fasciis duabus baseos ma- *Latreilla-*  
culisque variis apicis albis. *na*.

Habitat Kiliae.

Parua. Caput album. Thorax albus margine antico fusco virescente. Alae fuscae fasciis duabus baseos: posteriore parum interrupta et pone medium maculae variae albae.

Latreille Gallus Insectorum scrutator oculatissimus.

*composana.* 164—5. P. alis fuscis: macula dorsali communi argentea e strigis quatuor composita.

*Tinea compositella* Ent. syst. 3. 2. 316. 129.

Habitat in Angliae nemoribus.

*tapezana.* 167—8. P. alis nigris postice albis, capite niueo.

*Tinea tapezella* Ent. syst. 3. 2. 303. 70. Linn.

syst. Nat. 2. 888. 371. Fn. Su. 1414.

Geoff. Inf. 2. 187. 13. 14.

Wien. Verz. 142. 13.

Reaum. Inf. 3. tab. 20. fig. 12.

Habitat in pellibus intra cylindros meatus rodens.

*pulchana.* 167—8. P. alis basi fuscis apice aurulentis fusco strigosis: puncto medio apicisque nigris, capite niueo.

*Tinea pulchella* Ent. syst. 3. 2. 303. 71.

Habitat in Daniae domibus Mus. Dom. Lund.

*sepulcrana.* 175—6. P. niuea alis planis atris immaculatis.

*Tinea sepulchrella* Ent. syst. 3. 2. 316. 131.

Habitat in America Dr. Pflug.

**TINEA.** Palpi quatuor:

*antici* obsoleti.

*postici* corniformes, reflexi.

*Lingua* brevis, membranacea.

*Antennae* setaceae.

*guttella.* 1. T. alis atris: anticis punctis atris numerosis; capite ferrugineo.

*Tinea guttella* Ent. syst. 3. 2. 293. 26.

*Tinea anthracinella* Wien. Verz. 319. 60.

Hybn. Beytr. 1. tab. 3. fig. Q.

Habitat in Europae Sedo acri.

2. *T. alis pallidis: vitta lata viridi.*

*vittella.*

*Tinea vittella* Ent. syst. 3. 2. 293. 27.

Habitat in India orientali Mus. D. Lund.

3. *T. alis fuscis: vitta communi dentata alba, thorace niueo: punctis duobus atris.*

*Alucita 2punctella* Ent. syst. 3. 2. 334. 14.

*Tinea Echiella* Wien. Verz. 140. 54.

Hybn. Beytr. 4. tab. 1. fig. B.

Habitat in Germaniae Echio.

4. *T. alis coerulescenti cinereis: puncto vitta media maculisque rhombeis contiguis atris.*

Ent. syst. 3. 2. 301. 64. Linn. syst. Nat. 2.

884. 347.

*Tinea sequella* Ent. syst. 3. 2. 290. 15. Linn.

syst. Nat. 2. 885. 352. Fn. Su. 1365.

Clerk. phal. tab. 10. fig. 14.

Panz. Fn. Germ. 6. tab. 21.

Act. Berol. 3. tab. 1. fig. 6.

Hybn. Beytr. tab. 1. fig. D.

Sulz. Hist. Inf. tab. 23. fig. 9.

Wien. Verz. 140. 55.

Habitat in Lithospermo.

5. *T. alis anticis niueis: punctis 50 nigris.*

*euonymella.*

*Tinea euonymella* Ent. syst. 3. 2. 289. 12. Linn.

syst. Nat. 2. 885. 350. Fn. Su. 1363.

Geoff. Inf. 2. 183. 4.

Frish. Inf. 3. tab. 16.  
 Merian. Eur. 2. tab. 2.  
 Albin. Inf. tab. 60. fig. A. C.  
 Reaum. Inf. 2. tab. 13. fig. 12. 13.  
 Wien. Verz. 183. 18.  
 Roess. Inf. 1. phal. 4. tab. 8.  
 Wilks pap. 4. tab. 1. a. c.  
 Sulz. Inf. tab. 16. fig. 99.  
 Habitat in Euonymo, Sorbo.

- padella.* 6. T. alis anticis plumbeis: punctis 20 nigris.  
*Tinea padella* Ent. syst. 3. 2. 290. 13. Linn.  
 syst. Nat. 2. 885. 351. Fn. Su. 1364.  
 Frish. Inf. 5. tab. 6. fig. 1.  
 Reaum. Inf. 2. tab. 12. fig. 5—9.  
 Roess. Inf. phal. 4. tab. 7.  
 Harr. Inf. 7. tab. 3. fig. k. m.  
 Schaeff. Icon. tab. 145. fig. 2. 3.  
 Wien. Verz. 139. 19.  
 Habitat in Pomonae arboribus.
- plumbella.* 7. T. alis anticis plumbeis: macula media punctis numerosis apiceque fuscis.  
*Tinea plumbella* Ent. syst. 3. 2. 290. 14.  
 Wien. Verz. 139. 34.  
 Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.
- viduella.* 8. T. alis anticis atris: fasciis tribus niueis; intermedia interrupta, capite thoraceque niueis.  
*Tinea viduella* Ent. syst. 3. 2. 299. 53.  
 Habitat in Lapponia Lulensi Dom. de Paykull.
- lugubrella.* 9. T. alis anticis nigris: fasciis duabus albis, anteriore abbreviata, capite albo.



*Tinea lugubrella* Ent. syst. 3. 2. 299. 54.

Habitat in Lapponia Dom. de Paykull.

10. T. alis nigris: margine tenuiori basi albo; *funerella*.  
punctis duobus nigris.

*Tinea funerella* Ent. syst. 3. 2. 309. 98.

Habitat in Austria Dom. Schieffermüller.

11. T. ninea alis deflexis nigris: vitta communi *circulella*.  
dorsali postice ad marginem exteriorem dilata  
niuea.

*Tinea circulella* Ent. syst. 3. 2. 301. 61.

Habitat Kiliae.

12. T. alis fusco cinereis: lineola media fusciaque *undella*.  
postica undatis albis.

*Tinea undella* Ent. syst. 3. 2. 309. 96.

Habitat Kiliae.

13. T. alis niueis: latere dorsali fusco. *dorsella*.

*Tinea dorsella* Ent. syst. 3. 2. 301. 63.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

14. T. alis coerulefcentibus: latere dorsali albo *salicella*.  
thorace cristato.

*Tinea salicella* Ent. syst. 3. 2. 301. 62. Linn.

syst. Nat. 2. 887. 367. Fn. Su. 1378.

Wien. Verz. 131. 37.

Roess. Inf. 1. phal. 4. tab. 9.

Wilks pap. 5. tab. 1. a. 10.

Habitat in Europae Salice.

15. T. alis fusco aureis: vitta abbreviata macula-*flauella*.  
que fluis.

*Alucita flauella* Ent. syst. 3. 2. 332. 9.

*Tinea maiorella* Wien. Verz. 140. 1.

H h 2

Loquert  
Ill. Icon. In  
Fabr. Inf. 11  
fig 14.

Habitat in ligno antiquo Quercus.

*flauifrontella.* 16. T. alis anticis cinereis immaculatis capite fuluo.

*Tinea flauifrontella* Ent. syst. 3. 2. 305. 78.

Wien. Verz. 143. 22.

Habitat in Insectis pennisque Austriae, Galliae Mus. Dom. Bose.

*populella.* 17. T. alis griseis: punctis tribus nigris margineque nigro punctato.

*Tinea populella* Linn. syst. Nat. 2. 385. 354?

Habitat in Europae Populo.

Statura et magnitudo omnino T. undellae at distincta videtur. Antennae albo nigroque annulatae. Corpus griseum. Alae griseae siue obscure cinereae, fusco irroratae punctis in medio tribus nigris, distinctis. Margo nigro punctatus.

*applanella.* 18. T. alis depressis fuscis: punctis tribus centralibus albis.

*Pyralis applanata* Ent. syst. 3. 2. 285. 174.

Clerk. phal. tab. 2. fig. 15.

Habitat Kiliae Dom. de Schestedt.

*umbellella.* 19. T. alis planis striatis griseis: maculis approximatis emarginatis disci nigris.

*Pyralis umbellana* Ent. syst. 3. 2. 286. 177.

Habitat in umbellatis variis flores contorquens Mus. Dom. Bose.

*Heraclella.* 20. T. alis depressis griseis: anticis lineolis disci approximatis nigris.

*Pyralis heracleana* Ent. syst. 3. 2. 286. 178.

*Phalaena heracleana* Linn. syst. Nat. 2. 880. 326.

Fn. Su. 1334.

Schaeff. Inf. 1758. tab. 2. fig. 3. 4. Monogr.

Reaum. Inf. 2. tab. 6. fig. 1—4.

Degeer Inf. 1. tab. 29. fig. 6. 7.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 3. 4.

Habitat in umbellis plantarum umbelliferarum  
inprimis Heraclei contortis destructisque flo-  
ribus caules ex alis foliorum penetrans.

21. T. alis depressis fuscis: lineolis transuersis *Rutella*.  
numerosis albis, thorace denticulis duobus  
dorsalibus.

Habitat in Galliae Ruta cuius folia contorquet  
Mus. D. Bose.

22. T. alis depressis fuscis, capite thoraceque ni- *depressella*.  
ueis.

*Pyralis depressana* Ent. syst. 3. 2. 287. 180.

Habitat in Sueciae nemoribus.

23. T. alis fuscis: maculis tribus flauescens, *capitella*.  
capite ferrugineo.

*Tinea capitella* Ent. syst. 3. 2. 315. 125. Linn.

syst. Nat. 2. 894. 418. Fn. Su. 1374.

Habitat in Anglia.

24. T. alis nigro argenteoque nebulosis, capite *gemmella*.  
albo.

*Tinea gemmella* Ent. syst. 3. 2. 315. 124. Linn.

syst. Nat. 2. 894. 414. Fn. Su. 1388.

Clerk. phal. tab. 10. fig. 10.

Habitat intra folia Quercus subcutanea.

25. T. alis fusco aureis: maculis quatuor margi- *rupella*.  
nibus albis, capite rufo.

*Tinea rupella* Ent. syst. 3. 2. 315. 126.

Wien. Verz. 320. 45.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

*praelatella*. 26. T. alis violaceis: striga punctisque duobus oppositis albis.

*Tinea pra-latella* Ent. syst. 3. 2. 315. 127.

Wien. Verz. 320. 46.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

*sulphurella*. 27. T. fusca capite thorace alarum basi maculaque costali sulphureis.

*Tinea sulphurella* Ent. syst. 3. 2. 315. 128.

Habitat Hamburgi Mus. Dr. Schulz.

*bracteella*. 28. T. alis nigris basi maculaque marginali sulphureis.

*Tinea bractæella* Ent. syst. 3. 2. 313. 118. Linn.

syst. Nat. 2. 894. 415. Fn. Su. 1426.

Wien. Verz. 138. 24.

Clerk. phal. tab. 12. fig. 4.

Habitat in Carpini Betulae ligno.

*oppositella*. 29. T. alis fuscis: maculis duabus oppositis flavis, posticis fuscis.

*Alucita oppositella* Ent. syst. 3. 2. 344. 53.

Habitat in Anglia.

*6punctella*. 30. T. alis cinereis fusco fasciatis punctisque tribus atris.

*Tinea 6punctella* Ent. syst. 3. 2. 313. 115.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

*betulinella*. 31. T. alis albidis apice fusco variis.

*Alucita betulinella* Ent. syst. 3. 2. 334. 16.

Habitat in Boleto Betulino Sueciae Dom. de  
Paykull.

32. T. alis nigricantibus: fasciis duabus; poste-*leucatella*.  
riore obsoletiore, capite albo.

*Tinea leucatella* Ent. syst. 3. 2. 309. 99. Linn.  
syst. Nat. 2. 891. 391. Fn. Su. 1444.

Wien. Verz. 139. 42.

Hybn. Beyr. 3. tab. 1. fig. B.

Habitat in Europae nemoribus.

33. T. alis fusco nitidulis: fasciis duabus albis; *bifasciella*.  
posteriore interrupta, capite rufo.

*Tinea bifasciella* Ent. syst. 3. 2. 309. 100.

Habitat Hafniae Dom. de Sehestedt.

34. T. alis atris nitidulis immaculatis, antennis *antennella*.  
flavis.

*Tinea antennella* Ent. syst. 3. 2. 312. 110.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

37. T. alis virefcntibus albo punctatis fasciisque *viridella*.  
duabus interruptis brunneis.

*Tinea viridella* Ent. syst. 3. 2. 312. 109.

Habitat in Anglia Mus. Dom. Francillon.

36. T. alis atris nitidulis: punctis quatuor niueis. *spunctella*.

*Tinea spunctella* Ent. syst. 3. 2. 311. 107.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

37. T. alis nigris: anticis striga argentea. *cinctella*.

*Tinea cinctella* Ent. syst. 3. 2. 309. 97. Linn.

syst. Nat. 2. 891. 390. Fn. Su. 1380.

*Tinea ligatella* Wien. Verz. 319. 70.

Habitat in Europae hortis.

38. T. alis ciliatis exalbidis: limbo maculisque *limbella*.  
fuscis.

*Tinea limbella* Ent. syst. 3. 2. 304. 77.

Habitat in Germaniae nemoribus.

*strobilella.* 39. T. alis fusco argenteoque undatis: posticis  
fuscis, margine albo.

*Tinea strobilella* Ent. syst. 3. 2. 310. 101. Linn.

syst. Nat. 2. 892. 402. Fn. Su. 1419.

Clerk. phal. tab. 12. fig. 10.

Wien. Verz. 135. 24.

Habitat in Abietis strobilibus.

*nitidella.* 40. T. alis anticis argenteis: lineola baseos arcu-  
que communi dorsali fuscis.

*Tinea nitidella* Ent. syst. 3. 2. 291. 16.

Wien. Verz. 137. 58.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

*cornella.* 41. T. alis nuceis: fascia punctisque numerosis  
fusco aureis.

*Tinea cornella* Ent. syst. 3. 2. 291. 17.

*Tinea sparsella* Wien. Verz. 141. 66.

Habitat in Germaniae Corno.

*variella.* 42. T. alis anticis nigris: linea baseos punctis duo-  
bus fasciisque duabus abbreviatis nuceis.

*Tinea variella* Ent. syst. 3. 2. 299. 55.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

*marmorella.* 43. T. alis anticis nigris flavo maculatis.

*Alucita variella* Ent. syst. 3. 2. 336. 20.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

*tesserella.* 44. T. alis fusco alboque tessellatis, capite palli-  
de testaceo.

*Tinea tesserella* Ent. syst. 3. 2. 298. 48.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

45. T. alis obscure fuscis nitidulis immaculatis, *obscuraella*.  
*Tinea obscuraella* Ent. syst. 3. 2. 312. 112,  
 Habitat in Suecia Dom. de Paykull,  
 Antennae albo nigroque annulatae.
46. T. alis fuscis: maculis duabus dorsalibus al- *muscaella*.  
 bis, capite fulvo, antennis pectinatis.  
*Tinea muscaella* Ent. syst. 3. 2. 314. 122.  
 Wien. Verz. 143. 28.  
 Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.
47. T. alis basi cinereis apice fuscis. *insectella*.  
*Tinea insectella* Ent. syst. 3. 2. 303. 72.  
 Habitat in Insectis ex Africa missis Dom. Bosc.
48. T. alis cinerascens: arcu puncto que dor- *pectinella*.  
 salibus albidioribus.  
*Tinea pectinella* Ent. syst. 3. 2. 310. 103.  
 Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
49. T. grisea nigro punctata alis pallide fasciatis: *dodscella*.  
 punctis triura parium fuscis.  
*Tinea dodscella* Ent. syst. 3. 2. 311. 108. Linn.  
 syst. Nat. 2. 902. Fn. Su. 1421.  
 Degeer Inf. 1. tab. 23. fig. 22. 23.  
 Habitat intra Pini Turiones.
50. T. alis nigris apice atris: striga obliqua alba. *strigella*.  
*Tinea strigella* Ent. syst. 3. 2. 308. 93.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.
51. T. alis fusco cinereis: punctis duobus dorso- *fuscella*.  
 libus nigris.  
*Tinea fuscella* Ent. syst. 3. 2. 312. 113. Linn.  
 syst. Nat. 2. 893. 409. Fn. Su. 1349.  
 Habitat in Europae hortis.

- punctella.* 52. T. alis anticis linearibus cinerascens: punctis quatuor fuscis.  
*Tinea punctella* Ent. syst. 3. 2. 308. 95. Linn.  
 syst. Nat. 2. 890. 386. Fn. Su. 1337.  
*Tinea alucitella* Wien. Verz. 144. 40.  
 Habitat in Pomariis.
- pellionella.* 53. T. alis canis: puncto medio nigro, capite griseo.  
*Tinea pellionella* Ent. syst. 3. 2. 304. 73. Linn.  
 syst. Nat. 2. 887. 372. Fn. Su. 1415.  
 Geoff. Inf. 2. 184. 6.  
 Roeff. Inf. 1. phal. 4. tab. 17.  
 Reaum. Inf. 3. tab. 6. fig. 12—16.  
 Habitat in vestimentis pilosis.
- vestianella.* 54. T. alis cinereis: costa alba, apicibus adscendentibus plumosis.  
*Tinea vestianella* Ent. syst. 3. 2. 304. 74. Linn.  
 syst. Nat. 2. 888. 370. Fn. Su. 1417.  
 Wien. Verz. 139. 40.  
 Habitat in vestimentis, quae misere destruit.
- farcitella.* 55. T. alis cinereis thorace utrinque puncto albo.  
*Tinea farcitella* Ent. syst. 3. 2. 304. 75. Linn.  
 syst. Nat. 2. 888. 373. Fn. Su. 1416.  
 Roeff. Inf. 1. phal. 4. tab. 17.  
 Reaum. Inf. 3. tab. 6. fig. 9. 10.  
 Wien. Verz. 139. 41.  
 Habitat in vestimentis, pellibus intra folliculum occulta.
- stigmatella.* 56. T. alis sublinearibus ferrugineis: macula costali alba.



- Tinea stigmatella* Ent. syst. 3. 2. 304. 76.  
Habitat in Anglia Mus. Dom. Yeats.
57. T. alis argenteis: arcu dorsali fusco. *cucullatella*.  
*Tinea cucullatella* Ent. syst. 3. 2. 305. 80. Linn. *la*.  
syst. Nat. 2. 889. 376. Fn. Su. 1384.  
Roess. Inf. 1. phal. 4. tab. 11.  
Habitat in Sorbo intra folliculum conicum, pilosum.
58. T. alis niueis: arcu communi maculisque arcella.  
duabus marginalibus fuscis. *arcella*.  
*Tinea arcella* Ent. syst. 3. 2. 305. 81.  
Habitat in Germania Dr. Schulz.
59. T. alis atro aureis: macula baseos fasciaque *Olivivella*.  
medea flavis. *Coquebert*  
*Tinea Olivivella* Ent. syst. 3. 2. 316. 132. *Jll. Icon. Insc. 1*  
Habitat Parisiis Mus. Dom. Bose. *1ap. 7. fig. 12*
60. T. alis subgriseis: litara dorsali flava apiceque *Petivarella*.  
punctis tribus nigris.  
*Tinea Petivarella* Ent. syst. 3. 2. 317. 133.  
Linn. syst. Nat. 2. 895. 423. Fn. Su. 1381.  
Clerk. phal. tab. 12. fig. 11.  
Wien. Verz. 136. 31.  
Habitat in Europae hortis.
61. T. antennis albo annulatis, alis griseo fuscis: *Listerella*.  
puncto apicis nigro.  
*Tinea Listerella* Ent. syst. 3. 2. 317. 135. Linn.  
syst. Nat. 2. 896. 432. Fn. Su. 1395.  
Wien. Verz. 139. 30.  
Habitat in Europae hortis.
62. T. alis flavescentibus argento striatis: macu- *Geoffroyella*.  
lis duabus sulphureis marginalibus. *la*.  
*of. Coquebert, Jll. Icon. Insc. Fabr.*  
*1ap 17. fig. 12*

*Tinea Geoffroyella* Ent. syst. 3. 2. 318. 139.  
Linn. syst. Nat. 2. 896. 430.  
Habitat in Europa australiori.

*cornutella.* 63. T. alis anticis nigro aureis basi flavo lineatis  
maculisque duabus flavis oppositis,  
Habitat in Gallia.

Antennae mediocres atrae, annulo anteapicem  
albo. Palpi flavescentes. Alae anticae ni-  
gro aureae lineis duabus aut tribus flavis a  
basi ad medium ductis. Pone medium ma-  
culae duae flavae oppositae.

*Knochella.* 64. T. alis fusco aureis; linea abbreviata puncto-  
que apicis niveis.

*Tinea Knochella* Ent. syst. 3. 2. 318. 137.  
Habitat in Thymo Serpyllo Germaniae Dom.  
Hybner.

*Fabricella.* 65. T. alis aureis: maculis punctisque niveis, po-  
sticis fulvis.

*Tinea Fabricella* Ent. syst. 3. 2. 319. 140.  
*Tinea Fabricella* Swed. Act. Holm. 1787.  
277. 28.

Habitat in India orientali Dom. Lee.

*Denifella.* 66. T. alis fuscescentibus: lineola fasciaque albis.

*Tinea Denifella* Ent. syst. 3. 2. 319. 141.  
Wien. Verz. 138. 23.

Habitat in Austria. Mus. Dom. Schieffermyller.

*Schaefferella.* 67. T. alis nigris: disco flavo, strigis lineis dua-  
bus punctisque tribus argenteis.

*Tinea Schaefferella* Ent. syst. 3. 2. 322. 155.  
Linn. syst. Nat. 2. 898. 443. Fn. Su. 1409.

Wien. Verz. 138. 21.

Habitat in Fagi foliis subcutanea.

68. T. alis nigris; disco aureo maculaque marginali postica alba. *Schwarzella*.

Habitat in Germania.

Statura omnino praecedentis. Alae anticae aureae limbo teniori nigro. In disco lineae duae submarginales a punctis argenteis. Punctum ultimum argenteum lineae exterioris terminatur macula marginali alba.

Dom. Schwarz Norimbergensis Roefellii continuator felicissimus.

69. T. atra capite ano alarumque punctis quatuor *quadrella* niveis.

*Tinea quadrella* Ent. syst. 3. 2. 298. 51.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

70. T. alis flavis; margine exteriori et interiori *Colutella* niveis.

*Alucita Colutella* Ent. syst. 3. 2. 337. 24.

Reum. Inf. 3. tab. 11. fig. 1—4.

Habitat in Colutea arborecente folliculum incurvum e cortice arboris struens Dom. Bosc.

71. T. alis auratis; macula apicis purpurea. *Thunbergella*.

*Tinea Thunbergella* Ent. syst. 3. 2. 326. 170.

Habitat in Gallia Dom. Bosc.

Thunberg Professor Upsaliensis, Capitis Bonae spei et Japoniae investigator, olim comes amicissimus per campos nemoraque Upsaliensia.

72. T. alis auratis argenteo subfasciatis; angulo *Fyestella* ani macula atra; punctis tribus argenteis.

*Tinea Fysesella* Ent. syst. 3. 2. 318. 138.  
Habitat in Germania Dom. de Huttonff.

*mediella.* 73. T. alis testaceis: macula magna costali niuea.  
*Alucita mediella* Ent. syst. 3. 2. 337. 26.  
Habitat in Germaniæ nemoribus.

*granella.* 74. T. alis albo nigroque variis, capite niueo.  
*Alucita granella* Ent. syst. 3. 2. 334. 15.  
Linn. syst. Nat. 2. 889. 377. Fn. Su. 1313.  
Geoff. Inf. 2. 186. 11.  
Wien. Verz. 141. 77.  
Leuwenh. Epist. 1692. mart. 7.  
Reaum. Inf. 3. tab. 20. fig. 14—16.  
Roess. Inf. 1. phal. 4. tab. 12.  
Bach. Microsc. tab. 13. fig. 13.  
Degeer Act. Holm. 1746. 48.  
Habitat in frumentorum granariis femina rodens glomeransque, hyeme parietes ascendit.

*Roessella.* 75. T. alis nigro auratis: punctis nouem argenteis connexis submarginalibus.  
*Tinea Roessella* Ent. syst. 3. 2. 324. 163. Linn. syst. Nat. 2. 898. 445. Fn. Su. 1406.  
Wien. Verz. 143. 30.  
Frish. nf. 3. 31. tab. 4.  
Clerk. phal. tab. 12. fig. 13.  
Degeer Inf. tab. 30. fig. 10—12.  
Habitat in Mali folis subcutanea, nitidissima.

*Leuwenhoekella.* 76. T. alis auratis: striga baseos punctisque quatuor oppositis argenteis.  
*Tinea Leuwenhoekella* Ent. syst. 3. 2. 325. 164.  
Linn. syst. Nat. 2. 897. 437. Fn. Su. 1400.

Wien. Verz. 141. 7.

Habitat in Europae hortis.

77. T. alis fusco auratis: punctis quatuor eleva- *Linneella*.  
tis argenteis.

*Tinea Linneella* Ent. syst. 3. 2. 325. 166. Linn.

syst. Nat. 2. 898. 4-6. Fn. Su. 1408.

Geoff. Inf. 2. 200. 45.

Clerk. phal. tab. 12. fig. 8.

Habitat in Pomonae arboribus.

78. T. alis auratis: maculis septem argenteis, se- *Rajella*.  
cunda tertiaque connatis.

*Tinea Rajella* Ent. syst. 3. 2. 326. 167. Linn.

syst. Nat. 2. 898. 447. Fn. Su. 1407.

Wien. Verz. 143. 32.

Degeer Inf. 1. tab. 31. fig. 11. 12.

Habitat in Alni foliis subcutanea.

79. T. alis auratis basi fasciis duabus maculisque *Schreberella*.  
duabus apicis argenteis nitidissimis. *la*.

*Tinea Schreberella* Ent. syst. 3. 2. 326. 168.

Habitat in Anglia Dom. Yeats.

80. T. alis auratis: strigis quatuor argenteis, po- *Klemannella*.  
sticis duabus interruptis punctoque termina- *la*.  
li atro.

*Tinea Klemannella* Ent. syst. 3. 2. 326. 169.

Habitat Hamburgi Dr. Schulz.

81. T. alis auratis: striga antica lineolisque tri- *Hermannella*.  
bus argenteis disci, apice fuscis. *la*.

*Tinea Hermannella* Ent. syst. 3. 2. 324. 162.

Habitat Hamburgi Dr. Schulz.

- Rhediella.* 82. T. alis nigris apice fulvis: strigis interruptis argenteis.  
*Tinea Rhediella* Ent. syst. 3. 2. 324. 161. Linn. syst. Nat. 2. 895. 444. Fr. Su. 1405.  
 Clerk. phal. tab. 12. fig. 12.  
 Habitat in Europae arboretis.
- Brongniardella.* 83. T. alis flavescentibus: strigis quatuor albis atrae innatis.  
 Habitat in Gallia Dom. Bose.  
 Statura et summa affinitas T. syringellae. Caput album. Thorax fuscus. Alae anticae flavescentes strigis quatuor distinctis albis, quae antice striga atra terminantur. Macula atra ad apicem marginis interioris: punctis duobus albis. Posticae cinereae. Pedes albo nigroque annulati.  
 Brongniard junior exurgens Professor Parisiensis amicissimus entomologiam Parisinam observat.
- Syringella.* 84. T. alis auratis, strigis variis albis, posticis nigro marginatis.  
*Tinea Syringella* Ent. syst. 3. 2. 328. 177.  
 Habitat in Germaniae Syringa.
- Forsterella.* 85. T. alis fusco auratis: arcu dorsali lineolisque marginalibus argenteis, apice macula atra: pupilla argentea.  
*Tinea Forsterella* Ent. syst. 3. 2. 328. 176.  
 Habitat Hamburgi Mul. Dr. Schulz.
- Esperella.* 86. T. alis cinereis: strigis tribus abbreviatis lineolisque duabus apicis argenteis fusco marginatis.

*Tinea Esperella* Ent. syst. 3. 2. 320. 145.

Habitat in Africa Mus. Dom. Banks.

87. T. alis auratis: fasciis duabus punctisque tribus argenteis. *Goedartella*

*Tinea Goedartella* Ent. syst. 3. 2. 320. 146.

Linn. syst. Nat. 2. 897. 436. Fn. Su. 1401.

Wien. Verz. 123. 31.

Clerk. phal. tab. 12. fig. 14.

Habitat in Alnetis, in Betulae gemmis.

88. T. alis nigris: fasciis tribus argenteis transverse diuaticis. *Merianella*

*Tinea Merianella* Ent. syst. 3. 2. 320. 147. Linn.

syst. Nat. 2. 897. 438. Fn. Su. 1402.

Geoff. Inf. 2. 198. 43.

Wien. Verz. 143. 31.

Reaum. Inf. 1. tab. 17. fig. 12.

Habitat in Europae Pruno Pado.

89. T. alis cupro auratis: fasciis duabus maculisque apicis flauissimis. *Allionella*

*Tinea Allionella* Ent. syst. 3. 2. 321. 148.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

90. T. alis nigris: strigis tribus nigro argenteis; tertia interne bifida. *Schieffermyllerella*

*Tinea Schieffermyllerella* Ent. syst. 3. 2. 321.

150.

Habitat Hamburgi Mus. Dr. Schulz.

91. T. alis planis auratis: limbo atro; punctis argenteis numerosis. *Bergstraeffella*

*Tinea Bergstraeffella* Ent. syst. 3. 2. 321. 151.

Habitat in Germania Dom. de Hattorff.

- Schulzella.* 92. T. alis auratis: lineis duabus oppositis marginalibus punctorum argenteorum, costa atra.  
*Tinea Schulzella* Ent. syst. 3. 2. 321. 152.  
 Habitat in Americae meridionalis Insulis Dr. Pflug.
- Myllerella.* 93. T. alis auratis: strigis duabus baseos striisque apicis argenteis.  
*Tinea Myllerella* Ent. syst. 3. 2. 325. 165.  
 Habitat in Europae hortis.
- Seppella.* 94. T. alis auratis: strigis duabus argenteis.  
*Tinea Seppella* Ent. syst. 3. 2. 320. 144.  
 Habitat in Anglia.
- Albinella.* 95. T. alis fuscis: linea unica aurea antrosum arcuata.  
*Tinea Albinella* Ent. syst. 3. 2. 319. 143. Linn. syst. Nat. 2. 897. 455. Fn. Su. 1398.  
 Habitat in Europae arboretis.
- Stroemella.* 96. T. alis atris: punctis quatuor argenteis maculisque quatuor marginalibus flavis.  
*Tinea Stroemella* Ent. syst. 3. 2. 323. 157.  
 Habitat in Norwegiae nemoribus.
- Gleichella.* 97. T. alis planis atris: fascia media maculisque duabus apicis oppositis argenteis.  
*Tinea Gleichella* Ent. syst. 3. 2. 323. 158.  
*Tinea metallella* Wien. Verz. 144. 34.  
 Habitat in Anglia Mus. Dom. Yeats.
- cydoniella.* 98. T. alis auratis: lineola baseos punctisque quatuor parium albissimis.  
*Tinea cydoniella* Ent. syst. 3. 2. 323. 159.



Wien. Verz. 144. 35.

Habitat in Pyro Cydonia Dom. Schieffermyller.

99. T. alis argenteis postice subcaudatis fusco stri- *Clerkella*.  
atis punctoque atro.

*Tinea Clerkella* Ent. syst. 3. 2. 329. 181. Linn.

syst. Nat. 2. 899. 450. Fn. Su. 1411.

Habitat in Europa boreali.

100. T. alis argenteis nitidis: fasciis tribus fla- *hortella*.  
uis, tertia interrupta lineolaque apicis nigra.

*Tinea hortella* Ent. syst. 3. 2. 327. 174.

Habitat Parisiis Dom. Bosc.

101. T. alis fusco argenteis: fascia postica aurea. *Drurella*.

*Tinea Drurella* Ent. syst. 3. 2. 327. 172.

Habitat Hafniae.

102. T. alis atris nitidis: punctis quinque niue- *10guttella*.  
is, duobus communibus, capite fuluo.

*Tinea 10guttella* Ent. syst. 3. 2. 311. 106.

Habitat Parisiis Dom. Bosc.

103. T. alis flavescentibus fusco variis: punctis *blandella*.  
tribus atris.

Habitat Kiliae.

Parua. Antennae albo nigroque annulatae.

Caput et thorax flavescentia. Alae flavescentes fusco parum variegatae punctis tribus distinctis atris, anteriore ad marginem tenuiorem duobusque in medio uno post alterum; posteriore maiore.

104. T. alis argenteis: lineolis obliquis margina- *Cramerella*.  
libus fasciis punctoque apicis atro.

*Tinea Cramerella* Ent. syst. 3. 2. 327. 173.

Habitat in Anglia.

- aurella.* 105. T. alis auratis postice atris: fascia argentea.  
*Tinea aurella* Ent. syst. 3. 2. 329. 180.  
 Wien. Verz. 142. 9.  
 Habitat in Lipsiae Pomona.
- Blancardella.* 106. T. alis auratis: lineola apicis maculisque septem marginalibus argenteis.  
*Tinea Blancardella* Ent. syst. 3. 2. 327. 175.  
 Habitat in Anglia Dom. Yeats.
- Podella.* 107. T. alis nigris: fascia alba.  
*Alucita Podella* Ent. syst. 3. 2. 341. 42. Linn.  
 syst. Nat. 2. 896. 428.  
 Geoff. Inf. 2. 194. 32.  
 Habitat in Europa.
- Paykullella.* 108. T. alis fulvo cupreis: basi fascia media maculaque apicis flavo aureis.  
*Alucita Paykullella* Ent. syst. 3. 2. 340. 38.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.
- parvella.* 109. T. alis obscure cinereis: maculis duabus costalibus fuscis.  
*Alucita parvella* Ent. syst. 3. 2. 343. 50.  
 Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom.  
 v. Rohr.
- minutella.* 110. T. alis albidis: fasciis tribus fuscis.  
*Alucita minutella* Ent. syst. 3. 2. 344. 51.  
 Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom.  
 von Rohr.
- festicella.* 111. T. alis anticis albis: maculis duabus fuscis apice flavis.  
*Alucita festicella* Ent. syst. 3. 2. 344. 52.

Wien. Verz. 319. 80.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

112. T. alis albis nigro punctatis annuloque communi dorsali inaequali eleuato, apice emarginatis. *Clairvillella.*

Habitat in Heluetiae Malo Dom. de Clairville.

Caput album, immaculatum. Thorax postice eleuatus, niueus. Alae albae, nigro punctatae in medio dorsi macula annulata, eleuata, atra. Margo posticus late emarginatus emarginatura atra.

*Larua* viridis: lateribus nigro punctatis.

*Puppa* folliculata: folliculo albo antice posticeque attenuato.

Dom. de Clairville amicissimus Heluetiae Entomologiam strenue obseruauit.

113. T. alis cinereis: pari punctorum dorsali atro postice eleuatis acuminatis. *Schellenbergella.*

Habitat in Heluetiae Loncera Dom. de Clairville.

Statura et magnitudo praecedentis. Caput et thorax cinerea, immaculata. Alae cinerae, in medio dorsi pari punctorum atrorum, postice eleuatae, acuminatae.

*Larua* cinerea dorso inaequali eleuato punctisque anticis atris.

*Puppa* utrinque attenuata folliculo flauescente. Dom. Schellenberg amicissimus Heluetiae Insecta delineauit.

*Helwigella*. 114. T. alis acuminatis cinereis; pari dorsali punctorum nigrorum margineque exteriori albo.

Habitat in Heluetiae Evonymo Dom. de Clairville,

Praecedenti affinis. Caput et thorax cinerea, immaculata. Alae posticae acuminatae, cinerae margine exteriori albo parique punctorum atrorum in medio dorso.

*Larva* nigricans linea dorsali e maculis concatenatis quadratis flavis.

*Pupa* brunnea in folliculo utrinque attenuato, fluo.

Dom. Helwig Professor Brunswicensis Insectorum obervator eximius.

Ultimae tres species mihi haud rite examinatae ideoque de genere haereo.

**ALUCITA.** *Palpi* duo recurui, hirsutissimi,

*Antennae* elongatae, setaceae.

*Reaumurella*. 1. A. alis nigris extrorsum deauratis, antennis longissimis,

*Alucita Reaumurella* Ent. syst. 3. 2. 342. 44.

Linn. syst. Nat. 2. 895. 425. Fn. Su. 1392.

Geoff. Inf. 2. 192. 28.

Wien, Verz. 143. 22.

Habitat in Europae Salice.

*Latreillella*. 2. A. alis aureis: punctis duobus oppositis niucis.

Habitat in Galliae arbuftis.

Statura omnino A. Reaumurellae. Antennae longiffimae, nigrae, apice albae. Caput et thorax hirta, nigra. Alae aureae, nitidae: punctis duobus albis, oppofitis.

*Latreille* amiciffimus Gallus Infeftorum characteres genericos elaborare tentat.

3. A. alis pallidis immaculatis, antennis longiffimis. *Swammerdammella.*

*Alucita Swammerdammella* Ent. fyft. 3. 2. 338.

31. Linn. fyft. Nat. 2. 895. 423. Fn. Su. 1381.

Wien. Verz. 141. 2.

Clerk. phal. tab. 12. fig. 1.

Habitat in Europa frequens.

4. A. alis viridi aureis, corpore atro, antennis *vindella* albis.

*Alucita vindella* Ent. fyft. 3. 2. 341. 43.

Wien. Verz. 142. 4.

Habitat in Austria Muf. Dom. Schieffermyller.

5. A. alis pallidis fubtiliffime fulco reticulatis, capite fulvo, antennis albis. *Panzerella.*

*Alucita Panzerella* Ent. fyft. 3. 2. 339. 32.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

6. A. alis fufcefcentibus immaculatis. *pilella.*

*Alucita pilella* Ent. fyft. 3. 2. 339. 33.

Wien. Verz. 142. 6.

Habitat in Austria Muf. Dom. Schieffermyller.

7. A. alis fufcis: angulo ani albo. *Robertella.*

*Alucita Robertella* Ent. fyft. 3. 2. 339. 34. Linn.

fyft. Nat. 2. 896. 429. Fn. Su. 1394.

Habitat in Europae Pomona.

- Degeerella*. 8. A. alis atro aureis: fascia flava.  
*Alucita Degeerella* Ent. syst. 3. 2. 341. 40. Linn.  
 syst. Nat. 2. 895. 426. Fn. Su. 1393.  
 Geoff. Inf. 2. 193. tab. 12. fig. 5.  
 Wien. Verz. 143. 21.  
 Degeer Inf. 1. tab. 32. fig. 13.  
 Habitat in Europae hortis frequens.
- Sulzella*. 9. A. alis aeneo nigris: fascia aurea.  
*Alucita Sulzella* Ent. syst. 3. 2. 341. 41. Linn.  
 syst. Nat. 2. 896. 427.  
 Wien. Verz. 123. 24.  
 Habitat in Europae hortis.
- Frishella*. 10. A. antennis apice albis, alis fusco auratis.  
*Alucita Frishella* Ent. syst. 3. 2. 339. 35. Linn.  
 syst. Nat. 2. 896. 433. Fn. Su. 1396.  
 Wien. Verz. 319. 82.  
 Habitat in Europae floribus frequens.
- calthella*. 11. A. atra alis anticis totis aureis, capite ferrugineo.  
*Alucita calthella* Ent. syst. 3. 2. 340. 37. Linn.  
 syst. Nat. 2. 895. 422. Fn. Su. 1432.  
 Wien. Verz. 142. 16.  
 Habitat in Calthae floribus frequens.
- Erxlebella*. 12. A. antennis unicoloribus: alis anticis fusco aureis, posticis nigris, capite fulvo.  
*Alucita Erxlebella* Ent. syst. 3. 2. 340. 36.  
 Habitat Goettingae Dr. Schulz.
- promulella*. 13. A. alis anticis fusco aureis posticis flavis: margine nigro.

*Alucita promutella* Ent. syst. 3. 2. 340. 39.

Wien. Verz. 142. 17.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

14. *A. alis cupro aureis nitidis.*

*cuprella,*

*Alucita cuprella* Ent. syst. 3. 2. 342. 45.

Wien. Verz. 330. 44.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

15. *A. alis auratis: fascia fusca, antennis apice fasciella,*  
*albis.*

*Alucita fasciella* Ent. syst. 3. 2. 342. 46.

Wien. Verz. 142. 20.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller. *Sparman-*

16. *A. alis auro purpureoque variegatis nitidif-*  
*fimis.*

*nella,*

*Logaeber*

*Tinea Sparmannella* Ent. syst. 3. 2. 324. 160.

*Ill. Fl. Ins.*

Habitat Parisiis Dom. Bosc.

*Plaf. 7. fig.*

**YPSOLOPHUS.** *Palpi* duo porrecti,  
medio dilatati, un-  
gue arcuato, acu-  
to, retractili.

*Antennae* filiformes.

1. *Y. alis incumbentibus ferrugineis: macula co-*  
*stali obsoleta, flava,*

*cornutus,*

Habitat in arborum gemmis Galliae D. Bosc.

Medius. Caput et thorax obscura antennis al-  
bo nigroque variis. Alae incumbentes, fer-  
rugineae macula magna, obsoleta, flava in  
medio costae. Posticae nigrae margine al-  
bido.

*unguiculatus.* 2. Y. alis incumben-  
tibus obscure cinereis: macu-  
la dorsali strigataque postica fuscis.

*Loquerech* Habitat in arborum gemmis Galliae Dom. Bose.

*M. Tron.* Statura et magnitudo praecedentis. Antennae  
*Jns. Fahr* cinereo fuscoque variae. Caput et thorax  
*tab 17. fig. 16.* cinerea. Alae incumbentes obscure cine-  
reae macula media parva strigataque pone ma-  
culam fere obsoleta fuscis. Posticae fuscae.

*vittatus.* 3. Y. alis deflexis albis fusco lineatis: punctis mar-  
gineque postico atris.

*Alucita vittella* Ent. syst. 3. 2. 332. 10.

*Phalaena vittella* Linn. syst. Nat. 2. 890. 382.

Fn. Su. 1366.

Wien. Verz. 136. 42.

Clerk. phal. tab. 3. fig. 10.

Degeer Inf. 1. tab. 26.

Habitat in Hesperis matronalis gemmis.

*ustulatus.* 4. Y. alis incumben-  
tibus linearibus fusco brun-  
neis apice ustulatis.

*Tinea ustulella* Ent. syst. 3. 2. 307. 88.

Habitat in Italia.

*elongatus.* 5. Y. alis incumben-  
tibus linearibus testaceis im-  
maculatis.

*Tinea elongella* Ent. syst. 3. 2. 307. 89, Linn.  
syst. Nat. 2. 890. 385. Fn. Su. 1436.

*Tinea ciliella* Wien. Verz. 136. 51.

Habitat in Europae hortis.

*hemedactylus.* 6. Y. alis incumben-  
tibus linearibus pallide testa-  
ceis rufo irroratis.

*Tinea hemedactylella* Ent. syst. 3. 2. 307. 52.



Wien. Verz. 144. 41.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

7. Y. alis incumbentibus ciliatis cinereis nitidulis *Oleae*,  
immaculatis.

*Tinea oleella* Ent. syst. 3. 2. 308. 53.

Habitat in nucleis fructus *Oleae*, quos cadere  
facit ante maturitatem. Mus. Dom. Bosc.

8. Y. alis incumbentibus linearibus fuscis: macu- *cylindricus*,  
lis tribus flavis.

*Tinea cylindrella* Ent. syst. 3. 2. 308. 54.

Habitat Hamburgi Mus. Dr. Schulz.

9. Y. alis anticis cinereis fusco irroratis: dorso *dorsatus*,  
communi albido; maculis duabus nigris.

*Alucita dorsella* Ent. syst. 3. 2. 336. 22.

Habitat in Saxonia Dom. Hybner,

10. Y. alis postice acuminatis eleuatis rufis: mar- *harnatus*,  
gine communi dorsali dentato flauo.

Habitat in Heluetiae *Lonicera*, *Grossularia* D.  
de Clairville.

Statura et magnitudo Y. sylvarum. Caput et  
thorax flavescentia. Alae deflexae, postice  
acuminatae, eleuatae, rufae margine inte-  
riori, communi ultra medium flauo, den-  
tem unum alterumue exferente.

*Larua* flavescens, dorso sanguineo.

*Puppa* folliculo cylindrico, utrinque attenuato,  
cinereo.

11. Y. alis flauo auratis: fasciis duabus fuscis ob- *sylvarum*,  
liquis.

*Alucita syluella* Ent. syst. 3. 2. 331. 5. Linn.  
syst. Nat. 2. 893. 413.

## Habitat Upsaliae.

- nemorum.* 12. Y. alis viridi flavescentibus: anticis strigis  
*Loquebert*  
*cl. Non. Fns* duabus abbreviatis dorsalibus obscurioribus.  
*Tab. Pap. 17.* *Alucita nemorella* Ent. syst. 3. 2. 331. 6.  
*Fig. 18* Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.
- lucorum.* 13. Y. alis flavis immaculatis, capite thoraceque  
 nivicis.  
*Alucita lucella* Ent. syst. 3. 2. 332. 7.  
*Tinea antennella* Wien. Verz. 135. 19.  
 Habitat in Sueciae nemoribus.
- alpinus.* 14. Y. alis flavis: maculis oliuaceis.  
*Alucita alpella* Ent. syst. 3. 2. 332. 8.  
 Wien. Verz. 135. 21.  
 Habitat in Austriae montosis Mus. D. Schief-  
 fermyller.
- Xylostei.* 15. Y. alis cinereo fuscis: vitta dorsali communi  
 alba sinuata.  
*Alucita Xylostellata* Ent. syst. 3. 2. 330. 1. Linn.  
 syst. Nat. 2. 890. 389. Fn. Su. 1390.  
 Geoff. Inf. 2. 195.  
 Roess. Inf. 1. phal. 4. tab. 10.  
 Wien. Verz. 157. 54.  
 Habitat in Lonicera Xylosteo.
- dentatus.* 16. Y. alis fuscis apice falcatis: vitta dorsali com-  
 muni unidentata alba.  
*Alucita dentella* Ent. syst. 3. 2. 331. 4.  
*Tinea harpella* Wien. Verz. 136. 50.  
 Degeer Inf. Ueberf. 2. 1. 364. 1.  
 Habitat in Europae Caprifolio.

17. Y. alis rufo auratis: macula costali *costatus*,  
 baseos alba fusco punctata.  
*Alucita costella* Ent. syst. 3. 2. 336. 23.  
 Habitat in Anglia Dom. Drury.
18. Y. alis pallide auratis: vitta dorsali niuea; *ephippium*.  
 fascia aurea.  
*Alucita ephippella* Ent. syst. 3. 2. 330. 3.  
*Tinea pruniella* Wien. Verz. 141. 75.  
 Habitat in Europa Dr. Schulz.
19. Y. alis atris: vitta dorsali sinuata punctisque *capitatus*,  
 duobus marginalibus albis.  
*Alucita capitella* Ent. syst. 3. 2. 330. 2.  
 Habitat in Americae Insulis Dr. Pflug.
20. Y. alis obscure cinereis: vitta media dentata *sinuatus*,  
 fusca.  
*Alucita dentella* Ent. syst. 3. 2. 343. 49.  
 Habitat in Americae Insulis Dom. v. Rohr.
21. Y. alis anticis niueis: vitta communi dorsali *nyctemerus*,  
 dentata maculisque costalibus atris.  
*Alucita nyctemerella* Ent. syst. 3. 2. 333. 11.  
 Wien. Verz. 130. 38.  
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
22. Y. alis cinereo fulcis nitidulis: lineola inter- *autumnalis*,  
 rupta albida, antennis pectinatis.  
 Habitat in Gallia in autumno gelu primo veni-  
 ente Dom. Bosc.
- Media. Antennae utrinque pectinatae. Alae  
 cinereo fuscae, nitidulae linea media a basi  
 ad medium ducta, in medio interrupta, al-

---

ba, fere obsoleta. Ad marginem exteriorem lineola alia itidem albida.

*maculatus.* 23. Y. alis anticis fusco auratis: macula bascos costali niuea.

*Alucita maculella* Ent. syst. 3. 2. 333. 12.

Habitat Halae Saxonum Mas. Dom. Hybner.

---

---

CLASSIS XII.

R Y N G O T A.

OS ROSTRO: VAGINA ARTICULATA.

---

V. F L A T A.

Os rostro absque maxilla palpisque.

*Rostrum* porrectum, inflexum.

*Vagina* cylindrica, canaliculata, quadriarticulata, articulis aequalibus sub setarum basi inserta.

*Setae* tres longitudine vaginae, subaequales, setaceae, acutae, intra vaginam latentes.

*Labium* magnum, conicum, subulatum, acutum, rostrum inuoluens.

*Antennae* breues, biarticulatae, sub oculis insertae.

DELPHAX.

Os rostro absque maxilla palpisque.

*Rostrum* porrectum, inflexum.

*Vagina* cylindrica, canaliculata, triarticulata: articulis aequalibus.

*Setae* tres.

*Labium* breue, subulatum.

---

*Antennae* filiformes, biarticulatae: articulo primo maiori, lato, compresso, utrinque marginato, secundo breviori, subcylindrico, apice setigero in oculorum cantho inferiori insertae.

*Rostrum* huius generis mihi haud rite examinatum.

---

MEMBRACIS. *Labium* corneum, elongatum, apice membranaceum, subulatum.

*Antennae* subulatae, sub capitis clypeo insertae.

4—5. M. thorace foliaceo obtegente: dorso late *sinuata*.  
emarginato, corpore brunneo.

Habitat in America Dom. Hybner.

Corpus paruum colore variat, mox brunneum macula una alteraue fusca, mox griseum striga postica alba. Thorax valde productus, elytra obtegens, dorso foliaceus, in medio late emarginatus.

4—5. M. thorace foliaceo obtegente: dorso late *emarginata*.  
emarginato, corpore nigro, pedibus albis.

Habitat in Carolina Dom. Bosc.

Statura et summa affinitas praecedentis at duplo minor. Corpus nigrum striis aliquot obsoletis pedibusque albis. Thorax foliaceus dorso late emarginato. Elytra apice hyalina.

6—7. M. thorace foliaceo rotundato fusco: stri-*fuscata*.  
ga ante marginem anticum fasciaque postica albis.

Habitat in India orientali Dom. Hybner.

Statura omnino M. fasciatae. Thorax foliaceus, rotundatus, fuscus striga tenui ante

marginem anteriorem fasciaque latiore ante apicem albis. Apex acuta, nigra. Elytra fusca.

*rupicapra.* 13—14. M. thorace tricorni: cornu intermedio sublongiori recuruo, elytris obscure hyalinis. Habitat in India Dom. Daldorff.

Corpus paruum, fuscum. Thorax cornubus tribus: lateralibus crassioribus, obtusis siue potius truncatis subdentatis intermedio posteriori, recuruo. Elytra fusco hyalina. Alae albae.

*Tarandus.* 23—4. M. thorace bicorni: cornubus fornicatis, elytris hyalinis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo M. cornutae. Corpus obscurum dorso fusco. Thorax cornubus duobus compressis, fornicatis, obtusis, postice subulatus, abdomine longior. Elytra hyalina, fusco venosa. Alae albae. Pedes ferruginei.

*Capra.* 23—4. M. thorace bicorni postice breui emarginato, corpore fusco.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Corpus M. cornuta minus, totum fuscum, immaculatum. Thoracis cornua magna, crassa, obtusa postice brevis, emarginatus. Elytra fusca.

*minuta.* 32. M. thorace subinermi scabro postice producto longitudine abdominis, elytris albidis basi atris.



Habitat in India orientali Dom. de Sehestedt.  
 Minuta. Caput et thorax atra, punctis eleuatis scabra. Thorax postice productus attenuatus, ante apicem parum eleuatus longitudine abdominis. Elytra obscure albida, fusco submaculata, basi atra. Alae breuiores, hyalinae. Corpus nigrum.

33. M. thorace inermi atro postice producto lon-*fasciata*.  
 gitudine abdominis, elytris basi fascia flaua.  
 Habitat in Americae Insulis Mus. Dom. Bosc.  
 Statura parua praecedentis. Caput et thorax  
 laeua, atra, immaculata. Elytra obscura  
 basi fascia flaua.

**TETTIGONIA.** Os rostro inflexo.  
 Vagina biarticulata,  
 gulae inserta.  
 Antennae setaceae.

- 22—3. T. thorace postice atro testaceo macula-*sguttata*.  
 to, elytris basi nigris: punctis quatuor albis.  
 Habitat Cajennae Mus. Dom. Bosc.  
 Statura et magnitudo T. plebejae. Caput pal-  
 lidum fasciis duabus parallelis, atris. In  
 medio fasciae dilatatae superioris stemmata  
 tria, inferioris puncta duo maculaque palli-  
 da. Thorax antice rufus, in medio fascia  
 lata pallida, postice ater macula magna tri-  
 furca, testacea. Abdomen nigrum. Elytra  
 basi ad medium nigra punctis quatuor mag-  
 nis, albis 3. 1. apice hyalina. Alae breues  
 nigrae margine postico albo.

*costalis.*

22—3. *T. atra* elytris hyalinis: costa fulva.  
Habitat in Philadelphia Mus. Dom. Bose.

Statura praeecedentis. Caput et thorax atra.  
Abdomen nigrum segmentorum marginibus  
subtus testaceis. Elytra aquea costa late ful-  
ua, inprimis a basi ad medium. Pedes ni-  
gri femoribus anticis rufis.

*punctatā.*

23—4. *T. thorace* postice atro ferrugineo linea-  
to, alis hyalinis: stigmate albo strigisque  
duabus punctorum fuscorum.

Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.

Media. Caput et thorax antice nigro ferru-  
gineoque varia. Thorax postice ater lineis  
tribus postice coeuntibus ferrugineis. Scu-  
tellum albidum macula media nigra. Elytra  
hyalina stigmate in medio costae albo posti-  
ceque strigis duabus anteriore e punctis  
quinque maioribus nigris, posteriore e pun-  
ctis sex. Alae hyalinae stigmate albo.

*hyalina.*

32—3. *T. nigra* thorace striga media lineolisque  
duabus ferrugineis, elytris hyalinis: stigmate  
nigro.

Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.

Parua. Caput nigrum margine antico ferru-  
gineo. Thorax niger striga media lineolis-  
que duabus posticis striga connexis, ferru-  
gineis. Scutellum nigrum macula apicis mar-  
gineque ferrugineis. Abdomen supra ni-  
grum, subtus cinereum. Elytra hyalina,  
immaculata solo stigmate costali, paruo,  
nigro.

35—6. *T. brunnea* thoracis lobo antico flavo maculato, alis hyalinis. *ma-brunnea*.

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Caput nigrum fronte atra. Thorax obscure brunneus lobo antico utrinque maculis tribus flavis. Scutellum flavum. Abdomen brunneum segmentorum marginibus flavis. Pectus albidum. Alae hyalinae costa bascos flavescente.

**FLATA.** Os labio conico rostrum involuente.

*Antennae* biarticulatae, sub oculis insertae.

1. *F. atra* alis macula ocellari albo hyalina, abdomine apice flavo. *perspicillata*.

*Cicada perspicillata* Ent. syst. 4. 27. 1.

Stoll. Cicad. tab. 1. fig. 5.

Habitat in Indiis Dr. Schulz.

2. *F. elytris compressis adscendentibus viridibus: ocellata.* punctis ocellaribus ferrugineis.

*Cicada ocellata* Ent. syst. 4. 27. 2.

Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.

---

Flatae corpus medium, oblongum, tardum, immarginatum capite paruo, compresso, utrinque carinato, carina eleuata, acuta, oculis paruis, globosis, lateralibus, sub carina insertis, thorace transuerso: lobo antico distincto, rotundato, scutello paruo, rotundato, elytris alisque magnis, aequalibus, abdomine multo longioribus, pedibus tenuibus, tibiis compressis, colore vario.

- limbata.* 3. *F. elytris deflexis viridibus: margine rubro; interiori basi nigro punctato.*  
*Cicada limbata* Ent. syst. 4. 27. 3.  
 Stoll. Cicad. tab. 11. fig. 54.  
 Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.
- candida.* 4. *F. niuea, elytris deflexis: lineolis duabus flavis.*  
 Habitat in Isle de France de Billardiere.  
 Magna. Caput et thorax niuea, immaculata.  
 Elytra deflexa, compressa, postice eleuata, acuta, niuea lineolis duabus obliquis flavis ad basin. Pedes pallidi.
- fuscata.* 5. *F. elytris deflexis nigro hyalinis immaculatis.*  
*Cicada fuscata* Ent. syst. 4. 28. 4.  
 Habitat Tranquebatiae Mus. Dom. Lund.
- phalaenoides.* 6. *F. exalbida alis deflexis patulis, elytris antice nigro punctatis.*  
*Cicada phalaenoides* Ent. syst. 4. 28. 5. Linn. syst. Nat. 2. 710. 40.  
 Stoll. Cicad. tab. 2. fig. 9.  
 Sulz. Hist. Inf. tab. 9. fig. 10.  
 Degeer Inf. 3. 222. tab. 33. fig. 6.  
 Habitat in Americae plantis.
- bipunctata.* 7. *F. exalbida elytris deflexis, thoracis margine antice punctis duobus impressis.*  
*Cicada bipunctata* Ent. syst. 4. 28. 6. Linn. syst. Nat. 2. 710. 41.  
 Habitat in America.
- retusa.* 8. *F. exalbida immaculata capite retuso.*  
*Cicada retusa* Ent. syst. 4. 28. 7.  
 Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

9. *F. grisea* elytris deflexis capite apice puncto *grisea*.  
nigro.
- Cicada grisea* Ent. syst. 4. 28. 8.  
Habitat in America Dom. v. Rohr.
10. *F. elytris deflexis viridibus: punctis tribus 3punctata*.  
albidis.
- Cicada 3punctata* Ent. syst. 4. 29. 9.  
Habitat in Africa aequinoctiali Mus. D. Banks.
11. *F. viridis elytris deflexis, alis albis, fronte viuida*.  
conica.
- Cicada viuida* Ent. syst. 4. 29. 10.  
Habitat in Americae Insulis Dom. v. Rohr.
12. *F. elytris deflexis viridibus: dorso scabro, ca- minuta*.  
pitis margine postico thoraceque linea dorfa-  
li sanguineis.
- Cicada minuta* Ent. syst. 4. 29. 11.  
Habitat in noua Hollandia Mus. D. Banks.
13. *F. flaua elytris deflexis obscuris: linea latera- marginata*.  
li flaua.
- Cicada marginata* Ent. syst. 4. 29. 12. Linn.  
. syst. Nat. 2. 616. 39.  
Habitat in Americae Insulis.
14. *F. elytris deflexis immaculatis, corpore fla- pygmaea*.  
uescente.
- Cicada pygmaea* Ent. syst. 4. 30. 13.  
Habitat in Americae meridionalis Insulis Dr.  
Pflug.
15. *F. elytris deflexis griseis: pari punctorum ni- 4punctata*.  
grorum.
- Cicada 4punctata* Ent. syst. 4. 30. 14.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom.  
Smidt.

CICADA. Os labio rotundato apice  
setaceo.

*Antennae* filiformes, sub  
oculis insertae.

*spinosa.*

16—7. C. fronte retusa flava, elytris viridibus:  
fasciis tribus albidis, oculis spinosis.

Habitat in Isle de France Mus. D. Bose.

Minor C. lanata. Frons magna, retusa, flava.  
Oculi prominuli, ferruginei spina parva,  
prominente, acuta. Caput et thorax obscu-  
riora. Elytra deflexa, viridia fasciis tribus  
obliquis, albidis. Abdomen deest, Pedes  
sanguinei.

*orbana.*

25—6. C. capite scutelloque fulvis nigro reticu-  
latis; elytris nigris apice obscure cinereis.

Habitat in America Dom. Hybner.

Statura et magnitudo omnino C. obtusae. Ca-  
put fulvum, nigro reticulatum. Thorax  
antice fulvus punctis duobus fuscis postice  
griseus. Scutellum fulvum, nigro reticula-  
tum. Elytra nigra apice late obscure cine-  
reae. Abdomen fulvum dorso atrò.

*Danais.*

28—9. C. viridis elytris hyalinis apice nigris,

Habitat — — Dòm. Weber.

Magnitudo C. elongatae. Caput et thorax vi-  
ridia. Abdomen flavescens, Elytra hyali-  
na margine tenuiore tenuissime posticoque

latiori nigris. Stigma ordinarium fuscum ad marginem crassiolem.

- 46—7. *C. viridis* capite subelevato; puncto apice *graminea*,  
 cis atro.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statara omnino *C. prasinae* at paullo minor et distincta. Corpus totum viride puncto solo atro in apice capitis postice parum elevati.

- 67—8. *C. supra coccinea nigro variegata.* *cruenta*.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Parua. Caput sanguineum, punctis duobus anticis maculaque bascos cum thoracis coeunte atris. Thorax sanguineus macula apicis utrinque cuspidata atra. Scutellum atrum linea media apiceque sanguineis. Elytra sanguinea vitta lata media futuraque atris. Corpus flavescens.

- 67—8. *C. nigra* capite thoraceque vitta lata alba, *festiva*.  
 elytris punctis duobus adjacentibus macula coccinea.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Parua. Caput et thorax nitida vitta lata dorsali niuea. Scutellum nigrum, immaculatum. Elytra nigra versus apicem punctis duobus oppositis niueis adjacentibus macula magna postica, coccinea. Corpus pallidum abdomine coccineo, ano nigro.

- 86—7. *C. obscura* elytris nigris; puncto medio *parvula*,  
 apiceque hyalinis.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Minuta. Caput margine undique eleuato fuscum margine lineaque media pallidis. Thorax niger, immaculatus. Elytra nigra puncto magno medio apiceque nigro neruoso hyalinis.

DELPHAX. Os labio breui conico.

*Antennae* compressae, marginatae, in oculorum cantho inferiori insertae.

*crassicornis*. 1. *D. pallida* elytris albo nigroque variis.

1 *Cicada crassicornis* Panz. Fn. Germ. 35. tab. 19. Habitat in Germania australiori Dom. Panzer. Antennae pallidae margine fusco. Caput et thorax pallida macula ouata, atra utrinque ad scutellum. Elytra hyalino atroque varia. Corpus pallidum.

*clauicornis*. 2. *D. fusca* elytris hyalinis: striga postica fusca.

1 *Cicada clauicornis* Ent. syst. 4. 41. 62. Habitat Parisiis Dom. Bosc.

CERCOPIS. Os labio abbreviato, truncato, emarginato.

*Antennae* filiformes, sub capitis margine prominulo insertae.

*gigas*.

1—2. *C. capite* thoraceque pallidis ferrugineo lineatis, elytris fuscis: fascia punctisque albis.

---

Delphax corpus paruum, ouatum, immarginatum, agile, capite ouato, transuerso, antennis vix thorace



Habitat Cajennae Dom. Dymiril.

Magna in hoc genere. Caput et thorax pallida lineis quatuor ferrugineis: intermediis antice coeuntibus. Scutellum fuscum. Elytra fusca, in medio fascia posticeque punctis tribus versus marginem exteriorem albis. Corpus fuscum.

11—12. *C. atra* elytris testaceis: futura litura-*bicolor*.<sup>○</sup>  
que postica nigris.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Daldorff.

Magnitudo et statura praecedentium. Caput et thorax atra, immaculata. Elytra testacea margine interiori punctisque aliquot versus angulum ani nigris. Alae albae.

23—4. *C. capite* thoraceque nigris: fascia flava, *transversa*.<sup>○</sup>  
elytris pallidis immaculatis.

Habitat in Kiliae plantis.

Statura et magnitudo omnino *C. striatae*. Caput supra nigrum fascia lata flava, subtus flauum. Thorax niger fascia lata, media, flava. Scutellum nigrum punctis duobus minutis lineolaque parua versus apicem flauis. Elytra pallida, immaculata. Corpus nigrum ano pedibusque pallidis.

---

longioribus, marginatis, sub oculis in cantho ipso insertis oculis magnis, rotundatis, prominulis, laterali-  
bus, thorace breui, transuerso, scutello triangulari, elytris deflexis longitudine alarum, abdomine longioribus, pedibus tenuibus, elongatis, ciliatis, colore obscuro.

- *lateralis*. 24—5. *C. atra* atomis lineisque obsoletis flavis, elytrorum margine sanguineo.  
 Habitat in Carolina Mus. Dom. Bose.  
 Statura omnino *C. leuceptalmae*. Caput, thorax, scutellum atra atomis minutis, numerosis, flavis. Elytra atra lineis tenuissimis, flavis. Linea lateralis lata sanguinea margine tamen ipso atro. Corpus atrum linea laterali flava.

- *albipennis*. 43—4. *C. pallida* thorace fusco, elytris albis: macula baseos strigaeque fuscis.  
 Habitat in Gallia Dom. Bose.  
 Statura praecedentium. Corpus pallidum. Thorax fuscus, immaculatus. Elytra alba macula magna baseos strigaeque postica obliqua fuscis.

### NOTONECIA. Os rostro arcuato.

*Labium* conicum, elongatum, subulatum.

*Antennae* sub oculis insertae.

- ciliata*. 3—4. *N. exalbida* thoracis margine dilatato deflexo ciliato.  
 Habitat in Indiae aquis Dom. Daldorff.  
*N. niuea* duplo maior. Caput pallidum oculis magnis, ovatis, castaneis, Thorax transversus, exalbidus margine utrinque lobo deflexo, rotundato, ciliato. Elytra rotunda-

ta, integra, exalbida, pellucida, immaculata. Abdomen nigrum per elytra conspicuum.

**NAUCORIS.** Os rostro subinflexo.

*Setae* tres inaequales.

*Labium* porrectum, rotundatum.

*Antennae* brevissimae, sub oculis insertae.

- 1—2. *N. abdominis* margine ferrato, capite *thomaculata*,  
raceque virescentibus fusco maculatis, elytris fuscis.

Habitat in Galliae aquis Dom. Bose.

Distincta omnino a *N. aestivali*. Caput virescens linea media ad basin dilatata maculisque utrinque duabus fuscis. Thorax virescens lineis quatuor latis, fuscis. Scutellum et elytra nigra, immaculata. Corpus virescens ano fuscescente.

- 3—4. *N. abdominis* margine integro supra nigra, *oculata*,  
pedibus anticis biunguiculatis.

Habitat in Carolina Dom. Bose.

Affinis *N. nepaeformi* at omnino distincta. Caput paruum oculis valde prominentibus, ovatis canthoque oculorum subspinoso. Thorax inaequalis, niger. Elytra nigra, immaculata. Pedes antici vix incrassati tibiis elongatis, incurvis apice unguibus duobus incurvis, acutis, validis.

ACANTHIA. *Rostrum* sub capitis apice insertum.

*Labium* nullum.

*Antennae* ante oculos insertae.

*membrana- 21—2. A. membranacea* depressa atra thoracis  
*cea.* abdominisque margine integro.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo omnino *A. corticalis* at tota atra et abdominis et thoracis margo integer. Antennarum ultimus articulus rufescit.

*histeroides. 24—5. A. obscura* thorace antice utrinque porrecto spinoso, scutelli marginibus albis, capite bifido.

Stoll, Cimic. tab. 25, fig. 197.

Habitat — — Dom. Weber.

Statura depressa et magnitudo *A. paradoxae*.

Caput nigrum, bifidum et sub laciniis rostrum insertum. Thorax obscurus, planus utrinque angulo antico valde porrecto, subspinoso. Scutellum nigrum utrinque linea marginali alba. Elytra nigra. Corpus obscureum.

*varia. 26—7. A. depressa* thorace denticulato, capite spinoso, corpore nigro rufo pallidoque variegato.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bose.

Corpus planum, depressum *A. Betulae*. Caput fuscum, utrinque bispinosum. Thorax

fuscus lineis quatuor dorsalibus, eleuatis, rufis: margine dilatato, denticulato, pallido. Elytra abdomine breuiora, angustiora, fusca, pallido reticulata. Scutellum fuscum lineis tribus rufis. Abdomen fusco ferrugineoque varium margine eleuato, carinato.

**CIMEX.** *Labium* elongatum, subulatum, annulatum.

*Antennae* filiformes, ante oculos inferrae.

3—4. *C. scutellaris oblongus* coeruleus nigro *ma-patricius*,  
culatus abdominis margine rufo.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Statura oblonga omnino *C. nobilis* at triplo minor. Caput coeruleum, nitidum linea dorsali punctoque utrinque baseos nigris. Thorax coeruleus linea dorsali punctisque utrinque quatuor nigris. Scutellum magnum, coeruleum punctis nouem 3. 3. 2. 1. nigris. Corpus flauescens fasciis marginalibus coeruleis abdominisque margine rubro. Pedes nigri femoribus rufis.

4—5. *C. scutellaris* thorace scutelloque pallide *2 puncta-*  
purpurascens: linea dorsali maculisque *tus*,  
utrinque tribus cyaneo nigris.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Bosc.

Paruus. Caput cyaneum lineis tribus basin haud attingentibus rufis. Thorax eleuatus, pallide rufescens linea dorsali maculisque tri-

bus oblongis r. a. coeruleo cyaneis. Scutellum concolor linea dorsali apicem haud attingente, cyanea. Puncta praeterea utrinque tria cyanea, aequalia. Margo parum obscure cyaneus. Subtus flavescens maculis marginalibus cyaneis. Pedes nigri femoribus rufis.

*Baro.*

7—8. *C. scutellaris pallens* thorace macula scutello tribus cyaneo nigris.

Habitat in China Mus. Dom. Lund.

Corpus magnum. Caput pallens antennis linea media margineque postico nigro cyaneis. Thorax pallens nitidus macula magna, ovata, marginem anticum attingente cyanea. Scutellum magnum, glabrum, pallidum, nitidum maculis tribus cyaneo nigris: intermedia cordata. Pectus cyaneum. Abdomen pallidum fasciis cyaneis. Pedes cyanei.

*Stigma.*

10—11. *C. scutellaris* scutello atro: basi linea dorsali margine maculisque duabus ocellaribus fulvis.

Habitat in Senegalia Dom. Dumerill.

Statura et magnitudo praecedentium. Caput nigrum lineolis duabus ante oculos fulvis. Thorax fulvus, nigro irroratus punctis quatuor marginis anticis exterioribus duplicatis maculisque octo marginis postici nigris. Scutellum magnum, atrum basi inaequaliter, linea media margineque fulvis. Praeterea in medio maculae duae ocellares, vel

potius annuli duo fulvi. Pectus nigrum.  
Abdomen fulvum margine nigro maculato.  
Pedes nigri.

27—28. *C. scutellaris* obscure rufus: atomis albidis, corpore flavescente. *Boscii*.

Habitat in Americae Insulis Mus. Dom. Bosc.

Affinis certe *C. paedemontano* at minor et distinctus. Caput fuscum. Thorax et scutellum obscure rufa atomis parvis, albidis. Corpus, antennae, pedes flavescentia.

30—1. *C. scutellaris* pallide testaceus abdominis *maroccamargine* utrinque prominulo fusco maculato. *mus.*

Habitat in Tanager Dom. Schousboe.

Statura et magnitudo praecedentium totus pallide testaceus abdominis margine utrinque late prominulo maculis obsoletis fuscis.

31—2. *C. scutellaris* thorace bispinoso, corpore *bispinosus* griseo.

Habitat in Marocco Dom. Lund.

Magnitudo et statura *C. albolineati* distinctus spinis utrinque thoracis duabus porrectis, acutis, altera ad marginem anteriorem paulo brevior, altera ad marginem posticum longior, acutior.

33—4. *C. scutellaris* thorace mutico ferrugineo *flavo lineatus* griseus flavo striatus.

Habitat — — Mus. Dom. Bosc.

Statura *C. albolineati* at omnino distinctus. Antennae obscurae. Caput flavescens, immaculatum. Thorax nullo modo spinosus, sub-

ferrugineus margine lineisque quinque distinctis, flavis. Scutellum angustius, ferrugineo griseum margine lineisque tribus flavis: intermediis valde abbreviatis. Elytra rufescentia margine postico nigro. Alae albae. Subtus flavus, nigro punctatus. Pedes flavi.

*coccineus.* 34—5. *C. scutellaris coccineus* thoracis margine antico coerulecente, antennis compressis. Habitat in Isle de France Dom. Daldorff.

Paruus. Antennae singulares, compressae, marginatae, triarticulatae, griseae. Corpus coccineum thoracis margine antico parum coerulecente. Pedes coccinei geniculis fuscis.

*dorsalis.* 42—3. *C. scutellaris nigricans*: linea dorsali scutellique lineis duabus albis.

Habitat in Mogador D. Schousboe Mus. Dom. Lund.

Minor *C. litura*. Caput canaliculatum, fuscum. Thorax fuscus linea dorsali alba. Scutellum fuscum linea dorsali alba. Praeterea utrinque lineola alba atrae innata. Corpus fuscum tibiis pallidis.

*coarctatus.* 44—5. *C. scutellaris obscurus* thorace utrinque bidentato, scutello in medio coarctato.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Corpus oblongum magnitudine *C. liturae* totum obtusum, minime nitidum capite thoracisque antico nigris. Thorax utrinque dentibus duobus parvis altero versus apicem,



altero versus basin. Scutellum utrinque in medio coarctatum.

- 44—5. *C. scutellaris* flavescens: punctis numero *cribrarius*.  
fissimis impressis fuscis, scutello postice emarginato.

Habitat in India orientali Mus. Dom. de Scheffer.

Corpus paruum, subrotundum. Thorax et scutellum flavescentia punctis numerosissimis, impressis, fuscis. Scutellum postice submarginatum. Corpus flavescens abdominis medio atro. Pedes flavi.

- 50—1. *C. thorace* spinoso: spinis nigris flavis, *Antilope*.  
elytris fuscis albolineatis.

Habitat in Americae Insulis Mus. Dom. Bosc.

Statura *C. Dama*. Caput, thorax, scutellum, corpus flava, immaculata. Thoracis cornua porrecta, cylindrica, obtusa, atra. Elytra fusca, albo lineata. Alae nigrae.

- 60—1. *C. thorace* ferrato spinosoque: spinis ele-*reflexus*.  
vatis reflexis obscurus antennis pedibusque rufis.

Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.

Medius. Caput nigrum margine tenuissime rufo apiceque emarginato: Antennae rufae articulo ultimo nigro, basi pallido. Thorax niger maculis duabus dorsalibus rufis margine ferrato: dente postico longiori elevato, reflexo. Scutellum elytraque grisea punctis numerosissimis nigris, impressis. Pedes nigri.

- clauatus.* 66—7. *C. thorace spinoso cinereus nigro varius thoracis spina clauata atra: punctis duobus albis.*  
 Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.  
 Paulo minor *C. dentato*. Caput porrectum utrinque unidentatum. Thorax haud ferratus at utrinque spina parva armatus clauata, atra: apice punctis duobus albis. Scutellum apice cinereum. Alae fusco maculatae. Abdomen flavescens margine nigro flavo maculato.
- Heros.* 63—4. *C. thorace acute spinoso: spinis nigris flavescens nigro irroratus, antennis pedibusque flavescentibus.*  
 Habitat Cajennae.  
 Affinis videtur *C. pugnax*. Caput, thorax, scutellum, elytra concolora, flavescentia atomis innumeris nigris irrorata. Thoracis spinae nigrae.
- hastator.* 92—3. *C. thorace acute spinoso niger antennis abdominis margine pedibusque rufis.*  
 Habitat Cajennae Dom. Richard.  
 Statura praecedentium. Caput nigrum antice spina acuta, valida. Antennae rufae. Thorax punctatus, niger spina valida, porrecta, acutissima. Scutellum, elytra, alae nigra, immaculata. Abdomen nigrum margine inferiori rufo: ano bidentato. Pedes rufi.
- marginatus.* 98—99. *C. thoracis margine dilatato rotundato antice albo nigropunctato.*  
 Habitat Tanager Dom, Schousboe.

Corpus paruum, depressum. Caput obtusum, rotundatum, obscurum. Thorax obscurus, vix spinosus at margo dilatatus, rotundatus antice albus punctis minutis, atris. Scutellum obscurum, apice album. Elytra obscura. Alae cinereae atomis fuscis. Pectus albo nigroque varium. Abdomen albidum macula magna bascos nigra margineque supra albo nigroque maculato. Pedes pallidi, nigro punctati.

104—5. *C. ruber* thorace scutello elytrisque *ma-perspicuus*.  
culis duabus atris.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Caput nigrum lineis duabus rufis. Thorax rufus maculis duabus parvis, anticis duabusque maioribus dorsalibus, atris. Scutellum magnum, rufum maculis duabus magnis bascos atris: Elytra rufa maculis duabus versus apicem atris: posteriore minore. Alae atra margine apicis albido. Corpus rufum pectore abdominisque margine atro punctatis. Pedes nigri femoribus rufis apice nigris annulo rufo.

114—5. *C. viridis* abdominis margine albo atro *spirans*, punctato.

Habitat in Americae Insulis Dom. v. Rohr.

Statura et summa affinitas *C. smaragduli* at distinctus videtur. Antennae virides articulo penultimo apice brunneo, ultimo basi viridi, tunc albo, demum brunneo. Caput,

thorax, scutellum, elytra, alae, pedes viridia, immaculata. Abdominis margo tenuissime albidus punctis minutis, atris.

*flauescens.* 116—17. *C. flauescens* antennis rufis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura parua praecedentium. Caput, thorax, elytra, corpus, pedes pallide flauescentia, immaculata. Antennae rufae articulo primo basi pallido. Abdomen subtus linea punctorum nigrorum.

*maeans.* 136—7. *C. ater* antennarum articulo ultimo, thoracis margine scutelli puncto baseos apiceque rufis.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura et magnitudo *C. geniculati* at distinctus.

Caput nigrum antennarum ultimo articulo rufo. Thorax niger linea dorsali obsoleta margineque rufis. Scutellum nigrum puncto medio baseos calloso apiceque rufis. Elytra nigra, immaculata. Abdomen nigrum margine baseos rufo. Pedes nigri.

*marmoreus.* 140—1. *C. griseus* thorace scutelloque punctis duobus minutis flavis.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Magnitudo et statura *C. grisei*. Corpus supra griseum thorace antice punctis duobus minutis flavis, postice fusco fere lineatus. Scutellum punctis duobus minutis, distinctis baseos. Subtus flauescens linea media marginibusque fuscis et in singulo segmento abdo-

minis utrinque punctum partium, atrum.

Pedes flavescentes, fusco punctati.

- 152—3. *C. supra rufus thorace scutelloque punctatus.*  
 Etis duobus alisque nigris.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Caput rufum antennis nigris. Thorax rufus punctis duobus anticis nigris, flavo cinctis. Scutellum rufum punctis duobus maioribus baseos nigris. Elytra rufa. Alae nigrae, immacolatae. Abdomen flavescens fasciis cyaneis. Pedes rufi tibiis cyaneis.

- 156—7. *C. glaucus elytris alisque fuscis.* *glaucescens.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Medius. Antennae desunt. Caput, thorax, scutellum glauca, immaculata. Elytra fusca margine glauco. Alae fuscae. Corpus flavesces strigis abdominis abbreviatis, nigris. Pedes flavescentes.

- 162—3. *C. niger thorace striga scutello punctis carnifex.*  
 duobus abdomine margine sanguineis.

Habitat in America Dom. Hybner.

Statura et magnitudo omnino *C. oleracei*. Caput nigrum, immaculatum. Thorax niger margine, striga media, quae in medio linea cum margine antico iungitur sanguineis. Scutellum nigrum punctis duobus ante apicem sanguineis. Elytra nigra margine baseos sanguineo. Corpus atrum abdominis margine sanguineo.

- 162—3. *C. niger thorace striga abbreviata, scutello utrinque linea marginali albis.*

Habitat in Carolina Dom. Bose.

Paruus. Corpus nigrum antennarum articulo primo et tertii basi albis. Thorax punctatus, niger, aeneo parum nitens striga parua media abbreviata alba. Scutellum punctatum, nigrum utrinque linea basi ante marginem, apice marginali alba. Elytra punctata, nigra margine bascos albo. Abdomen nigrum margine albo. Pedes albi.

*brevipennis*. 174—5. C. ater elytris abbreviatis, alis albis.

Habitat in India orientali Dom. de Schestedt.

Praecedentibus triplo minor et omnino distinctus. Corpus totum atrum alis solis albis. Elytra brevissima.

*tricolor* 176—7. C. ater capite flavo, elytris virescentibus.

Habitat in India orientali Dom. de Schestedt.

Corpus paruum, atrum. Antennae quadriarticulatae, nigrae articulo ultimo flavo. Caput transuersum, flavum, nitidum oculis magnis, oblongis, prominulis, brunneis. Thorax et scutellum nigra, immaculata. Elytra virescentia margine postico nigro. Alae hyalinae. Abdomen atrum margine tenuissime flavo. Pedes flavi.

**COREUS.** Os rostro inflexo, capitis apici prominenti inserto.

*Labium* elongatum, subulatum, incumbens.

*Antennae* capitis apici insertae.

23. **C.** thorace inermi rufus elytris pallefcentibus *purgator*, apice rufis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura parva **C.** grauidator. Rostrum pallidum, basi rufum, apice fuscum. Antennae pallidae. Caput et thorax obscure rufa, inermia. Elytra pallefcentia, apice rufa. Alae fuscae atomis pallidis. Pedes pallidi femoribus posticis elongatis, fuscis annulo albo.

**LYGAEUS.** Os rostro inflexo sub capitis apice inserto.

*Labium* elongatum, fetaecum, acutum.

*Antennae* ante oculos insertae.

12—13. **L.** thorace ferrato griseus elytris litura *Typhaeus* media atra, femoribus posticis clauatis dentatis.

Habitat in Carolina Dom. Bose,

Statura et magnitudo **L.** clauipes. Antennae nigrae articulo ultimo ovato, crassiori. Caput griseum spinis quatuor parvis, elevatis,

acutis, breuibus. Thorax ferratus, postice spinosus, griseus, postice obscurior. Elytra grisea, in medio litura atra. Alae atrae. Pedes obscuri tibiis annulo albo. Femora postica valde elongata, clauata dentibus duplici serie ferrata, obscura macula magna dorsali albida.

*laticornis*, 14 — 15. L. thorace spinoso obscurus elytris flauo lineatis, antenarum articulo ultimo compresso basi albo.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Astiois videtur L. compressicorni. Caput fuscum. Antennae articulo primo et secundo fuscis, tertio compresso apice dilatato, rotundato, basi albo, apice nigro, quarto elongato, cylindrico, incuruo, basi albo. Thorax spinosus, fuscus, immaculatus. Elytra fusca, flauo lineata. Alae nigrae. Corpus obscure ferrugineum. Pedes inermes tibiis posticis compressis.

*dilatatus*, 20 — 1. L. thorace subspinoso glaucescente: margine atro tibiis posticis membranaceis.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Antennae nigrae, albo annulatae. Caput glaucum. Thorax glaucus margine tenuissime atro. Elytra glauca, fusco striata. Alae obscurae. Corpus flauescens. Pedes flauis femoribus posticis apice dentatis fuscis tibiisque dilatato membranaceis fascia lata fusca.

*arcuatus*, 21 — 2. L. thorace subspinoso oblongus niger thorace fascia rubra femoribus basi albis: posticis dentatis.



Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura omnino *L. australis*. Antennae articulo primo nigro secundo tertioque rufis, apice nigris, quarto rufo. Caput nigrum. Thorax subspinofus, niger fascia media arcuata, rubra. Scutellum et elytra nigra, immaculata, obscura. Subtus fuscus. Pedes nigri femoribus omnibus basi albis, posticis elongatis dentatis, tibiis incurvis apice unispinosis,

26—7. *L. thorace spinoso niger elytris flavis nigro notatis, abdomine rufo.* *haemorrhoidalis.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura praecedentium. Antennae nigrae articulis primo excepto annulo albo. Caput thorax, scutellum nigra, immaculata. Elytra flavescentia in medio lituris aliquot nigris. Alae atrae. Abdomen sanguineum. Pedes nigri femoribus posticis haud incrassatis at subtilissime dentatis.

29—30. *L. corpore fusco flavoque vario, femoribus posticis elongatis dentatis.* *pedestris.*

*Gerris pedestris* Ent. syst. 4. 190. 11.

Habitat in India orientali Dr. Koenig.

Praecedentes omnes forte proprii generis.

30—1. *L. thorace acute bispinoso oblongus fuscus femoribus posticis elongatis dentatis.* *fuscus.*

Habitat in India orientali Dom. Hybner.

Statura et summa affinitas *L. ferripedis*. Corpus supra fuscum, immaculatum abdomine subtus pallecente macula media atra. Tho-

rax spina postica acuta et pone hanc altera minor.

*Batatas.* 31—2. L. thorace subspinoso obscurus niger abdominis margine elevato carinato.

Habitat Surinami Dom. Bose. Cajennae Batatas destruens Dom. Richard.

Paullo maior L. cruciger. Caput paruum, fuscum antennis pilosis. Thorax niger margine postico prominente, ferrugineo, vix spinoso. Elytra et alae fusca. Corpus fuscum. Pedes simplices.

*melanocephalus.* 75—6. L. thorace rufo: fascia nigra, elytris rufis apice nigris:

Habitat in Gallia Dom. Bose.

Paruus. Caput cum antennis nigrum, immaculatum. Thorax rufus fascia media postice versus marginem dilatata. Scutellum nigrum, immaculatum. Elytra basi rufa, apice nigra, interdum tamen fascia tantum elytrorum nigra et apex rufus. Corpus rufum, nigro maculatum. Pedes rufo fulcoque varii.

*oliuaceus.* 87—88. L. oliuaceus capitis thoracisque antico sanguineis: margine ipso albo.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Nimis affinis L. augur. Antennae nigrae interdum annulo albo. Caput sanguineum. Thorax lobo antico sanguineo: margine albo. Margo lateralis sanguineus, elevatus. Scutellum et elytra oliuacea, immaculata. Alae atrae. Corpus sanguineo flauoque varium pectore albo maculato. Pedes sanguinei.

93—4. *L. fuscus* tibiis testaceis, femoribus post-*tibialis*,  
cis ferratis.

Habitat in India Dom. Hybner.

Statura *L. calcarati* at paullo minor. Antennae obscure piecae articulo ultimo nigro.

Corpus supra fuscum, subtus nigrum tibiis folis testaceis. Femora postica acute dentata.

96—7. *L. ater* antennarum ultimo articulo cinere-*aterrimus*,  
reo pubescente.

Habitat in Gallia Dom. Bosc.

Paullo maior *L. Pini* at omnino distinctus totus ater, nitidus. Antennae nullo modo serariae at ultimo articulo cinereo pubescente.

110—11. *L. thorace cinereo*: macula antica atra, *quadratus*,  
elytris cinereis: macula postica fusca.

Habitat Parisiis Dom. Bosc.

Statura parva praecedentium. Antennae ferrugineae articulo ultimo fusco. Caput nigrum. Thorax cinereus macula magna, quadrata, antica, atra margine tamen ipso tenuissime cinereo. Scutellum atrum. Elytra striata, grisea macula ante apicem nigra. Alae albae, nigro striatae. Corpus atrum, Pedes rufi femoribus atris.

124—5. *L. ferrugineus* thorace elytrisque flavis *lineatus*,  
nigro lineatis.

Habitat in America boreali Dom. Hirshell.

Statura omnino *L. campestris*. Caput nigrum antennis ferrugineis. Thorax antice ferrugineus, immaculatus, postice flavus lineis

quatuor atris: intermediis latioribus. Scutellum flavescens, basi nigrum. Elytra flavescentia vitris duabus atris: exteriori tenuiore, abbreviata, ante apicem puncto distincto terminata. Alae nigrae. Corpus ferrugineum.

- roseus.* 143—4. L. flavescens thorace elytrisque roseis.  
*Cinex roseus* Mant. Inf. 2. 204. 144.  
 Habitat Hamburgi Dr. Schulz.
- neglectus.* 150—1. L. niger elytris rufis: futura maculaque marginali nigris.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.  
 Statura et magnitudo omnino L. atri. Antennae capillares videntur. Caput nigrum. Thorax niger margine postico rufo. Elytra rufa futura maculaque parva marginali nigris. Corpus et pedes nigra immaculata.
- gramineus.* 153—4. L. viridis capite thorace elytrorumque fascia apiceque nigris.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.  
 Paruus. Antennae mihi desunt. Caput nigrum lateribus parum virescentibus. Thorax niger macula marginali apicis viridi. Scutellum viride macula baseos nigra. Elytra viridia fascia media punctoque apicis nigris. Corpus viride.

GERRIS. Os rostro breui subulato.

*Labium* breuissimum, rotundatum.

*Antennae* filiformes, ante oculos infertae.

1—2. *G. capite thoraceque supra testaceis nigro-fluuiorum.*  
lineatis, abdomine supra fuluo.

Habitat in Indiae aquis Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo omnino *G. lacustris*. Rostrum inflexum, testaceum articulo ultimo nigro. *Antennae* nigrae. Caput testaceum lineis tribus antice coeuntibus, nigris: intermedia antice incrassata. Thorax testaceus linea marginali postice coeuntibus nigris, margine tamen ipso tenuissime testaceo. Praeterea lineae tres dorsales, nigrae lateribus abbreviatis. *Elytra* alaeque fusca. Abdomen supra fuluum, immaculatum, subtus pallide flauescens utrinque linea laterali, abbreviata, fusca. *Pedes* antici breues, postici quatuor elongati, nigri.

5—6. *G. niger* thoracis *elytrorumque* margine *fossularum*, albo, *elytris* abbreviatis.

*Cimex fossularum* Ross, Fn. Etr. 1354.

Habitat in Italia Mus. Dom. Bosc.

Statura et magnitudo *G. lacustris*. *Antennae* quadriarticulatae, nigrae annulis duobus albis, articulo ultimo ferrugineo. Thorax niger margine albo. Corpus griseum. *Pedes* grisei femoribus nigris.

---



---

**REDUVIUS. Os rostro arcuato.**

*Antennae supra oculos  
infertae.*

*hirticornis.* 11—12. R. rufus elytris alis abdomine pedibusque atris, antennis hirtis nigris.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura et magnitudo R. nigripennis. Antennae hirtae, nigrae. Caput rufum oculis globosis nigris. Thorax rufus, immaculatus cruce media impressa. Scutellum rufum, apice emarginatum. Elytra atra, apice parum rufa. Alae atrae. Abdomen atrum ano rufo. Pedes nigri.

*flavicans.* 12—13. R. flavescens capite bituberculato alisque atris.

Habitat Cajennae Dom. Cuvier.

Statura et magnitudo praecedentium. Antennae desunt. Caput atrum pone oculos tuberculis duobus elevatis, obtusis, nitidis. Thorax et elytra flavescentia, immaculata. Alae atrae. Corpus flavescens utrinque linea laterali alba.

*anotatus.* 34—5. R. niger thorace postice elytrisque testaceis, alis maculis duabus albis.

Habitat in India orientali Mus. Dom. de Schestedt.

Statura praecedentis. Caput cum antennis nigrum. Thorax antice niger, postice testaceus. Scutellum testaceum. Elytra testacea. Alae atrae maculis duabus una pone alterum

magnis, albis. Corpus nigrum abdominis margine albo maculato.

36—7. *R. niger* elytris abdominis margine pedi-*carinatus*.  
busque rufis.

Habitat in Carolina Mus. Dom. Bosc.

Magnus. Caput atrum rostro antennisque fuscis. Thorax ater, nitidus lineis quinque dorsalibus impressis: intermedia abbreviata. Scutellum nigrum. Elytra rufa. Alae nigrae. Abdomen nigrum margine eleuato, carinato, rufo. Pedes rufi femoribus anticis valde incrassatis.

48—9. *R. cinereus* thorace quadrispinoso, abdo-*cinereus*.  
minis margine spinis ciliato.

Habitat in Carolina Dom. Bosc.

Paruus. Caput spinis aliquot eleuatis, acutis cinereum. Thorax cinereus spinis quatuor acutis in strigam dispositis. Elytra cinerea, immaculata. Alae hyalinae. Abdomen cinereum, margine spinis ciliatum. Pedes tenues, inermes, cinerei.

53—4. *R. elongatus* sanguineus capite spinis dua-*coronatus*.  
bus thorace quatuor abdominis margine plurimis.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Corpus tenue, elongatum. Antennae corpore longiores, triarticulatae, filiformes, nigrae capitis apice insertae. Caput sanguineum rostro arcuato spinisque duabus eleuatis, validis pone antennas. Thorax sanguineus

---

spinis quatuor eleuatis, acutis. Elytra sanguinea. Abdomen sanguineum margine eleuato, spinis ciliato. Pedes elongati, nigri.

*apterus.* 54—5. R. apterus corpore griseo, abdomine nigro: margine rufo maculato.

Habitat in Gallia Dom. Bose.

In Gallia boreali semper apterus elytris abbreviatis longitudine dimidii abdominis alisque nullis. In Gallia meridionali et alatus inuenitur elytris griseis alisque albis.

**COCCUS.** *Rostrum* vagina setaque pectoralibus.

*Antennae* filiformes.

*Persicae.* 4—5. C. Amygdali Persicae.

Habitat in Amygdalo Persica Kiliae.

Corpus medium, subrotundum, inaequale, brunneum.

*ceriferus.* 26—7. C. corpore cera alba tecto.

Andersson Monogr. Madras. 1791.

Pearson Act. Angl. 1794. Nr. 21.

Habitat in Celastro cerifero Indiae orientalis ceram albam praebens.

Corpus omnino huius generis crusta densa inaequali e cera albida tectum.

---



---

CLASSIS XIII.

ANTLIATA.

OS HAUSTELLO INARTICULATO.

---

HIRTEA.

Os proboscide, haustello palpisque.

*Proboscis* brevis, exserta, cylindrica, obtusa, dorso canaliculata, setam recipiens, apice bilabiata.

*Haustellum* breue, nudum absque vagina.

*Seta* unica, tenuis longitudine proboscidis, rigida, setacea, acuta, in canalem proboscidis recondenda.

*Palpi* duo exserti, incurui, filiformes, quinquearticulati: articulis subaequalibus proboscide utrinque ad basin inserti.

*Antennae* breues, crassae: articulo primo longiori, reliquis breuissimis, perfoliatis supra basin proboscidis inserti.

SICUS.

Os haustello, proboscide palpisque.

*Proboscis* exserta: stipite cylindrico, subcorneo, recuruo dorso canaliculato, capitulo ouato, bilabiato: labiis aequalibus.

*Hauftellum* proboscide dimidio breuior.

*Seta* unica, rigida, valida, acuta, medio dorsali proboscidis inserta, in canalem recondenda.

*Vagina* fere longitudine setae, rigida, obtusa, supra fetam inserta.

*Palpi* duo elongati longitudine proboscidis, exserti, filiformes; pilosi, triarticulati: articulis subaequalibus.

*Antennae* breues, approximatae: articulo primo crassiori cylindrico, ultimo subulato.

### MULIO.

Os proboscide, hauftello palpisque.

*Proboscis* exserta stipite cylindrico, corneo, in medio geniculato, dorso canaliculato, capitulo ouato, bilabiato.

*Hauftellum* longitudine proboscidis in geniculo proboscidis inserta in canalem eiusdem recondenda.

*Seta* unica subulata, acuta.

*Vagina* uniuersalis, cornea, obtusa, fetam inuoluens.

*Palpi* duo breuissimi, tenues, filiformes, ad basin hauftelli inserti.

*Antennae* porrectae, cylindricae, vix extrorsum crassiores, triarticulatae: articulo ultimo basi superiori fetigero.

### THEREVA.

Os proboscide, hauftello palpisque.

*Proboscis* intra aperturam orbiculatam oris retracta, cornea, in medio geniculata, rigi-

da apice bilabiata: labiis aequalibus, ovatis, dorso canaliculata: marginibus elevatis, carinatis.

*Hauftellum* proboscide brevius, intra canalem latens.

*Seta* unica, rigida, acuta absque vagina?

*Palpi* duo proboscide multo breviores, pilosi, filiformes insidentes margine squamoso, membranaceo proboscidis ante geniculum.

*Antennae* breves, incumbentes, compressae, extrorsum crassiores, setariae.

## SARGUS.

Os proboscide atque hauftello absque palpis.

*Proboscis* brevissima, vix exserta: stipite cylindrico, corneo dorso canaliculato ad receptionem hauftelli, capitulo bilabiato: labiis aequalibus, rotundatis, conniuentibus.

*Hauftellum* breve vix longitudine proboscidis absque vagina.

*Seta* unica, brevis, cornea, subulata.

*Palpi* omnino nulli.

*Antennae* breves, approximatae, triarticulatae: articulo ultimo maiori, compresso, setigero, inter oculos insertae.

**CEROPLATUS.** *Palpi* duo breues, ouati, biarticulati.  
*Antennae* oblongae, compressae.

*tipuloides.* 1. *Ceroplatus.*

*Keroplatus tipuloides* Bosc. Aët. Hist. Nat. Paris.  
 1. 42. tab. 7. fig. 3.

Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.

Statura omnino *Tipulae*. Caput paruum, rotundatum, flavescens sub antennis corniculis duobus elevatis flavis. *Antennae* breues, crassiores, fuscae. Thorax gibbus, flavescens, fusco lineatus. Abdomen compressum, flavum segmentorum marginibus nigris. *Alae* albae puncto medio submarginali maculaque fuscis.

Generis character naturalis adhuc desideratur.

**TIPULA.** *Haustellum* absque vagina.  
*Palpi* duo porrecti, quinque articulati ad basin proboscidis.  
*Antennae* filiformes.

*picta.*

30—1. *T.* alis cinereis: annulis maculisque nigris.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura et magnitudo *T. ocellaris* at distincta et alia. *Antennae* nigrae articulo tertio ferrugineo. Thorax cinereus. Abdomen flavescens lineis tribus fuscis. *Alae* cinerae

annulis in medio maculisque marginalibus, fuscis. Pedes testacei femoribus annulis duobus fuscis.

HIRTEA. *Palpi* duo incurui, quinque-articulati.

*Antennae* breues, crassae, perfoliatae.

1. *H. nigra* glabra alis margine nigricantibus, ab- *breuicornis.*  
domine fusco.

*Tipula breuicornis* Ent. syst. 4. 248. 71. Linn.

syst. Nat. 2. 976. 42. Fn. Su. 1766.

*Tipula flauicanda* Degeer Inf. 6. 529. 35.

Habitat in Europae umbrosis, hortis.

2. *H. alis* hyalinis; margine exteriori nigro. *hortulana.*

*Tipula hortulana* Ent. syst. 4. 248. 72. Linn.

syst. Nat. 2. 977. 46.

Geoff. Inf. 2. 571. 3.

Reaum. Inf. 5. tab. 7. fig. 7—10.

*Tipula Marci* Linn. syst. Nat. 2. 976. 38. Fn.

Su. 1765.

---

Hirteae corpus oblongum, villosum, immarginatum, tardum, capite paruo, exserto, plano, ore porrecto, cylindrico, oculis magnis, glebeis, lateralibus, prominulis, antennis capite breuioribus, supra os inferis, stematibus tribus paruis, eleuatis, fere connatis, thorace gibbo, scutello vix distincto, abdomine ouato, depresso, plano, alis duobus magnis, basi excisis, incumbentibus, halteribus breuibus, pedibus mediocribus, femoribus anticis compressis, validis, tibiis breuibus, spina utrinque terminatis: exteriore maiore, tarsis elongatis, quinquearticulatis.

Geoff. Inf. 2. 570. 2.

Degeer Inf. 6. 428. 33.

Schaeff. Icon. tab. 15. fig. 1. 2.

Habitat in Asparagi et Pomonae floribus.

- Johannis.* 3. H. nigra glabra alis albis: puncto nigro, pedibus nigris.

*Tipula Johannis* Ent. syst. 4. 249. 73. Linn. syst.

Nat. 2. 976. 41.

Degeer Inf. 6. 425. 32. tab. 27. fig. 12. 13.

Habitat in Europae umbrosis.

- Pomonae.* 4. H. glabra nigra alis lacteis: puncto nigro, femoribus ferrugineis.

*Tipula Pomonae* Ent. syst. 4. 249. 74.

Habitat in Angliae Pomona.

- Pyri.* 5. H. glabra atra alis hyalinis: puncto marginali nigro, pedibus testaceis.

*Tipula Pyri* Ent. syst. 4. 249. 75.

Habitat in Holsatiae Pomona.

- rusticollis.* 6. H. glabra atra thorace rufo.

*Tipula rusticollis* Ent. syst. 4. 249. 76.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

- Chrysanthei.* 7. H. glabra atra abdomine basi rufo.

*Tipula Chrysanthei* Ent. syst. 4. 249. 77.

Habitat in Chrysanthemis coronario Hispaniae  
D. Vahl.

- Thomae.* 8. H. glabra atra alis nigris, abdominis lateribus linea crocea.

*Tipula Thomae* Ent. syst. 4. 250. 78. Linn. syst.

Nat. 2. 976. 39.

Schaeff. Icon. tab. 209. fig. 6. 7.

Habitat Upsaliae.

9. *H. oblonga hirta atra alis costa nigricante. febrilis.*  
*Tipula febrilis* Ent. syst. 4. 250. 79. Linn. syst.  
 Nat. 2. 976. 44. Fn. Su. 1768.  
 Geoff. Inf. 2. 576. 2.  
 Goed. Inf. 1. tab. 6.  
 Petiv. Gaz. tab. 14. fig. 4.  
 Habitat in Europae locis suffocatis.
10. *H. hirta atra pedibus ferrugineis: posticis brunripes.*  
 elongatis.  
*Tipula brunripes* Ent. syst. 4. 250. 80.  
 Habitat in Americae Insulis Mus. Dom. Banks.
11. *H. abdomine cylindrico atro, alis fusco hya-forcipata.*  
 linis, ano appendiculato.  
*Tipula forcipata* Ent. syst. 4. 250. 81.  
 Habitat in Anglia.
12. *H. glabra atra nitida alis albis. albipennis.*  
*Tipula albipennis* Ent. syst. 4. 250. 82.  
 Habitat Hafniae Dom. Lund.
13. *H. cinerea alis albis: margine villosq. juniperina.*  
*Tipula juniperina* Ent. syst. 4. 251. 83. Linn. syst.  
 Nat. 2. 977. 51. Fn. Su. 1774.  
 Degeer Inf. 6. 404. 26. tab. 25. fig. 7—13.  
 Habitat in Iuniperi Triglochide, quam caussat.

ANTHRAX. Os haustello absque proboscide.

*Palpi* duo pilosi basi haustelli inferti.

*Antennae* distantes: articulo ultimo setaceo.

*Titanus.* 18—19. A. hirta fusca abdomine atro: segmentorum marginibus flavis, alis nebulosis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura A. Sabaei ac distincta et alia. Caput et thorax hirta, fusca, immaculata. Abdomen atrum segmentorum marginibus flavis. Alae nebulosae. Pedes flavescentes.

*Syphax.* 10—11. A. hirta fusca alis hyalinis basi fuscis.

Habitat in Barbaria Dom. de Rehbinder.

Statura omnino praecedentium tota hirta fusca, immaculata. Alae hyalinae basi fuscae.

SICUS. Haustellum seta unica vaginaque uniuersalium.

*Palpi* elongati, filiformes.

*Antennae* approximatae, breues.

*testacea.* 1. S. testaceus abdominis primo segmento fusco.

*Stratiomys testaceus* Ent. syst. 4. 262. 1.

Habitat in America meridionali,

---

Sicus corpus mediocre, ovatum, planum villosum, immarginatum, agile, capite paruo, exserto, rotundato, oculis magnis, oblongis, fere connatis, antennis breuibus, approximatis, stigmatibus tribus approximatis, verticalibus, thorace ovato, scutello distincto.



2. *S. testaceus* abdomine utrinque maculis duabus *fer-ruginea*.  
bus flavis.

*Stratiomys macroleon* Panz. Fn. Germ. 9. tab. 20.

*Tabanus bidentatus* Ent. syst. 4. 372. 40.

Habitat in Austria.

3. *S. fuscus* abdomine testaceo. *bicolor.*

*Tabanus bispinosus* Ent. syst. 4. 372. 41.

Habitat in Germania.

4. *S. fuscus* abdomine atro; segmento secundo *errans*.  
tertioque lateribus albis.

*Stratiomys errans* Ent. syst. 4. 263. 2.

Habitat — — —

5. *S. fuscus* aureo pubescens abdomine atro: maculis duabus lateralibus apiceque flavis. *Crucis.*

*Stratiomys Crucis* Ent. syst. 4. 264. 7.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom.  
Lund.

STRATIOMYS. *Hauftellum* seta unica  
absque vagina.

*Palpi* breues, capitati.

*Antennae* acuminatae,  
basi connatae.

- 9—10. St. scutello bidentato nigra pedibus flavis. *flauipes.*

Habitat Algiriae Dom. de Rehbinder.

Statura et magnitudo omnino St. *microleon* at  
tota nigra immaculata pedibus folis flavis.

---

Sto, rotundato, bispinoso, alis duabus incumbentibus, abdomine longioribus halteribus capitulo oblongo squamaque brevior, rotundata, pedibus mediocribus, curforiis.

- villosa.* 26. St. scutello mutico nigra cinereo hirta abdominis segmentis margine laterali albo.  
*Nemotelus villosus* Ent. syst. 4. 270. 2.  
 Habitat in Hungaria Mus. Dom. Bosc.

RHAGIO. *Haustellum* fetis tribus absque vagina.

*Palpi* duo basi fetarum exteriorum insertae.

*Antennae* filiformes.

- Ibis.* 3—4. R. niger thorace sublineato, abdomine ferrugineo trifariam nigro punctato: apice nigro alis variegatis.

Habitat in Italia Dom. Allioni.

Praecedentibus minor. Thorax niger lineis quatuor albidis lineatus. Abdomen ferrugineum linea dorsali punctorum nigrorum et alia utrinque laterali. Anus niger. Alae fusco alboque variae. Pedes nigri.

- nebulosus.* 10—11. R. niger abdomine flavescente nigro fasciato, alis nebulosis: macula costali atra.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura et magnitudo omnino R. bicolor. Caput et thorax nigra, immaculata. Scutellum testaceum. Abdomen conicum, flavescens annulis plurimis nigris. Alae nebulosae macula magna costali, nigra. Pedes flavescentes.

**CERIA.** *Haustellum* uniualue: seta unica.

*Palpi* duo capitati, proboscidis medio inferti.

*Antennae* clauato acuminatae, petiolo communi medio frontis infertae.

1. C. abdomine atro: segmentis tribus margine *clauicornis*.  
flauis.

*Cina clauicornis* Ent. syst. 4. 277. 1.

Habitat in Barbaria.

2. C. antennis setariis abdomine rufo: ano nigro. *abdominalis*.  
*Syrphus abdominalis* Ent. syst. 4. 307. 108. *lis*.

Habitat in Gallia Dom. Bosc.

Differt a praecedente antennis seta niuea.

**MULIO.** *Haustellum* seta unica vagina uniualui.

*Palpi* breuissimi, filiformes.

*Antennae* porrectae, cylindricae, setigerae.

1. M. niger thoracis lateribus punctis abdomine *bicinctus*.  
que cingulis duobus flauis.

*Syrphus bicinctus* Ent. syst. 4. 293. 54.

Mulio corpus medium, ouatum, immarginatum, agile, capite magno, exserto, transuerso, oculis magnis, lateralibus, oblongis, superne conuenientibus, antennis porrectis, cylindricis, capite longioribus tuberculo capitis inter oculos infertis, thorace ouato, gibbo, scutello magno, rotundato, inermi, abdomine ouato,

*Musca bicincta* Linn. syst. Nat. 2. 985. 38. Fn.  
Su. 1805.

Degeer Inf. 6. 126. tab. 7. fig. 16.

Habitat in Europae floribus.

*arcuatus.* 2. *M. niger* thorace maculis lateralibus, abdomine cingulis quatuor arcuatis flavis.

*Syrphus arcuatus* Ent. syst. 4. 293. 55.

*Musca arcuata* Linn. syst. Nat. 2. 985. 39. Fn.  
Su. 1806.

Geoff. Inf. 2. 506. 28.

Degeer Inf. 6. 125. 14. tab. 7. fig. 14.

Panz. Fn. Germ. 2. tab. 10.

Habitat in Europae floribus.

*mutabilis.* 3. *M. tomentosus* thorace immaculato, abdomine nigro griseoque mutabili.

*Syrphus mutabilis* Ent. syst. 4. 294. 59.

*Musca mutabilis* Linn. syst. Nat. 2. 985. 40. Fn.  
Su. 1807.

Habitat in Europae pratis.

*devius.* 4. *M. tomentosus* thorace coerulescente, abdomine obscure violaceo.

*Syrphus devius* Ent. syst. 4. 294. 60.

*Musca devia* Linn. syst. Nat. 2. 985. 41. Fn. Su.  
1808.

Habitat in Europa, Anglia.

*dentipes.* 5. *M. nudus* thorace quadrilineato, abdomine clavato, femoribus posticis incrassatis dentatis.

---

supra conuexo, subtus concauo, ano obtuso, alis magnis, ouatis, abdomine longioribus, basi excisis, halteribus elongatis: capitulo ouato, nudis, pedibus cutiforiis.

*Syrphus dentipes* Ent. syst. 4. 297. 68.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

6. *M. nudus niger* thorace lineis lateralibus, abdomine fasciis tribus flavis.

*Syrphus conopseus* Ent. syst. 4. 297. 69.

*Musca conopsoidea* Linn. syst. Nat. 2. 982. 21.

Fn. Su. 1790.

Reaum. Inf. 4. tab. 33. fig. 12. 13.

Habitat in Europae floribus.

7. *M. niger* fronte thoracis postico pedibusque *ichneumoneus* ferrugineis.

*Syrphus ichneumoneus* Ent. syst. 4. 297. 70.

*Musca ichneumonea* Linn. syst. Nat. 2. 986. 42.

Fn. Su. 1809.

Habitat in Europae floribus.

8. *M. ater* abdomine rufo basi apiceque atro. *bicolor*.

*Syrphus bicolor* Ent. syst. 4. 297. 71.

Habitat in Barbariae floribus Dom. Desfontaines.

9. *M. niger* pedibus rufis.

*sphageus*.

*Syrphus sphageus* Ent. syst. 4. 298. 72.

Habitat in Angliae floribus Dom. Banks.

**THEREVA.** *Proboscis* cornea: lateribus reflexis, carinatis. *Palpi* duo filiformes, pilosissimi, squamae membranacea ante geniculum proboscidis insertae. *Antennae* breues compressae, incumbentes.

*subcoleoptrata.* 1. T. thorace nigro, alis cinereis: vittis duabus fuscis repandis.

*Syrphus subcoleoptratus* Ent. syst. 4. 283. 21.

*Conops subcoleoptratus* Linn. syst. Nat. 2: 1006. 13.

Habitat in Europa boreali Dom. Bosc.

*hemiptera.* 2. T. thoracis limbo ferrugineo, alis cinereis fusco flavescentique variis.

*Syrphus hemipterus* Ent. syst. 4. 284. 22.

Schaeff. Icon. tab. 71. fig. 6.

Habitat in Angliae nemoribus.

*crassipennis.* 3. T. thorace flavescente, alis disco albido: puncto distincto nigro.

*Syrphus crassipennis* Ent. syst. 4. 284. 23.

Habitat Parisiis Dom. Bosc.

---

Therevae corpus medium, crassum, obesum; ovatum, immarginatum, tardum, capite magno, exserto, transverso, oculis magnis, oblongis verticalibus, stemmatibus minutis, vix conspicuis, antennis parum distantibus medio frontis insertis, thorace ovato, plano: lateribus pilosis, abdomine magno, depresso, plano, ano obtusissimo, alis duabus, crassis, maculatis, opacis, abdomine paullo longioribus, squama halterum magna, rotundata, ciliata, pedibus cursoriis.

4. *T. thoracis lateribus fulvis, abdomine atro:offinis,*  
lateribus testaceis.

*Syrphus offinis* Ent. syst. 4. 284. 24.

Habitat in Gallia Dom. Bose.

5. *T. fusca abdominis lateribus basi fulvis, ano analis.*  
albido.

Habitat in Gallia Dom. Bose.

Statura praecedentium at triplo minor. Antennae incumbentes seta nuda. Os album. Thorax pilosus, fuscus. Abdomen nigrum, basi fulvum linea dorsali tamen nigra ano siue ultimo segmento albo. Pedes nigri femoribus basi ferrugineis. Alae albae macula magna fusca.

6. *T. atra abdomine cinereo nitidulo, alis ob-obesa.*  
feturis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Parua. Caput nigrum fronte albida, Thorax pilosus, niger, immaculatus. Abdomen nigrum certo situ cinereo nitidulum. Alae obscurae. Pedes nigri.

**SYRPHUS.** *Hautstellum* setis quatuor  
absque vagina.

*Palpi* duo basi setarum exteriorum inferti.

*Antennae* breves, compressae, incumbentes.

- 17—18. *S. antennis tetartiis nudiusculus niger femoribus rufis, alis basi atris.* *megacephalus.*

Habitat in India orientali Mus. D. de Sehestedt.

Magnus. Caput grande, orbiculatum oculis magnis, aeneo nitidulis. Antennae breves articulo ultimo compresso seta nuda. Thorax et abdomen nudiuscula, nigra. Alae

hyalinae, basi atrae lobo erecto auctae, in medio linea transuersa ad marginem crassiorrem atra. Pedes nigri femoribus rufis, anticeis quatuor tibiis albis, posticis tibiis basi albis annulo rufo.

*vinctorum.* 27—3. S. antennis fetariis tomentosus cinereus, abdomine pallide ferrugineo: segmentis ante marginem nigris.

Habitat in Americae Insulis Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo omnino S. arbuſtorum.

Caput cinereo tomentosum antennis flauis.

Thorax tomentosus, cinereus striga fasciisque media abbreviata nigris. Scutellum magnum, ferrugineum. Abdomen ferrugineum segmentis ante marginem nigris margine ipso pallido. Alae hyalinae. Pedes ferruginei.

*micans.* 63—4. S. antennis fetariis tomentosus niger abdomine cinereo villoſo utrinque lunulis tribus albis.

Habitat in Europa australiori.

Statura omnino S. voluuli. Caput nigrum antennis fetariis, flauis. Thorax tomentosus, niger. Abdomen ouatum cinereo villoſum utrinque lunulis tribus albis. Pedes nigri femoribus posticis crassioribus.

*ambulans.* 63—4. S. antennis fetariis nudus thorace nigro aeneo, abdomine rufo: ano nigro, pedibus simplicibus nigris.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino S. fegnis at duplo fere minor.

Caput atrum, nitidum, immaculatum. Thorax nigro aeneus. Abdomen rufum ano nigro. Alae hyalinae. Pedes simplices, nigri.

*means.* 63—4. S. antennis fetariis subtomentosus niger antennarum claua tibiisque basi testaceis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.



Statura praecedentium. Caput atrum, nitidum tuberculo eleuato supra os. Antennae nigrae claua compressa, testacea. Thorax subtomentosus, nigro aeneus. Abdomen atrum, immaculatum. Alae hyalinae. Pedes nigri tibiis basi testaceis.

- 85—6. S. antennis setariis niger abdomine rufo: *tricolor*.  
linea dorsali nigra lineisque obliquis latera-  
libus albis.

Habitat in Heluetia.

Statura praecedentis. Antennae breues, compressae, setariae, nigrae. Thorax nudus, niger, immaculatus. Scutellum nigrum. Abdomen ouatum, rufum linea dorsali nigra. Lineae praeterea tres utrinque obliquae albae.

- 115—6. S. antennis setariis nudus thorace nigro *floralis*,  
viridique lineato, abdomine ferrugineo: seg-  
mento secundo margine atro.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Paruus. Caput cum antennis flauum oculis nigris. Thorax lineis nigris viridibusque alternis. Scutellum nigrum margine virescente. Abdomen elongatum, planum, ferrugineum: segmento secundo margine nigro. Alae hyalinae. Pedes flauis femoribus tibiisque falcia fusca.

MUSCA. *Hauftellum* seta unica absque vagina.

*Palpi* duo porrecti extrorsum crassiores.

*Antennae* breues, clauatae, seta instructae.

- 72—3. M. antennis setariis, thorace sublineato, *stigma*.  
abdomine atro aeneo, alarum costa nigra:  
puncto nigro.

Habitat in Americae Insulis Dom. Lund.

Parua. Antennae fuscae seta nuda. Caput et thorax nigra lineolis albis numerosis sublineata. Scutellum atrum. Abdomen atro aeneum ano imprimis aeneo. Alae albae punctis quinque fuscis costaque fusca puncto distincto hyalino.

*demandata.* 94—5. M. antennis setariis viridi aenea abdomine atro nitido.

Habitat Kiliae.

Statura parua praecedentium. Caput nigrum, raris obscure rufum. Thorax pilosus, viridi aeneus. Abdomen atrum, nitidum. Alae albo hyalinae. Pedes atri.

*lasciua.*

111—12. M. antennis setariis nigra alis apice fuscis; macula strigaeque semicirculari albis.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura et summa affinitas M. annulatae. Corpus nigrum, immaculatum. Abdomen ano inflexo, conico. Alae basi hyalinae, apice nigrae macula transuersa et postice striga semicirculari hyalinis. Pedes elongati, nigri, antici ante apicem albi, postici quatuor anulo paruo albo.

*bicolor.*

122—3. M. antennis setariis testacea abdomine conico atro.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.

Statura M. ungulatae. Caput et thorax testacea, immaculata. Abdomen conicum, acutum, atrum, nitidum. Alae hyalinae.

*diaphana.*

126—7. M. antennis setariis, thorace aeneo, abdomine cinereo: segmento primo secundoque lateribus diaphanis.

*Musca diaphana* Mant. Inf. 2. 349. 82.

Habitat in Europa.

- 145—6. *M. antennis setariis pilosa cinerea alis reticulatis, fronte fulva, thorace fusco punctato.* *Chaerophylli.*  
 Habitat in Europae floribus.  
 Statura et magnitudo *M. reticulatae*. Antennae rufae. Caput cinereum ore albo fronteque fulva linea media atra. Thorax cinereus punctis sparsis fuscis. Scutellum cinereum puncto medio fusco. Abdomen cinereum linea dorsali e punctis nigris. Pedes cinerei. Alae albo nigroque reticulatae.
- 148—9. *M. antennis setariis fronte plana flaves planifrons.*  
 Habite Parisiis Dom. Bose.  
 Affinis *M. umbraculatae* et forte proprii generis. Antennae magnae, cylindricae, obscurae seta albida, sub fronte prominula insertae. Caput magnum, planum, flavum linea longitudinali, ferruginea. Oculi lateralis, ovati. Thorax obscurus, flavo sublineatus. Abdomen elongatum, planum, obscurum interdum linea longitudinali baseos ferruginea. Pedes flavi. Alae albae.
- 156—7. *M. antennis setariis flavescens alis albo flavescentique variis.* *flavescens.*  
 Habitat Tanager Dom. Lund.  
 Corpus medium totum flavescens abdominis dorso paullo obscuriore. Alae albo flavoque variegatae.
- 157—8. *M. antennis setariis cinerea capite pedi-radiata.*  
 busque flavis, alis albis: macula ante apicem radiata atra.  
 Habitat Parisiis.  
 Parva. Caput cum antennis flavescens. Thorax et abdomen pilosa, cinerea ano atro. Pedes flavescentes. Alae alb e macula magna ante apicem, radios plures exferente atra. Lineola parva transversa atra ante maculam.

**SARGUS.** Os proboscide atque haustello.

*Palpi* nulli.

*Antennae* breues, approximatæ; articulo ultimo compresso.

- cuprarius.* 1. *S. glauco aeneus* thorace viridi abdomine oblongo cupreo.  
*Musca cupraria* Ent. syst. 4. 335. 96. Linn. syst Nat. 2. 994. 92. Fn. Su. 1853.  
 Geoff. Inf. 2. 525. 61.  
 Reaum. Inf. 4. tab. 23. fig. 7. S.  
 Degeer Inf. 6. 200. 16. tab. 12. fig. 4.  
 Schaeff. Icon. tab. 209. fig. 32?  
 Habitat in Europæ floribus.
- auratus.* 2. *S. nitidus* thorace aeneo, abdomine obtuso aereo.  
*Musca aurata* Ent. syst. 4. 335. 97.  
 Habitat Kiliae Dom. Daldorff.
- aeneus.* 3. *S. viridi aeneus* nitidus capite pedibusque testaceis.  
*Musca aenea* Ent. syst. 4. 335. 98.  
 Habitat in India orientali Dom. Lund.
- politus.* 4. *S. nitidus* thorace coerulesco, abdomine aeneo.  
*Musca polita* Ent. syst. 4. 335. 99. Linn. syst Nat. 2. 894. 93. Fn. Su. 854.  
 Degeer Inf. 6. 202. 18.  
 Habitat in Europæ floribus.

---

Sargi corpus paruum, oblongum, glabrum, depressum, immarginatum, agile, capite exserto, rotundato, oculis maximis, fere coeuntibus, antennis breuibus, approximatissimis, inter oculos insertis, thorace ovato, scutello magno, rotundato, abdomine elongato, depresso, obtuso, alis duabus abdomine longioribus, basi excisis, hyalinis, halteribus porrectis, nudis clava compressa, truncata, pedibus tenuibus, cursoriis, colore aeneo, nitido.

5. *S. ater nitidus* scutello pedibusque flavis. *scutellatus.*  
Habitat Kiliae.

Statura praecedentium at minor. Caput atrum fronte antennisque flavis. Thorax niger, sublineatus scutello flavo. Abdomen elongatum, atrum dorso plano. Pedes flavi, Alae hyalinae.

**TABANUS.** *Hauptstamm* vagina uniuersum fetisque quinque.

*Palpi* duo clauati, acuminati.

*Antennae* emarginato acuminatae.

- 44—5. *T. abdominis* primo segmento pallido: *dispar.*  
lunula nigra, alis albis: fascia atra.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo praecedentium. Antennae testaceae, apice fuscae. Caput sub antennis flavum maculis duabus magnis, elevatis, ovatis, testaceis, pone antennis pallidum macula magna, transuersa, eleuata, atra. Thorax cinereus lateribus flavis. Abdomen fuscum segmento primo pallido: macula media lunata, fusca. Alae albae costa fasciaeque media lata nigris et in hac fasciae ad marginem tenuiorem macula ovata, alba.

*Mas* oculis cognatis, abdomine testaceo: primo segmento tamen pallido, lunula fusca.

- 44—5. *T. fuscus* thorace albo lineato, abdomine punctato, alis fasciae abbreviatae nigrae. *trifidis.*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura praecedentium. Antennae testaceae, apice nigrae. Caput nigrum. Thorax fuscus, albo lineatus. Abdomen fuscum lineis

quinque punctorum alborum. Alae albae costa fasciaque, marginem tenuiorem haud attingente nigris.

**STOMOXYS.** *Hauftellum* vagina uniuului, conuoluta, basi geniculata fetisque duabus vaginantibus.

*Antennae* fetariae.

*bombylans.* 5—6. S. pilosa cinerea, abdomine pallido: fasciis tribus atris.

Habitat — — Mus. Dom. Bosc.

Magna in hoc genere. Antennae incumbentes, crassiores, ferrugineae. Caput pallidum atomis ferrugineis. Thorax pilosus, griseus, immaculatus. Abdomen valde pilosum fasciis tribus nigris: posteriore maiore. Alae obscurae, basi ferrugineae. Pedes ferruginei.

**EMPIS.** Os hauftello et proboscide inflexis.

*Hauftellum* vagina uniuului.

*Palpi* breues, filiformes.

*Antennae* fetariae.

*femorata.* 10—11. E. nudiculula cinerea thorace lineato, femoribus posticis incrassatis nigris apice testaceis.

Habitat Parisiis Dom. Bosc.

Statura et magnitudo praecedentium. Caput paruum obscurum rostro testaceo. Thorax cinereus, lineatus. Abdomen mox magis cinereum, mox magis obscurum pube maris exserto, reflexo, compresso. Alae albae, immaculatae. Pedes ferruginei femoribus posticis incrassatis, nigris, apice testaceis.

**BOMBYLIUS.** *Hausfellum* longissimum,  
rectum, fetaceum, bi-  
ualve.

*Palpi* duo pilosi.

*Antennae* subulatae, basi  
connatae.

2—3. B. alis dimidiato nigris aequalibus hirtus *micans*.  
albus, thorace lineis tribus fuscis micantibus.

Habitat in Africa Dom. Dymenil.

Paullo maior B. medio. Corpus totum hirsu-  
tissimum, album thoracis dorso lineis tribus  
latis, fuscis, micantibus. Alae albae, dimi-  
diato fuscae et in hac parte lineola parva ba-  
scos alba, Pedes testacei.

3—4. B. alis punctatis basi fuscis, antennis com-*planicornis*,  
presso acuminatis,

Habitat in Germania.

Corpus medium, hirtum. Rostrum porrectum,  
nigrum. Antennae ultimo articulo valde  
compresso, acuminato. Thorax flavescens,  
postice fuscus. Abdomen fuscum punctis  
duobus posticis albis. Alae fusco punctatae  
basiq; fuscae.

3—4. B. alis albis basi fuscis hirtus cinereus ab-*cruciatus*,  
domine cruce niuea, antennis acuminatis.

Habitat Monspeliae Mus. Dom. Bose.

Statura praecedentium. Antennae approxima-  
tae, nigrae: articulo ultimo cylindrico api-  
ce acumine subulato. Rostrum longitudine  
corporis. Thorax hirtus, cinereus, antice  
pilis aliquot rufis. Alae albiae, basi fusces-  
centes. Abdomen hirtum, cinereum postice  
linea dorsali strigisque duabus albis. Pe-  
des obscuri.

**VOLUCCELLA.** *Hauftellum* elongatum, rectum, bivalve.

*Palpi* nulli.

*Antennae* approximatæ: articulo ultimo crassiori, cylindrico.

*atrata.*

1—2. *V. villosa atra* alis albis immaculatis.

Habitat in Marocco Dom. Schousboe.

Corpus præcedente multo minus, totum pilosum, atrum, immaculatum. Halteres flavi. Alæ albae, immaculatae.

**PYCNOGONUM.** *Hauftellum* tubulosum, conicum absque fectis.

*Palpi* ad basin hauftelli.

*Ceti.*

2. *P.* corpore ovato, pedibus quarti quintique paris linearibus muticis.

*Cymothoa Ceti* Ent. syst. 2. 509. 21.

*Oniscus Ceti* Linn. syst. Nat. 2. 1060. 6. Fn. Su. 2056.

Martens Spitzb. tab. 8. fig. D.

Degeer Inf. 7. 541. 6. tab. 42. fig. 6. 7.

Seb. Mus. 1. tab. 90. fig. 5.

Pall. spicil. Zool. 9. 76. tab. 4. fig. 14.

Habitat in Oceani borealis Balaenis.

**PEDICULUS.** *Hauftellum* retractile, recurvum.

*Antennae* subulatae.

*Lanii.*

15—6. *P.* abdomine ovato griseo: margine utrinque strigis octo nigris.

Habitat in Lanio Collurio Dom. Cuvier.

Corpus medium, ovatum. Caput cordatum, antice truncatum, obscurum. Thorax an-



tice angustatus, postice obtuse angulatus. Abdomen ovatum pilis longis, raris, luteis griseum margine utrinque strigis nigris octo.

20—1. *P. ovatus* albidus abdominis medio nigro, *Pici*. thorace antice angustato.

Habitat in Pico viridi Dom. Cuvier.

Medius. Caput triangulare: angulo antico acutiusculo, posticis rotundatis. Antennae lineares. Thorax albidus, antice angustatus, postice obtuse angulatus. Abdomen convexum, albidum: medio nigro segmentis octo, ultimo integro. Pedes breves, pallidi femoribus ovatis, compressis.

23—4. *P. elongatus* albidus: margine nigro, ca- *Anatis*. pite lutescente.

Habitat in Anate Boshas Dom. Cuvier.

Corpus medium, elongatum, fere filiforme.

Caput ovatum, obtusum. Thorax cylindricus, utrinque unidentatus. Abdomen segmentis octo: ultimo bifido.

26—7. *P. elongatus* filiformis flavesceus: linea *Tantali*, laterali atra.

Habitat in Tantalo leucocephalo D. Daldorff.

Corpus valde elongatum, pallide testaceum. Caput triangulare, postice latius oculis nigris antennisque longitudine capitis. Abdomen filiforme, planum linea laterali atra.

**ACARUS.** *Hauptellum* vagina cylindrica, bivalui.

*Palpi* duo longitudine *hauptelli*.

*Antennae* filiformes.

4—5. *A. subrotundus*, planus ater albo macula- *histrionis*. tus maculaque dorsali cyanea biloba.

---

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Maior A. hispano. Antennae breves, crassae, compressae, obtusae utrinque fetis duabus elongatis, erectis basi infertis, niueis. Caput sub antennis incrassatum, vesiculosum, flavescens rostro brevi, prominulo. Corpus depressum, planum, subrotundum, atrum antice maculis quinque albis 3. 2. et postice utrinque quatuor marginalibus. In medio dorso macula magna cyanea, postice biloba. Pedes octo brunnei, albo annulati.

*variegatus.* 7—8. A. obouatus niger antice macula triloba al-bida postice macula biloba ferruginea.

Habitat in Africa Dom. Dumeril.

Statura et magnitudo A. aegyptii. Antennae breves, extrorsum crassiores. Rostrum porrectum, cylindricum, obtusum. Corpus planum, supra nigrum antice macula magna, trifida, pallida et postice macula maiori, biloba, ramum utrinque antice emittente ferruginea. Margo incrassatus, striatus incisuris albis. Pedes brunnei geniculis albis.

---





PROPERTY OF  
Z. P. METCALF

